



Г.З. Минеджян

СБОРНИК

ПО НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЕ И
НЕГРАДИЦИОННЫМ
СПОСОБАМ
ЛЕЧЕНИЯ

тред ктиров л : PRESSI-HERSON

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**ТРАВОЛЕЧЕНИЕ
И НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА**

ВВЕДЕНИЕ

Народная медицина известна с древних времен. Тысячи лет накапливался практический опыт народных целителей. Веками древние люди наблюдали за жизнью животного и растительного мира. Так постепенно длительный опыт лечения травами, цветами и другими растениями вырос в современную фитотерапию. Появились грамотные дипломированные врачи, применяющие на практике богатый опыт народных целителей.

В определенный период нашего века к знаниям представителей народной медицины относились с недоверием.

Но в наши дни постепенно разрушается расхожий стереотип восприятия народной медицины как шарлатанство и бесполезное занятие невежественных людей. Это в корне неверное представление, особенно в наши дни, когда гласность, демократия, плюрализм вышли из "бутылки". Имеется множество примеров, когда официальная медицина была беспомощна в лечении некоторых болезней, а народные целители—травники успешно вылечили годами страдавших людей.

Ни для кого не секрет, что в настоящее время наше официальное здравоохранение переживает кризис из-за дефицита лекарств, современной медицинской аппаратуры и оборудования, и пациенты сталкиваются с равнодушием к чужой боли. И тут больные обращаются к представителям народной медицины.

Русская народная медицина имеет глубокие корни и большой багаж опыта. Она основана на абсолютно чистой фармакологии в надежных лечебных средствах, доказавших свою способность эффективно излечивать многие болезни.

Настоящий сборник содержит различные методы лечения травами и другими веществами, применяемыми в народной медицине разных народов.

Материалы, помещенные в сборнике, взяты из старых русских и иностранных лечебников, а также из современных книг о лечении лекарственными травами.

Составитель настоящего сборника в течение многих лет собрал материалы из многих источников, как устных, так и письменных, и после их систематизации и обработки публикует их с целью помочь читателю, дать ему общее представление о народной медицине и надеется, что она поможет и принесет пользу больным, пожелавшим лечиться экологически чистыми народными средствами.

Необходимо отметить, что данный сборник ни в коем случае нельзя считать источником для самолечения. Во всех случаях следует обратиться к врачу, особенно при серьезных заболеваниях.

Данный сборник можно считать справочником фитотерапевта. В нем врач легко найдет рецепты и сборы по различным болезням, так как сборник систематизирован по принципу алфавитного порядка их наименований.

Большое количество рецептов дано на многие болезни, например, ревматизм, сердечно-сосудистые заболевания, радикулит, гипертония, артрит, болезни печени, почек, мочевого пузыря и т.д. Это сделано потому, что болезни имеют различные формы, и к ним требуется соответствующий подход. Кроме того, необходимо было учесть и противопоказания, которым в сборнике отведено достаточное место.

Все рецепты, предназначенные для приема внутрь, рассчитаны на взрослого человека. Поэтому детям от 1 до 3 лет дозировку необходимо уменьшить в 3—5 раз, детям от 3 до 7 лет — в 2—3 раза, детям от 7 до 14 лет — в 1,5—2 раза. В сборнике имеется также список противопоказаний трав, список времен года для их сбора (календарь), важнейшие настойки, методы их приготовления и применения, а также ряд масел, необходимых для домашней аптечки.

Способы приготовления отваров, настоев и настоек указаны в рецептах.

В первую неделю лечения народными средствами и травами при приеме внутрь дозировку уменьшают вдвое по сравнению с указанной. Это делается для того, чтобы организм привык к данному лекарству. Со второй недели, если организм хорошо переносит данный метод, переходят на полную дозировку. В первые дни при приеме внутрь сборов, настоев и настоек из лекарственных трав у некоторых больных происходит как бы небольшое легкое обострение болезни. Как нишут наши известные специалисты—травники, этого бояться не надо, так как происходит как бы перелом в организме в связи с действием лечебных препаратов. Но если лекарство явно не помогает, следует прекратить курс и применять другие методы и рецепты лечения.

Помните, что каждое растение имеет не только хорошие показания при лечении, но и противопоказания, которые даны в данном сборнике. Человек — это сложная, высокоразвитая биологическая система. Каждый индивидуум имеет свои, свойственные только ему, качества и течение болезни, и каждому человеку необходим особый подход к лечению его болезни, свои рецепты и лекарства. Поэтому, что хорошо одному, то не подходит другому. Не торопитесь давать своим знакомым советы, оказывать помощь. Лучше всех знает ваши болезни врач. Приступать к излечению болезни надо только после консультации с врачом, хорошо знакомым с лекарственными растениями.

Наконец, материалы данного сборника могут служить объектом исследования в классической народной медицине с целью разработки новых методов и рецептур для их использования в здравоохранении.

Составитель

РЕЦЕПТЫ

**ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ
И НАРОДНЫМИ СПОСОБАМИ**

АБСЦЕССЫ

1. Алоэ древовидное (столетник, сабур).

Наружно сок применяют при лечении ожогов, трофических язв, гнойных ран, остеомиелитов с открытым гнойным очагом, абсцессов, флегмон и других гнойных заболеваний (в виде примочек и орошений ран и поврежденных участков кожи). Язвы и гнойные раны быстро очищаются, поверхность раны заполняется свежими грануляциями и эпителизируется.

Срезают нижние листья растения, тщательно промывают кипяченой водой, режут на мелкие пластинчатые кусочки размером 0,2—0,3 мм, завертывают в марлю и выжимают.

2. Подорожник большой.

Свежие истолченные листья применяют наружно для остановки кровотечения из ран, при абсцессах, фурункулах, ожогах, длительно не заживающих ранах или язвах.

3. Репчатый лук.

Для ускорения созревания абсцессов используют кашицу из лука с молоком или печеного лука, которую накладывают на абсцесс.

АВИТАМИНОЗ И ЦИНГА

1. Шиповник, плоды. 1 столовую ложку плодов на 1 стакан кипятка. Кипятить 10 минут в закрытой посуде. Настоять не менее 12 часов, процедить. Принимать по 1/2—1 стакану 2—3 раза в день до еды. Для улучшения вкуса добавить мед или сахар.

2. Лимон. Лимоновый сок отжимают в воду и пьют при цинге, полощут рот при цинге. Во время цинги едят лимоны, нарезанные дольками, слегка пересыпанные сахаром. При цинге очень полезно применять цитрусовые плоды (апельсины, мандарины, грейпфруты).

3. Лук репчатый. Во время цинги очень полезно есть лук и зеленые перья лука. Очень полезно также потреблять в пищу лук победный (черемша), который содержит большое количество аскорбиновой кислоты (витамина С).

4. Капуста белокочанная и другие сорта капусты. При цинге употреблять в пищу любые сорта капусты, как в свежем виде, так и квашеную. Особенно полезны салаты из свежей капусты, так как содержат большое количество витамина С.

5. Чеснок. Применять чеснок во всех видах с пищей и отдельно с хлебом при цинге.

6. Ель, сосна, пихта, кедр, лиственница. Водные отвары хвои применяют для приема внутрь и для полоскания рта при цинге. Из хвои с сахаром варят варенье и пьют чай с таким вареньем от цинги. 4 стакана зимней настриженной хвои залить 3 стаканами остуженной кипяченой воды, подкислить 2 чайными ложками разведенной соляной кислоты. Настоять 3 дня

в темном месте, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раз в день, подсластив по вкусу, как витаминный настой.

7. Черная смородина. При цинге употреблять ягоды черной смородины. Весной нарезать молодых веточек черной смородины, мелко порезать их и отварить 7—10 минут в воде. Пить как чай такой отвар.

8. Рябина красная, плоды. Есть плоды рябины красной, когда они созрели. 1 столовую ложку плодов рябины на 1 стакан кипятка. Кипятить 10 минут, настоять 4 часа. Принимать по 1/2 стакана 2—3 раза в день вместе с ягодами.

9. Первоцвет. Свежие листья и цветы в виде салата используют при авитаминозе (недостатке в организме витаминов С и А). 1 столовую ложку сухих листьев на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав 30 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.

10. Кипрей. Свежие листья добавляют в салаты как витаминное средство. 1 столовую ложку сухих листьев на стакан кипятка. Настоять, укутав 1—2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

11. Осина (кора, почки). Щепотку (1 столовую ложку с верхом) почек или коры осины на 500 г кипятка. Кипятить 10—15 минут. Настоять 3 часа, укутав. Принимать как чай по 1 чашке 3 раза в день, подсластив медом. Настойка почек на водке или спирте. Применять 20—40 капель 3 раза в день.

12. Брусника обыкновенная. Витаминный чай: плоды брусники — 2 части, листья крапивы — 3 части, плоды шиповника — 3 части. Измельченное сырье хорошо перемешать, 4 чайные ложки смеси заварить стаканом кипятка, настоять 3—4 часа, процедить и пить по стакану 2—3 раза в день.

13. Каллина обыкновенная. Витаминный чай из плодов обладает общеукрепляющим и успокаивающим действием, столовую ложку плодов заварить стаканом кипятка, настоять 1—2 часа, процедить. Пить по 1/2 стакана 2 раза в день.

14. Клубника полевая. Листья — как витаминное средство в виде чая (столовую ложку измельченных листьев заварить стаканом кипятка в фарфоровой или стеклянной посуде, настоять 10—15 минут, процедить. Пить как чай.

15. Смородина черная. В медицинской практике плоды черной смородины применяют как витаминное средство.

Сушеные плоды черной смородины входят в состав витаминных сборов:

а) плоды черной смородины, плоды шиповника (поровну). 2 чайные ложки сбора заварить 2 стаканами кипятка, настоять час, процедить через марлю, добавить сахар по вкусу. Пить по 1/2 стакана настоя 3—4 раза в день.

б) плоды черной смородины — 1 часть, лист крапивы — 2 части, плоды шиповника — 3 части. Столовую ложку смеси заварить 2 стаканами кипятка. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

в) большой популярностью пользуется черная смородина с сахаром. В ней длительное время хорошо сохраняются витамины (на 1 кг ягод 1,5 кг сахарного песка).

16. Шиповник. Плоды шиповника входят в состав различных сборов:

а) плоды шиповника, плоды черной смородины (поровну). Столовую ложку измельченной смеси заварить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, процедить, добавить сахар. Пить по 1/2 стакана витаминного чая 3—4 раза в день.

б) плоды шиповника, плоды рябины (поровну). 2 чайные ложки смеси заварить 2 стаканами кипятка. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

В и т а м и н н ы е с б о р ы

17. Плоды шиповника — 1 часть	Сбор № 1.
Ягоды смородины черной — 1 часть	
18. Плоды шиповника — 1 часть	Сбор № 2.
Плоды калины — 1 часть	
19. Плоды шиповника — 1 часть	Сбор № 3.
Ягоды брусники — 1 часть	
20. Плоды шиповника — 3 части	Сбор № 4.
Ягоды брусники — 1 часть	
Листья крапивы — 3 части	
21. Листья крапивы — 3 части	Сбор № 5.
Плоды рябины — 7 частей	
22. Плоды шиповника — 1 часть	Сбор № 6.
Плоды рябины — 1 часть	

Сборы заваривать так: 1 столовую ложку смеси на 1 стакан кипятка. Кипятить 10 минут. Настоять, укутав, 4 часа. Принимать по 1/2 стакана 2—3 раза в день.

АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. Спаржа лекарственная — по 2—3 чайные ложки сырья на 200 мл кипятка, варить в течение 5 мин. Когда готовят вытяжку из корневища растения, варить следует в течение 10 мин, для этого берут одну ст. ложку измельченного корневища. Приготовленный таким образом экстракт принимать по винной рюмке каждые 4 часа.

2. Солодка голая, гладкая — 1 ст. ложку измельченных корней залить 500 мл воды и варить в течение 10 мин. После остывания процедить и принимать по рюмке перед каждой едой.

3. Лещина древовидная, орешник — 1 столовую ложку измельченных высушенных листьев или коры залить стаканом кипятка. Пить по 1—2 ст. ложки несколько раз в день.

4. Лопух большой, репейник — 1 ст. ложку измельченного корня варить 10 мин. в 500 мл воды, процедить и пить по винной рюмке 4 раза в день перед едой.

АЛКОГОЛИЗМ

1. Золототысячник — 1 часть, полынь горькая (травы) — 1 часть, чабрец — 1 часть.

Засыпать 15 г смеси на 200 г кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день при алкоголизме.

2. Клоп лесной, зеленый (водится в малине). Клоп издает резкий, неприятный запах.

Поймать несколько клопов, настоять на водке. Дают пить человеку, страдающему алкоголизмом. Это вызывает у него отвращение к алкоголю. Больному об этом не говорить.

3. Любисток (корень). В 250 г водки положить корень любистoka и 2 листа лавра благородного. Настоять 2 недели. Алкоголику дать выпить стакан такой настойки и этим можно вызвать отвращение к водке.

4. Копытень, корни — 1 столовую ложку измельченных корней копытня на стакан воды. Кипятить 10—15 минут на малом огне. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. 1 столовую ложку отвара корня копытня влить в 1 стакан водки. Дают пить эту водку пьянице. Такая смесь водки с копытнем вызывает рвоту и, якобы, сильное отвращение к алкоголю. На некоторых пьяниц этот способ действует неплохо. Точно соблюдать дозировку, так как растение ядовитое. О том, что в водке есть что-то подмешанное, пьяница не должен знать.

5. Чайную ложку измельченных листьев копытня и 2 чайные ложки зеленой коры плодов ореха. Чайную ложку этой смеси залить вином и принимать. Этот рецепт рассчитан на 4 литра вина.

АЛЛЕРГИЯ

1. Аллергия на пыль, в том числе на книжную.

Золототысячник — 5 столовых ложек без верха, зверобой — 4 столовые ложки, одуванчик (корень) — 3 столовые ложки, хвощ полевой — 2 столовые ложки, кукурузные рыльца — 1 столовая ложка, шиповник (плоды толченые) — 4 столовые ложки.

Шиповник и корни одуванчика растолочь в ступе или провернуть через мясорубку. Весь сбор хорошо смешать.

1 столовую ложку сбора на 1,25 стакана воды, можно сделать сразу на 2—3 дня. В эмалированной кастрюльке залить этот сбор холодной водой вечером и дать настояться ночь. Утром поставить на огонь, довести до кипения (не кипятить). Укутать на 4 часа, процедить. Принимать 1 стакан в течение дня в 3 приема до еды (то есть по 1/3 стакана на прием). Хранить в холодильнике. Аллергия начнет выходить. Вначале будут затвердения в носу, потом на подбородке, на руках, ниже до ног с сильным зудом. Смазывать анестезирующей жидкостью "Меновазин". Через месяц начнется выздоровление. Лечиться 6 месяцев. Спиртного не принимать. Этот сбор хорош и для детей, когда у них аллергия как бы уходит внутрь и дети становятся сильно перевозбужденными. Бывает эта аллергия от нарушения обмена веществ из-за неправильного питания.

2. Крапива глухая (яснотка), (цветы). 1 столовую ложку цветов сухих или свежих на стакан кипятка. Настоять, укутав на 30 мин., процедить. Принимать по 1/2 стакана 4—5 раз в день или по 1 стакану 3 раза в день в теплом виде.

Применяется при аллергической сыпи, при крапивнице, фурункулезе, экземе, золотухе как хорошее кровоочистительное средство.

3. Ряска маленькая. Спиртовая настойка. 1 чайную ложку свежей корош-по вымытой травы на 50 мл водки. Настоять 7 дней, процедить, отжать. Принимать по 15—20 капель в 1/4 стакана воды 3 раза в день. Сухую ряску размолоть в порошок. Порошок смешать пополам с медом. Принимать по 1 пилюле весом 1—2 г 2—3 раза в день.

Применяется при витилиго как десенсибилизирующее средство при аллергических заболеваниях, при крапивнице, ангионевротическом отеке (отек нервного происхождения).

4. Сельдерей пахучий. Отжать сок из свежего корня. Принимать по 1—2 чайных ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. Иногда можно принимать настой: 2 столовые ложки измельченных корней настаивают 2 часа в стакане холодной воды, процеживают. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Сельдерей (сок и настой) применяется при заболеваниях почек, подагре, аллергической крапивнице, дерматитах, как мочегонное, легкое слабительное.

АНГИНА

1. Ромашка — 1 часть, эвкалипт — 1 часть, ноготки, цветы — 1 часть.

Все измельчить и хорошо смешать. 1 столовую ложку смеси на 1,5 стакана кипятка. Кипятить 2 минуты, настоять, укутав 30 минут, процедить. Полоскать 2 раза в день, утром и вечером, разделить раствор пополам. Начинать полоскать раствором с 26 град С., постепенно убавляя по 1 град в день, до 16 град. Затем месяц полоскать при 15—16 град таким раствором. Такое полоскание позволяет снять воспаление горла и закалит его.

2. Свекла красная. Натереть на мелкой терке свеклу. Отжать стакан сока. В стакан сока свеклы красной влить 1 столовую ложку уксуса (но не уксусной кислоты). Этим раствором полоскать горло 5—6 раз в день. Можно по 1 глотку проглотить. Делать полоскания до полного выздоровления.

3. В бутылку 0,5 л. из-под молока нарезать до половины листьев столетника и засыпать сверху сахарным песком. Обвязать горло марлей. Настоять 3 дня, затем налить туда водки до верха, завязать марлей, снова настоять 3 дня. Процедить, отжать. Получится сладко-горький ликер. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Ребенку принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. Принимать до полного выздоровления. Применяется при ангине, гландах и болезнях легких.

4. Аир, корень. Ежедневно жевать корень аира 5—6 раз в день по маленькому кусочку. При этом держать во рту каждый кусочек 15—20 минут. Через полгода-год такой приемом человек избавляется от любых ангин.

5. Каланхоэ (домашнее растение). При заболевании горла простудного характера сок растения каланхоэ смешивают пополам с водой и полоскают горло несколько раз в день. Сок каланхоэ закапывают в нос при насморке. Сок каланхоэ с водой пополам принимают внутрь при гриппе.

6. Анис обыкновенный.

а) Чайную ложку плодов заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 3—4 раза в день за 30 минут до еды.

Плоды аниса входят в состав различных сборов:

б) Плоды аниса — 1 часть, лист мать-и-мачехи — 1 часть, цветки ко-
ровяка — 1 часть, цветки просвирика — 2 части, цветки тимьяна — 2
части, корень алтея лекарственного — 2 части, корень солодки — 5 час-
тей. Столовую ложку смеси настоять на стакане холодной воды, через 2
часа довести до кипения и кипятить 5—6 мин. на слабом огне, после осты-
пания процедить. Пить по 1/4 стакана теплого отвара 4 раза в день при
кашле, трахеобронхите, бронхите.

7. Бузина сибирская.

Отваром цветков полощут горло при ангине, кашле и воспалениях по-
лости рта.

3—4 столовые ложки цветков заварить стаканом кипятка, кипятить
пять минут на слабом огне, охладить, процедить. Отвар применять для по-
лоскания при воспалении полости рта, ангине.

8. Карагаида гривастая (верблюжий хвост).

Отвар надземной части пьют при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, геморрое, простудных заболеваниях (столовую ложку измельчен-
ного лекарственного сырья залить стаканом кипятка, настоять на водяной
бане 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в
день).

Наружно отвар применяют для полосканий при ангинах, воспалитель-
ных заболеваниях полости рта и десен.

9. Лук репчатый.

Свежий сок употребляют при ангине по 1 чайной ложке 3-4 раза в
день.

10. Черника обыкновенная.

Густой отвар плодов применяется для полоскания при ангилах, для сма-
зывания обожженных участков, сыпи на коже и некротических язв (100 г
сухих плодов залить 0,5 л воды, кипятить, пока количество воды не умень-
шится до 0,3 л).

11. Шалфей лекарственный.

а) при воспалении миндалин, слизистой оболочки полости рта и десен
настой листьев используется в виде полосканий (4 чайные ложки измель-
ченных листьев заварить 2 стаканами кипятка, настоять 30 минут, проце-
дить).

б) листья шалфея входят в состав различных сборов:

лист шалфея лекарственного — 3 части, цветки ромашки аптечной — 3
части, трава приворожа — 4 части. Чайную ложку сбора заварить стаканом
кипятка, настоять 30 минут, процедить. Полоскать горло при ларингите
5—6 раз в день.

12. Фиалка душистая. Это прекрасное средство при ангине, гриппе и
других воспалениях слизистой оболочки верхних дыхательных путей. При-
меняется в виде спиртовой настойки.

Настойка на спирту: 25 г цветков на 10 мл спирта. Принимать по 20-30
мл настойки 3 раза в день перед едой. Полоскание — 10 мл настойки на
стакан теплой воды — после еды и на ночь.

13. Лимон. При начинающейся ангине хорошо помогает медленное же-
вание сырого лимона, особенно цедры. После этого в течение часа ничего
не есть, что дает возможность эфирным маслам и лимонной кислоте воз-

действовать на воспаленные слизистые оболочки горла. Эту процедуру нужно повторить через три часа.

14. Спирт — 100 мл, ментол — 2,5 г, новокаин — 1,5 г, анестезин — 1,5 г. Переднюю часть шеи смазывать данной смесью два раза в день. Желательно захутать шею платком или шарфом.

15. Смеси для полоскания горла:

1) Эвкалипт (лист) — 2 части, лен (семя) — 1 часть, ромашка (цветы) — 2 части, липа (цветы) — две части.

2) Душница (травы) — 1 часть, ромашка (цветы) — 2 части, шалфей (травы) — 1 часть, мальва (корень, лист, цветы) — 2 части.

3) Бузина черная (цветы) — 1 часть, шалфей (травы) — 1 часть, алтей (корень, лист, цветы) — 1 часть, донник (травы с цветами) — 0,5 части.

4) Зверобой (травы с цветами) — 2 части, лен (семя) — 1 часть, календула — 2 части, ромашка — 2 части.

Компоненты любой из этих смесей измельчают, столовую ложку смеси трав заливают кипятком в фарфоровой посуде (200 мл). Затем, настояв под фарфоровым блюдцем 30 мин., отцедить и полоскать горло теплым настоем 4—5 раз в день. Последние порции медленно глотать.

ДИФТЕРИТ И СКАРЛАТИНА

Это средство — 30-проц. раствор лимонной кислоты.

Этим раствором нужно полоскать горло. Для этого нужно держать голову запрокинутой назад и выдыхать воздух, чтобы раствор хлопотал во рту. Полоскать каждый час в течение дня. Этот раствор прекрасно помогает при всяких заболеваниях горла, если эти заболевания захвачены в их начальной стадии.

За неимением такого раствора можно взять на прием 2 или 3 ломтика лимона, предварительно очистив их от кожуры, и один за другим брать в рот и держать, стараясь, чтобы ломтики лимона были около самого горла. Следует посасывать эти ломтики, а потом их глотать. Так нужно поступать каждый раз, пока больной не почувствует облегчения. Это средство действительно в самом начале болезни, но если она захвачена сразу, то лимон уже бесполезен и надо пользоваться лимонной кислотой.

АРТРИТЫ

1. Цветки бузины, лист крапивы двудомной, корень петрушки, кора нвы (всёк поровну). Столовую ложку измельченного сбора заварить стаканом кипятка, кипятить 5 минут на слабом огне, охладить, процедить. Пить по 2 стакана отвара в день при артритах различной этиологии.

2. Вишня обыкновенная (плоды). В народной медицине плоды вишни с молоком употребляют при воспалениях суставов — артритах.

3. Звездчатка средняя, мокрица (травы). 1 столовую ложку трав на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день до еды при артритах, подагре.

4. Грыжник душистый (свежая трава). 3 чайные ложки свежей травы на 500 г кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1/3 ста-

кана 3—4 раза в день холодным или теплым при артритах, ревматизме, подагре.

5. Портулак огородный (травя). 1 столовую ложку свежей травы на 1 стакан холодной воды. Кипятить 10 мин после закипания. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки 3—4 раза в день при артритах.

6. Каштан конский. 20 г цветков настаивать 2 недели в 0,5 л спирта или водки. Настойку применяют как растирание при артритах.

7. Коровяк, медвежье ухо (цветы). 50 г цветов настаивать 2 недели в 0,5 л водки или 70° спирта. Спиртовую или водочную настойку используют для втираний как обезболивающее средство при артритах и особенно первых болях.

8. Горечавка желтая (корневища с корнями). 3 чайные ложки корневищ и корней отварить 20 мин в 3 стаканах воды. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3—4 раза в день до еды при артритах различного происхождения. Такое же действие имеет горечавка перекрестнолистная. Заваривать так же. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день до еды.

Взять бутылку, вмещающую 0,5 л жидкости. Положить туда камфоры кусочек, размером в 1/4 куса кускового сахара. Влить в бутылку 150 мл скипидара, 150 мл прованского масла. Добавить 150 мл 70° спирта. Перед употреблением взбалтывать. Втирать досуха перед сном и завязывать чем-либо из чистой шерсти на всю ночь.

АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ

1. Багульник — 25 г, крапива жгучая малая — 15 г.

Все мелко порезать, смешать. Заварить эту смесь 1 л кипятка. Настоять, укутав, 3 часа, процедить. Принимать по половине стакана 5—6 раз в день. Применяется при бронхиальной астме, простуде, ревматизме, кашле. В народе считают, что после 2-х недельного приема этого состава начинающаяся астма проходит. При коклюше детям принимать по чайной ложке 3—5 раз в день.

2. Эфедра (травя) — 40 г, ромашка аптечная — 200 г, березовые почки — 60 г, багульник (травя) — 200 г.

Все измельчить, хорошо смешать, 2 столовые ложки смеси на 500 г кипятка настоять, укутав, 5—6 часов, процедить. Принимать по полстакана 3 раза в день до еды, в теплом виде. Применяется при астматических бронхитах.

3. Почки сосновые — 1 часть, подорожник (листья) — 1 часть, мать-и-мачеха (листья) — 1 часть.

Засыпать 4 чайные ложки смеси на стакан холодной воды. Настоять два часа. Затем кипятить 5 минут, настоять 15 минут, процедить. Выпить эту дозу в течение дня в три приема.

Применяется при бронхиальной астме, коклюше, бронхиэктазии.

4. Чабрец (Богородская травя) — 10 г, мать-и-мачеха (листья) — 10 г, фиалка трехцветная (травя) — 10 г, девясил (корни) — 10 г, анис (плоды) — 10 г.

Способ приготовления и применения — как в сборе рецепта № 3.

5. Бедренец-камнеломка (корни). Это старинное народное средство от астмы. Так как корень труднорастворим в воде, взять 2 части корня на 5 частей спирта или водки. Настоять 8 дней в темном шкафу, процедить, отжать. Принимать по 30 капель на столовую ложку воды 4—5 раз в день.

П р и м е ч а н и е. 2 части корня — по весу, а по размеру это почти половина посуды с водкой.

6. Бузина сибирская.

При бронхиальной астме применяют цветки бузины в сборах:

в) Цветки бузины, трава росянки, лист подорожника, трава фиалки трехцветной (все поровну). 4 чайные ложки измельченного сбора кипятить несколько минут и после остывания процедить. Отвар выпить за один день в три приема при бронхиальной астме, бронхите и бронхоэктазах.

б) Цветки бузины, трава лапчатки гусиной, трава шандры, трава чистотела, сосновые почки (все поровну). Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

в) Цветки бузины — 1 часть, кора молодой ивы — 1 часть, лист мать-и-мачехи — 1 часть, плоды аниса — 2 части, плоды шиповника — 2 части. Способ приготовления и применения как в предыдущем рецепте.

7. Мать-и-мачеха обыкновенная.

4 чайные ложки измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день.

8. Репа огородная.

Овощное растение. С лечебной целью используют корнеплод репы, содержащий аскорбиновую кислоту, каротин, витамин В₁, белки, жиры, минеральные соли и другие вещества.

в) Отвар корнеплода пьют при бронхиальной астме, кашле, воспалении слизистой оболочки гортани, бессоннице, сердцебиении, простудной потере голоса (2 столовые ложки измельченного корнеплода залить стаканом кипятка, варить 15 минут, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день или по стакану на ночь).

б) Реповый сок с медом (по вкусу) употреблять при кашле (по 1—2 столовые ложки 3—4 раза в день).

9. Девясил (корень измельченный) — 20 г, фиалка трехцветная (травы) — 20 г, тимьян (травы) — 20 г, анис (плоды раздробленные) — 20 г, мать-и-мачеха (листья, цветы) — 20 г.

Смесь заваривать из расчета 2 стол. ложки на 500 мл кипятка, томить час, укутав. Пить по полстакана теплым. Ночную порцию налить в термос, добавив сахар, так как девясил после длительного настаивания приобретает очень терпкий вкус.

10. Анис (плоды) — 20 г, фенхель (плоды) — 20 г, тимьян — 20 г, солодка (корень) — 20 г.

Измельчить все компоненты в мелкую крупу и заварить 500 мл крутого кипятка 2 стол. ложки смеси. Применять в виде теплого настоя по одной трети стакана 4 раза в день и в течение всей ночи.

АТЕРОСКЛЕРОЗ

1. Боярышник — настойка плодов на спирту. В 200 мл спирта положить стакан свежих плодов боярышника, предварительно немного их размяв.

Настаивать 3 недели, после чего отцедить и принимать по чайной ложке с медом до еды на ночь.

2. Боярышник — настойка цветов на спирту. В 200 мл спирта положить 4 стол. ложки цветов и настаивать в темноте при комнатной температуре, периодически встряхивая бутылочку. Через 10 дней препарат готов к употреблению. Его нужно употреблять перед едой по 1 чайной ложке с медом.

3. Боярышник — отвар плодов — 20 г сушеных или свежих ягод на 200 мл кипятка. Настаивать полчаса или варить 5 мин. на слабом огне, пить перед едой и на ночь по 200 мл отвара сразу.

4. Боярышник — экстракт плодов боярышника. Заварить 500 мл кипятка стакан свежих или сушеных плодов боярышника, добавить 2 стол. ложки сахара и варить на очень медленном огне 40 мин. (отвар должен увариться наполовину). Хранить отвар с ягодами, не процеживая, в холодильнике, принимать по 1 стол. ложке перед едой и 2 стол. ложки на ночь.

5. Боярышник кроваво-красный.

0,5 кг зрелых плодов моют и дробят деревянным пестиком (толкушкой), добавляют 100 мл воды, нагревают до 40° и прессуют соковыжималкой. Полученный сок пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Оказывает благотворное действие на сердце, особенно в пожилом возрасте: предотвращает перенапряжение и изнашиваемость сердечной мышцы.

6. Гречика посевная.

Настой цветков пьют при кашле, склерозе кровеносных сосудов (десертную ложку цветков заварить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа в закрытом сосуде, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день).

7. Лук-чеснок (чеснок).

Свежие луковицы чеснока употребляют при атеросклерозе (по 2-3 зубка ежедневно).

8. Подорожник большой.

Настой и свежий сок из листьев рекомендуется при атеросклерозе. Столовую ложку сухих измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 10 минут. Выпить за 1 час глотками — суточная доза. Хорошо вымытые листья нарезать, намять, выжать сок, смешать с равным количеством меда, варить 20 минут. Применять по 2-3 ст. ложки в день. Хранить в хорошо закрытой посуде в прохладном темном месте.

9. Чабрец (5 г на 500 мл кипятка) настаивать 40 минут плотно закрытым. Чабрец — сильное средство, и его можно употреблять не более 2-3 раз в неделю. Он обладает успокаивающим, бактерицидным действием, снимает спазм сосудов головного мозга.

10. Мелисса (трава) — 10 г, буквица (трава) — 10 г, боярышник (цветы или плоды) — 40 г, вероника (трава) — 10 г, земляника (трава) — 30 г.

1 стол. ложку заварить 250 мл кипятка и пить, как чай, с медом или сахаром. Смесь очень вкусная, ее можно добавлять в чай.

11. Для лечения и профилактики атеросклероза берется смесь из равных частей свежего сока лука и меда.

Принимать по чайной ложке 3-4 раза в день.

12. Шалфей* — рецепт Н.Г. Ковалевой: 90 г свежего шалфея, 800 мл водки и 400 мл воды настаивать на свету 40 дней в закрытой стеклянной посуде. Принимать по 1 стол. ложке пополам с водой утром перед едой. Эта настойка рекомендуется пожилым людям для стимулирования нервной системы.

АТОНИЯ КИШЕЧНИКА

1. Ревень волнистый. С медицинской целью используют корни ревеня, которые заготавливают осенью, промывают в воде, режут на куски, провяливают на солнце и сушат при температуре не выше 60°.

Корни содержат дубильные и другие биологически активные вещества.

Порошок корня ревеня применяют при различных заболеваниях. В малых дозах (0,05–0,2 г) ревень оказывает вяжущее действие и помогает при гастритах с пониженной кислотностью, поносах. Средние дозы (0,2 г) действуют как желчегонное средство, большие (0,2–2 г) — как нежное слабительное при атонии кишечника, спастических запорах для размягчения стула при геморрое.

2. Душица обыкновенная — 10 г травы заливают 200 мл воды и пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Используется для усиления перистальтики кишечника при его атонии. В этих случаях принимают водный настой душицы.

БЕССОННИЦА

1. Укроп, (семена). 50 г семян укропа варить 15–20 минут на малом огне в 0,5 л вина "Кагор" или "Портвейн", настоять, укутав, 1 час. Процедить, отжать. Принимать 50–60 г перед сном. Народное средство. Безвредно, обеспечивает хороший сон.

2. Конопля, (семя). 2 столовые ложки семян конопли мелко растолочь, просеять. Залить 1 стаканом горячей кипяченой воды. Настоять, укутав, 30–40 мин. Пить теплым за 2 приема перед сном. Сначала выпить половину стакана за 2 часа до сна. Потом, через час, выпить остаток вместе с осадком. Пить обязательно теплым. Принимать 2 недели. Применяется от периодической бессонницы.

3. Хмель. 2 чайные ложки шишек хмеля на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. Выпить стакан на ночь от бессонницы. 1 часть измельченных шишек хмеля на 4 весовых части водки или 50° спирта. Настоять 2 недели в темном месте, процедить, отжать. Принимать по 5 капель настойки на 1 столовую ложку воды. Принимать 2 раза в день до еды. Второй раз пить на ночь. Применяется при бессоннице.

4. Лавандовое масло. Перед сном смазать маслом виски. 3–5 капель лаванды на кусок сахара, сосать перед сном. Обеспечивает хороший сон.

5. Мыть на ночь ноги горячей водой. Такая процедура снимает усталость, дает энергию, успокаивает нервную систему, улучшает сон.

* Шалфей можно хранить год.

6. Бузина. Употребляется так: столовую ложку измельченного корня заварить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на слабом огне, настоять 30 минут, процедить. Отвар принимать по столовой ложке в день при бессоннице, одышке.

7. Валериана лекарственная.

а) настой валерианы: столовую ложку измельченного корня залить стаканом холодной кипяченой воды, настоять 6-8 часов, процедить. Принимать по столовой ложке, детям — по чайной ложке 3 раза в день.

б) отвар валерианы: столовую ложку измельченного корня залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на слабом огне, настоять 10 минут, процедить. Принимать по столовой ложке, детям — по чайной ложке 3 раза в день.

в) спиртовую настойку валерианы (валериановые корни) можно купить в аптеке. Принимают по 15-20 капель на прием 2-3 раза в день, детям дают столько капель, сколько лет ребенку.

8. Хмель. 25 г хмеля на 100 мл спирта настоять неделю в темноте, встряхивая, а затем принимать по чайной ложке 2-3 раза в день, особенно на ночь.

9. Хмель. Порошок из раздробленных шишек хмеля можно просто принимать на ночь в качестве успокаивающего и снотворного средства.

10. Хмель. Набить подушку свежими хмелевыми шишками, положить в плотную ткань и хранить в шкафу. При возникновении бессонницы спать на подушечке, предварительно встряхнуть ее. Успех гарантирован даже при тяжелой бессоннице.

БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ

1. Щавель кислый (корни). 1 столовую ложку свежих корней на полтора стакана воды. Кипятить 15 мин, настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день до еды при болях в пояснице, ревматизме.

БОРОДАВКИ

1. Чистотел. Мазать ежедневно 2 раза в день бородавки соком свежесорванного чистотела.

2. Чеснок. Ежедневно натирать бородавки чесноком.

3. Магнезия, порошок. Ежедневно 2 раза, утром и вечером, перед едой принимать порошок магнезии на кончике ножа. Принимать месяц.

4. Одуванчик. Небольшие молодые бородавки можно свести соком одуванчика.

5. Яблоко разрезать пополам ниткой. Обими половинами яблока натереть бородавки, положить яблоко снова вместе половинками и связать их той же ниткой. Закопать это яблоко в землю или в навоз. Когда яблоко сгниет — бородавки исчезнут. — Народное средство.

6. На шелковой нитке завязывают в воздухе узлы над каждой бородавкой. Спрятать эту нитку в свежую разрезанную картофелину и зарыть ее в землю, так, чтобы никто не знал. Когда картошка сгниет, бородавки исчезнут. — Народное средство.

7. Детские бородавки легко сводятся искусственным льдом, в котором сохраняется мороженое. Попросить кусочек льда, завернуть его. Дома приложить несколько раз лед к бородавкам и поддержать некоторое время, насколько это терпимо. Достаточно несколько сеансов и бородавки исчезнут.

8. Уксусная кислота. Ежедневно вечером перед сном капать из пипетки на бородавку 1 каплю уксусной кислоты, соблюдая осторожность. Большие капли не употреблять. Бородавки скоро начнут сходить.

9. Взять остаток стебля с корнем от срезанного хлебного колоса. Острием соломины несколько раз наколоть бородавки и сейчас же эту соломинку закопать в сырое место, корнем вверх. Через несколько дней, когда соломина сгниет, бородавки исчезнут. Такое народное средство.

10. Чистотел. Бородавки смазываются выдавливаемым из чистотела соком. Самый лучший сок — оранжевый — около корня. После того, как через несколько смазываний поверхность бородавки почернеет, ее нужно аккуратно срезать маникюрными ножницами и продолжать смазывать, пока бородавка не пропадет совсем.

11. Рябина. Массу из сырых ягод регулярно наносить на бородавку.

12. Сухой лед. Держите сухой лед сколько можете. Заверните остаток льда в несколько слоев газеты и в целлофан и храните в морозильнике. Через 2-3 часа повторите, к вечеру еще раз. Иногда 3-4 процедур за день достаточно, чтобы бородавка сошла.

13. Молочай лозный. Смазывать соком растения бородавки. После того, как через несколько смазываний поверхность бородавки почернеет, ее необходимо осторожно срезать маленькими ножницами и продолжать смазывать пока бородавки не исчезнут окончательно.

БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ, ПНЕВМОНИЯ

1. Мать-и-мачеха (листья) — 5 г, черная бузина (цветы) — 5 г, спаржа (трава) — 5 г.

Эту смесь заварить стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Пить как чай 3 раза в день. Применяется при воспалении легких, сильных бронхитах и плевритах.

2. Почки сосиовые — 1 часть, подорожник (листья) — 1 часть, мать-и-мачеха (листья) — 1 часть.

4 чайные ложки смеси настоять 2 часа в стакане холодной воды. Кипятить 5 минут, процедить. Принимать 1 стакан в течение дня за 3 приема. Применяется при бронхиальной астме, коклюше, бронхоэктазии.

3. Мать-и-мачеха (листья) — 2 части, душица (трава) — 1 часть, ромашка аптечная — 2 части.

2 столовые ложки измельченной смеси на 500 мл крутого кипятка. Настоять, укутав, 5—6 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде. Применяется при сухом бронхите и при хроническом бронхите.

4. Багульник (трава) — 4 части, березовые почки — 1 часть, душица (трава) — 2 части, крапива двудомная (листья) — 1 часть. Все измельчить, хорошо смешать. 2 столовые ложки смеси на 500 г крутого кипятка.

Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1/1 стакана 3 раза в день после еды. Применяется при хронических бронхитах.

г. Мать-и-мачеха (листья) — 2 части, березовые листья — 1 часть. Родка аптечная — 2 части, багульник (травы) — 2 части, душица (травы) — 1 часть.

Способ приготовления и применения — как в рецепте № 4. Применяется при хронических пневмониях.

в. Эфедра (травы) — 40 г. Ромашка аптечная — 200 г. Березовые почки — 60 г. Багульник (травы) — 200 г.

Все измельчить и хорошо смешать. 2 столовые ложки смеси на 500 г кипятка. Настоять, укутав, 5 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде.

Применяется при астматических бронхитах.

7. Бальзам. Столетник — 250 г, кагор марочный — 0,5 л, мед незасахаренный — 350 г.

Столетник не поливать 2 недели до срезания листьев. Листья столетника вытереть от пыли (не мыть), мелко порезать, положить в стеклянную банку. Залить кагором и медом. Хорошо смешать. Настоять 9 дней в прохладном месте. Можно 14 дней. Затем процедить, отжать. Принимать первые 2 дня по 1 столовой ложке 3 раза в день, а затем по 1 чайной ложке 3 раза в день. Применяется при всевозможных легочных заболеваниях для укрепления легких.

8. При упорном бронхите сок алоэ применяется в смеси с другими веществами: сок алоэ — 15 г, смалец свиной или гусиный — 100 г, масло сливочное (несоленное) — 100 г, мед чистый (пчелиный) — 100 г, какао (не обязательно, для вкуса) — 50 г. Принимать по столовой ложке на стакан горячего молока 2 раза в день.

Сок алоэ противопоказан при беременности, кровоточащем геморрое, воспалении почек и мочевого пузыря.

9. Горьц птичий (спырыш).

При заболеваниях органов дыхания:

а) столовую ложку измельченной травы залить стаканом кипятка, кипятить 5—10 минут в водяной бане, настоять 1—2 часа, процедить. Принимать по столовой ложке 3—4 раза в день при туберкулезе легких и коклюше.

б) трава спырыша, плоды аниса, плоды укропа, почки сосновые, трава чабреца, мелко измельченный корень солодки (всех поровну). 4 чайные ложки смеси залить 1,5 стакана холодной кипяченой воды, настоять 2 часа, поставить на плиту, довести до кипения, кипятить 2—3 минуты, остудить, процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Применяется с хорошим эффектом при бронхоэктатической болезни, злокачественном бронхите, коклюше, бронхиальной астме, хронической пневмонии.

в) трава спырыша, лист мать-и-мачехи, цветки бузины черной (по чайной ложке). Заварить стаканом кипятка, настоять 25—30 минут. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды при бронхите, пневмонии, плеврите.

10. Деясил высокий (деятисил).

Настои корня применяются при бронхитах, кашле, коклюше, головкружении, головных болях, заболеваниях желудочно—кишечного тракта,

печени, геморрое (чайную ложку измельченного корня залить стаканом холодной кипяченой воды, настоять 10 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды). При болезнях дыхательных путей в настой добавить мед по вкусу.

11. Душица обыкновенная.

а) Настой душицы применяют при простудных заболеваниях, бронхите, коклюше, удущье, туберкулезе легких (чайную ложку травы заварить стаканом кипятка, настоять 2 часа. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день).

Трава душицы входит в состав многих сборов:

б) Трава душицы — 1 часть, корень алтея — 2 части, лист мать-и-мачехи — 2 части. Столовую ложку сбора заварить 2 стаканами кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день после еды как отхаркивающее средство.

12. Крапива.

При заболевании органов дыхания применяют так: щепотку цветов крапивы заварить 4 стаканами кипятка. Чай пить в качестве отхаркивающего средства.

13. Лук.

При кашле, бронхитах, коклюше применяют с медом (500 г измельченного лука, 400 г сахара, 50 г меда, 1 л воды, смешать, варить 3 часа на медленном огне, остудить, процедить и перелить в бутылку. Принимать по столовой ложке 4—6 раз в день. Хранить в закупоренном виде в прохладном темном месте).

14. Редька посевная.

Свежий сок редьки пьют при бронхитах, кашле, заболеваниях печени, атеросклерозе, мочекаменной болезни (по 1 столовой ложке 3 раза в день).

15. Отруби.

Вскипятить 1,8 л воды, положить туда 400 г любых отрубей. Вскипятить еще раз и варить 10 мин. Подсластить жженым сахаром. Этот отвар следует пить в течение всего дня вместо кофе, чая и всякой другой жидкости, но пить непременно очень горячим при бронхите.

БРОНХИТ ХРОНИЧЕСКИЙ

16. Мать-и-мачеха (листья, цветы) — 1 часть (1 стол. ложка), ромашка аптечная (цветы) — 1 часть, медуница или легочница — 2 части, душица (трава) — 1/2 части.

Все смешать, измельчить, 2 стол. ложки залить кипятком — 300 мл, накрыть фарфоровой тарелкой и укутать на полчаса для получения настоя. Процедить, теплое питье принимать по 150 мл. За сутки нужно принять не менее пяти порций до еды и на ночь с медом.

17. Кориандр посевной, или киндза (плоды) — 30 г, омсла белая, или "ведьмины метлы" (ветки) — 4 г, хризантема желтая или золотой цвет (цветы) — 200 г, астра татарская (корень) — 6 г.

Сухую смесь тщательно размельчить, перемешать, залить 800 мл кипятка и добавить на кончике ножа имбирь. Настоять, укутав, и пить теплым по 100 мл каждый час, а последнюю порцию — на ночь. Отвар надо принимать с медом, халвой или засахаренными фруктами.

18. Душица обыкновенная. 75 г душицы заливают 1 стаканом крутого кипятка, настаивают 15—20 мин., процеживают и пьют в теплом виде по 1/2 стакана 3—4 раза в день за 15—20 мин. до еды. Такое питье успокаивает кашель при остром и хроническом бронхите, эффективно оно и при коклюше.

19. Натереть на терке черной редьки и выжать сок через марлю. Смешать 1 л этого сока с 400 г жидкого меда и пить по 2 столовых ложки перед едой и перед сном вечером.

ВЕГЕТОНЕВРОЗЫ

1. Боярышник кроваво-красный.

а) столовую ложку сухих плодов заварить стаканом кипятка, настоять 2 часа в теплом месте (в духовке, на плите), процедить. Настой принимать по 1—2 столовые ложки 3—4 раза в день до еды при гипертонической болезни, вегетоневрозах, головокружениях, удушье, климаксе.

б) взять поровну плодов и цветков, хорошо перемешать. 3 столовые ложки смеси заварить 3 стаканами кипятка, настоять 2 часа в теплом месте, процедить. Настой принимать по стакану 3 раза в день за 30 минут до еды или через час после еды при сердечных заболеваниях, удушье, головокружениях, в начале климактерического периода до исчезновения признаков заболевания и восстановления хорошего самочувствия.

в) 10 г высушенных плодов настоять 10 дней в 100 г водки или 40-градусного спирта, профильтровать. Настойку принимать по 30 капель с водой 3 раза в день до еды.

г) 10 г цветков настоять 10 дней в 100 мл водки или 40-градусного спирта, профильтровать. Настойку принимать по 20—25 капель 3 раза в день до еды.

ВЕН РАСШИРЕНИЕ, ТРОМБОФЛЕБИТЫ

1. Лесной орех (листья, кора). Настой из листьев и коры лесного ореха: 1 столовая ложка измельченного сырья на стакан кипятка. Рекомендуется пить по 1/3—1/4 стакана 3—4 раза в день до еды при варикозных расширениях вен, флебитах и перифлебитах, трофических язвах голени и капиллярных геморрагиях.

Отвар из листьев принимать при гипертрофии (увеличении) предстательной железы.

2. Настойка: 50 г цветков или плодов каштана на 0,5 л водки 50 град. Настаивать 2 недели в теплом, темном месте, взбалтывая ежедневно. Принимать такую настойку по 30—40 капель 3—4 раза в день в течение 3—4 недель. Для лечения расширения вен и геморроя в народной медицине кроме настойки иногда употребляют свежий сок из цветков каштана по 25 капель 2—3 раза в день.

Препараты из конского каштана понижают свертываемость крови, укрепляют стенки капилляров и вен, предупреждают образование тромбов в кровеносных сосудах и способствуют рассасыванию образовавшихся тромбов, тромбы постепенно размягчаются и рассасываются.

Препараты из каштана (из плодов, цветов или коры) применяют внутрь и наружно при геморрое, спазмах сосудов, нарушении секреции желчи, хронических расстройствах пищеварения, катарактах бронхов, при подагре, ревматизме, ишиасе и для лечения тромбоза, при язвах голени и расширении вен. Экстракт рекомендуют применять и для ванн при миалгиях и невралгиях.

Горячий настой и экстракт из каштана конского является одним из самых хороших венозотонических средств. Входит в состав отечественных и иностранных препаратов для лечения при расширении и воспалении вен, флебитов и геморроя.

3. Перед сном делать теплые ножные ванны из травы сушеницы. Помогает при тромбозах и других тромбозах. Столь же полезны и общие ванны из сушеницы.

4. Женщина после удаления желчного пузыря не могла ходить. Стала отекать ноги и покрывались сеткой синие тонкие вены. Сделала настойку из свежих листьев каланхоэ на водке. Стала натирать ноги. Опухоль прошла. Синие мелкие вены исчезли, стала нормально ходить.

5. Тысячелистник, трава — 50 г. Бессмертник (цветы) — 200 г. Брусника (листья) — 100 г. Крушина (кора) — 100 г. Береза (листья) — 100 г.

1 полную столовую ложку измельченной смеси заварить 300 г кипятка. Кипятить 5 минут. Настаивать в теплом месте 4 часа. Принимать в теплом виде по 0,5 стакана 3 раза в день за 15—20 минут перед едой. Применяется при флебитах и тромбозах.

6. Упражнение, предложенное Микулиным.

Подняться на носках так, чтобы каблуки ног оторвались от пола всего на 1 см, и резко опуститься на пол. После 20 таких сотрясений перерыв 10 секунд. При каждом упражнении делать не более 60 сотрясений. В течение дня рекомендуется повторять упражнение 3—5 раз по 1 минуте продолжительностью. Делать спокойно, не спеша.

7. Болгарские рецепты при расширении вен.

Только что сорванные листья и цветочные головки полыни серебристой тщательно растереть в ступке. Столовую ложку полученного порошка соединить с таким же количеством кислого молока, размешать как следует и нанести ровным слоем на марлю, которую затем наложить на участки с расширенными венами. Лечение проводить в течение 3—4 дней. Через несколько дней можно лечение повторить.

8. Измельчить наземную часть только что сорванного мужского папоротника (Дриоптерис Филлис — мас). Смешать столовую ложку порошка с таким же количеством кислого молока. Далее действовать как с полынью.

9. Помимо лекарственных трав для лечения расширения вен можно использовать хорошо созревший помидор. Разрезать его на ломтики и приложить их к расширенным венам. Через 3—4 часа заменить ломтики свежими.

Эти 3 рецепта можно использовать последовательно один за другим, особенно в тяжелых случаях. (Журнал "Болгарская женщина" № 1 за 1978 г.).

10. При болях в ногах у людей, страдающих расширением вен, применяют теплые ножные ванны (до колена) из отвара коры вербы (ивы) и ко-

дуба продолжительностью в полчаса. После ванны надевают на ноги биндаж или резиновые эластичные чулки и отдыхают.

11. Хмель (шишки). При тромбофлебитах собирают только зеленовато-желтые шишки хмеля, сушат их. Заваривают из расчета 1—2 столовые ложки (в зависимости от веса больного) на стакан кипятка. Кипятить на малом огне 10—15 минут, процедить. Всю дозу выпивают в 2—3 приема в течение дня, лучше вечером, так как в дневное время при лечении хмелем проявляется его успокаивающее и даже снотворное действие.

ВОДЯНКА

1. Петрушка. Вымыть и нарезать 800 г петрушки, положить в эмалированную кастрюлю. Залить свежим, непастеризованным молоком. Поставить в печь или на плиту. Следует дать молоку вытопиться, но не выкипеть, до половины первоначального объема, процедить. Давать больному 1—2 столовые ложки на прием отвара через каждый час. Все приготовленное выпить в 1 день. Считают, что помогает даже тогда, когда официальная медицина помочь не в состоянии.

2. Черный таракан. Порошок из сушеных и толченых тараканов (черных) мешают с медом или какой-либо другой пищей и дают есть больному несколько раз в день. Больному желательно о тараканах не говорить.

3. 2-й вариант. Отжать сох из живых тараканов, смешать с водкой. Давать больному, начиная от 1 капли до 10 и обратно. Можно тараканов настаивать на водке. Средство с тараканами действует без промаха.

4. Горичвет весенний. 1 чайную ложку на стакан кипятка настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Значительно увеличивает выделение мочи, исчезают отеки ног. Дозировку соблюдать точно. Детям 2-летнего возраста давать по 5—6 капель, 6-летнего — по 15 капель. Горичвет усиливает диурез, чем предотвращаются отеки и регулируется деятельность сердца.

5. Льяное семя. 4 чайные ложки семени на 1 л воды. Кипятить 15 минут, настоять, укутав, 1 час, можно не цедить. Принимать по 1/2 стакана через 2 часа 6—9 раз в день горячим. Результат достигается через 2—3 недели.

6. Василек синий.

Настой цветков василька: 1—2 чайные ложки цветков заварить стаканом кипятка, настоять час, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день за 10—15 минут до еды.

7. Конопляная мякниа издревле считалась превосходным средством от водянки. Конопляная мякниа заваривается и пьется как обыкновенный чай. Однако следует заваривать этой мякниы очень много и пить ее как можно больше и чаще в течение всего дня.

8. Первое средство — кресс-салат (режуха). Его следует есть в очень большом количестве.

ВОЗБУЖДАЮЩИЕ АППЕТИТ

1. Анр болотный.

Отвар корневищ употребляют как горечь для возбуждения аппетита при желудочно-кишечных заболеваниях (чайную ложку измельченного корне-

вища залить 2—3 стаканами горячей воды, кипятить 15 минут в закрытой посуде. Пить по 2 стакана 3 раза в день перед едой, слегка подсластив).

2. Одуванчик лекарственный.

Настой корней одуванчика применяют как средство для улучшения пищеварения и для возбуждения аппетита следующим образом. 2 чайные ложки измельченного корня залить стаканом холодной воды, настоять часов. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой.

ВОЛОС УКРЕПЛЕНИЕ

Средства от перхоти

1. Никогда не мыть голову горячей водой, только умеренно теплой.
2. Никогда не мыть голову водой из-под крана. Обязательно кипятить, смягчить ее, делать отвар из трав для мытья головы.
3. Беречь голову от холода, чтобы не застуживались корни волос, беречь от жары и солнца.
4. При выпадении волос, облысении полезно систематически употреблять в пищу ягоды облепихи или пить отвар молодых веток и этим отваром мыть голову. Хорошо после мытья втирать в голову облепиховое масло — 1 раза в неделю.
5. Траву (ветки можжевельника) смешать поровну с листьями березы. Горсть смеси вскипятить в 3 литрах воды 5 минут. Укутать на час потеплее. Этим отваром мыть голову и споласкивать. Укрепляет волосы.
6. Лук. Взять небольшую головку лука, очистить ее, натереть на терке, кашицу завернуть в марлю, сложенную в несколько раз. Втирать в кожу головы. Через несколько часов промыть и сполоснуть голову. Желательно при этом остричься покороче. После нескольких процедур исчезает перхоть, пропадает зуд, волос укрепляется, цвет волос восстанавливается, волосы становятся эластичными, мягкими.
7. Луковый сок. Втирать луковый сок с коньяком и крепким сгущенным отваром корней лопуха. На одну часть коньяка следует брать 4 части лукового сока и 6 частей отвара корней лопуха. Считается в народе как хорошее средство.
8. Корень лопуха. Смесь из 20 г лопуха на 200 г воды. Варить на слабом огне до половины первоначального объема, так чтобы отвар был сгущенным. Затем смешать его пополам со свиным нутряным жиром путем подогревания, слить в горшок, закрыть крышкой, обмазать тестом и поставить в печь или духовку на несколько часов. После с остывшей загустевшей массы слить воду, если она есть. Мазь является хорошим средством дляращения волос. Еще лучше смазать кожу головы свежим соком лопуха. Выкопать корни, промыть быстро холодной водой. Очень быстро натереть на терке и отжать сок. Делают это быстро потому, что натертый корень очень быстро окисляется на воздухе и темнеет. Этот сок можно законсервировать спиртом 1:1. При втирании такого сока надо разбавлять его пополам с водой. Втирать 2—3 раза в неделю.
9. Касторовое масло смешать поровну с 96-градусным спиртом. Втирать тампоном в кожу головы. Через 3—4 часа промыть голову детским или ла-

шным мылом. Ополоснуть подкисленной водой. Подкисленная вода готовится так: в воду для ополаскивания выжимают сок 1/2 лимона или 1 столовые ложки уксуса.

10. Сбор № 1. Чабрец — 20 г, кора ивы — 20 г, кора дуба — 20 г.

1 столовых ложки смеси кипятить 15 минут в 1 л воды. Остудить, процедить. Втирать в кожу головы при выпадении волос, при перхоти и зуде кожи.

11. Сбор № 2. Кора ивы — 20 г. Корень лопуха — 20 г.

1 столовые ложки смеси кипятить 15 мин в 1 л воды. Остудить, процедить. Втирать в кожу головы при выпадении волос, при перхоти и зуде ко-

12. Сбор № 3. Листья крапивы — 30 г. Листья мать-и-мачехи — 30 г. Корневища аира — 20 г.

6 столовых ложек смеси кипятить 10 минут в 1 л воды. Укутать на 1 час теплее. Когда остынет, процедить. Отваром мыть голову 3 раза в неделю при перхоти и выпадении волос.

13. В кипяченую воду, слегка теплую — не выше 40—50 град. добавить мед: на 1 л воды 2 столовых ложки. Этой водой смачивать голову или втирать в кожу головы 2 раза в неделю. Укрепляет волосы и способствует их росту.

14. Полынь черная. Отвар черной, если им мыть лицо дважды в день, способствует росту волос (бороды) на лице.

15. Споласкивать волосы надо несколько раз теплой водой: на 1 л воды 1 чайные ложки лимонного сока или 2 столовых ложки уксуса.

16. Черноголовка обыкновенная. 3 столовые ложки травы кипятить 10 минут в закрытом литровом сосуде. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. Употреблять для мытья головы при перхоти и для ванн и обмываний при воспалительных процессах кожи. Отвар травы считается эффективным средством при перхоти головы.

17. Костяника, все растение с корнем. Отваром растения с корнем моют голову при перхоти и дляращения волос.

18. Крапива. 100 г измельченных листьев залить 0,5 л воды и 0,5 л уксуса. Варить 30 минут. Когда остынет, отжать. Этим отваром мыть голову перед сном без мыла. Болгарский рецепт.

19. Отваром из листьев березы моют голову при выпадении волос.

20. При усиленном салоотделении, перхоти, выпадении волос рекомендуется после мытья головы и подсушивания волос втереть в кожу головы настой листьев крапивы (столовую ложку листьев заварить стаканом кипятка, настоять 1,5 часа, процедить. Применять 1 раз в неделю длительное время).

21. Облепиха крушиновидная.

Настой плодов и листьев употребляют внутрь и наружно как средство, укрепляющее волосы при облысении (2 столовые ложки плодов и листьев заварить 2 стаканами кипятка, настоять 2—4 часа в плотно закрытой посуде, процедить. Пить по 150 мл 2 раза в день до еды утром и вечером. Втирать в кожу головы на ночь ежедневно.

22. Применяют также следующий сбор:

Корневища аира — 20 г, корень лопуха — 20 г, цветки ноготков — 10 г, шишки хмеля — 15 г. Смесь заварить 1 л кипятка, настоять 2 часа, процедить. Смачивать голову на ночь при выпадении волос.

ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТКОВ

1. Ромашка аптечная.

Заварить 1,5 стол. ложки сухой ромашки в стеклянной чашке, накрыть укутать. Настаивать 20 мин. За это время сделать очистительную клизму теплой водой. Отвар процеженной ромашки температурой 37 град. набрать в спринцовку № 3 и ввести в заднепроходное отверстие. После этого лечь на бок и подождать, пока всосется. Если не получится с первого раза, попробуйте еще. Отвар ромашки должен полностью всосаться. Боли сразу отступают. Эту процедуру надо проделывать каждый вечер, а при возможности — несколько раз в день. Таким способом можно заодно вылечить геморрой.

2. Сбор, применяемый при воспалении придатков: чернوبыльник, или полынь (трава) — 5 частей; вероника (трава) — 5 частей; ромашка (цветы) — 5 частей; донник (трава) — 1 часть.

5 стол. ложек смеси заварить 1 л кипятка. Дать настояться 25 мин. За это время сделать очистительную клизму. Пол-литра отвара выпить горячим на ночь, 300 мл использовать теплым (37,5 град.С) для спринцевания влагалища, 150 мл отвара ввести в заднепроходное отверстие и лечь на бок. Всего несколько дней тщательного выполнения этого рецепта принесут вам облегчение. Но для полного излечения нужно делать эту процедуру 2—3 раза в неделю в течение двух месяцев.

ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА И ДЕСЕН

1. Аир болотный (нр, ирный корень).

Теплый настой применяют для полоскания рта при воспалении слизистой оболочки ротовой полости и десен (чайную ложку нарезанного корневища на 1,5 стакана кипятка, настоять 2 часа, процедить).

2. Бадан толстолистный.

Применяют так: 2 столовые ложки измельченных корневищ залить стаканом кипятка, кипятить 30 минут на водяной бане, процедить горячим, охладить и использовать для полосканий.

3. Девясил высокий: чайную ложку измельченного корня залить стаканом кипятка, кипятить 10—15 минут на слабом огне, настоять 4 часа, использовать для полосканий.

4. Дуб обыкновенный.

Отвар коры используют для полосканий (столовую ложку измельченной коры залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на слабом огне, охладить, процедить).

ВОСПАЛЕНИЕ ТОНКИХ КИШОК

1. Оляха серая (шишки) — 20 г. Ромашка (цветы) — 20 г. Калган дикий (корень) — 10 г. Солодка (корень) — 20 г.

1 ст. ложку смеси заварить стаканом кипятка, настаивать 40 мин. Принимать теплым с медом после еды или на ночь.

ГАЙМОРИТ

1. Ментол сухой в крупишках растворить в кастрюле с кипятком. Укутаться в одеяло, дышать носом над этой кастрюлей. Процедура длится до тех пор, пока идет испарение из кастрюли.
2. Картофель в мундире. Отварить картофель в мундире, слить воду. Укутаться над кастрюлей и подышать паром картофеля.
3. Прополис, настойка на спирту. Вскипятить воду в кастрюле, влить 0,5 чайной ложки прополиса. Укутаться и подышать над этой кастрюлей.
4. Диск эбонитовый диаметром 110 мм, толщиной 10 мм с одной стороны отшлифовать. Этим диском, отшлифованной стороной, гладят по лицу (носу, щекам, подбородку) по часовой стрелке. Делают 1 оборот по лицу в течение 1 секунды. Сеанс длится 10-15 минут. Делать дважды в день. Применяется при гайморите, фронтите, головной боли, зубной боли. При зубной боли гладить больное место и некоторое время (3-5 минут) подержать над этим местом.

ГАСТРИТ

1. Фенхель, плоды — 1 часть; алтей, корень — 1 часть; ромашка аптечная — 1 часть; пырей, корневища — 1 часть; солодка, корень — 1 часть.

Все хорошо измельчить и смешать. 1 столовую ложку смеси на 1 стакан воды. Кипятить 10 минут, настаивать, укутав, 3 часа. Процедить. Принимать на ночь по 1 стакану настоя. Применяется при острых и хронических гастритах.

2. Цветы ромашки аптечной — 10 г, тысячелистник (травы) — 10 г, полынь горькая (травы) — 10 г, мята перечная (листья) — 10 г, шалфей (листья) — 10 г.

2 чайные ложки смеси на 1 стакан кипятка, настаивать, укутав, 30 минут, процедить. Принимать настой горячим по 0,5 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды. Применяется при гастритах и энтеритах.

3. Мята перечная (листья) — 20 г, золототысячник (травы) — 5 г.

2 чайные ложки смеси на стакан кипятка. Настаивать, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды. Применяется при гастритах с жалобами на печень.

4. Валериана (корни) — 10 г, вахта трехлистная (листья) — 10 г, мята перечная (листья) — 10 г, апельсин (кожура) — 10 г.

2 чайные ложки смеси на стакан кипятка. Настаивать, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1 стакану настоя 3 раза в день после еды. Применяется при гастритах с жалобами на печень.

5. Аир болотный.

Настой корневищ рекомендуется принимать при гастритах, протекающих с пониженной кислотностью, колитах, желудочных и кишечных коликах.

Чайную ложку измельченного корневища залить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

6. Сок алоэ принимают по 1-2 чайные ложки 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 1-2 месяца.

7. Гореч птичий, или спорыш, применяется в сборах:

а) трава спорыша — 4 части, трава золототысячника — 4 части, соцветия тысячелистника — 3 части, лист мяты перечной — 2 части, корень аира — 2 части, семя тмина — 1 часть, трава сушеницы болотной — 8 частей, лист подорожника — 8 частей. 2 столовые ложки смеси заварить 1 л кипятка в термосе, настоять всю ночь, утром процедить. Выпить натощак 1 стакан, а остальное разделить на 4 приема. Принимать при воспалениях желудочно-кишечного тракта, особенно при гастритах с пониженной кислотностью.

б) трава спорыша — 4 части, трава зверобоя продырявленного — 4 части, лист черники — 3 части, соцветия тысячелистника — 2 части, цветки бессмертника песчаного — 2 части, трава золототысячника — 2 части, лист мяты перечной — 1 часть, цветки ромашки аптечной — 1 часть. 4 столовые ложки смеси залить на ночь 1 л холодной воды, утром поставить на плиту, довести до кипения, кипятить 5-7 минут, настоять 20 минут в тепле, процедить, отжать. Пить по стакану 4-5 раз в день за 30 минут до еды при гастрите с пониженной кислотностью.

8. Душица обыкновенная.

Трава душицы, цветки ромашки (поровну). 2 чайные ложки смеси залить стаканом кипятка, кипятить 10 минут, процедить. Пить по стакану отвара утром и вечером при спазмах желудка и кишечника с метеоризмом.

Душица противопоказана беременным.

9. Земляника лесная.

Применяют смесь листьев и корней в виде настоя: столовую ложку смеси залить 2 стаканами холодной воды, настоять 6-8 часов, процедить. Принимать по 1/2 стакана ежедневно.

10. Зверобой продырявленный.

Часто трава зверобоя входит в состав различных сборов:

трава зверобоя — 4 части, лист подорожника — 4 части, трава сушеницы — 4 части, трава золототысячника — 2 части, лист мяты — 1 часть, трава спорыша — 2 части, корень аира — 1 часть, плоды тмина — 1,5 части, трава тысячелистника — 0,6 части. 2 столовые ложки сбора заварить 1 л кипятка, настоять 12 часов, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день через час после еды при гастритах с повышенной кислотностью.

11. Капуста белокочанная.

Сок из свежей капусты употребляют при хронических гастритах, особенно с пониженной кислотностью, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, заболеваниях печени и селезенки, ожирении. В домашних условиях сок получают путем отжимания измельченных листьев спелого кочана, принимают по 1/2 стакана 2-3 раза в день за час до еды в теплом виде. Полученный сок можно хранить в холодильнике не более двух суток. При дальнейшем хранении противоязвенный витамин полностью разрушается.

12. Лопух большой.

Применяют настой и отвар корней лопуха.

а) настой: чайную ложку измельченного корня залить 2 стаканами кипятка, настоять 12 часов, процедить. Пить по 1/2 стакана теплого настоя 4 раза в день.

б) отвар: чайную ложку измельченного корня залить стаканом кипятка, кипятить 5-10 минут на слабом огне, остудить, процедить. Пить по 1 столовой ложке отвара 3-4 раза в день.

13. Подорожник большой.

Настой и свежий сок из листьев рекомендуются при желудочно-кишечных заболеваниях (гастритах, язве желудка и 12-перстной кишки, энтеритах, энтероколитах, коликах, метеоризме, поносах, коликах). Столовую ложку сухих измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 10 минут, процедить. Выпить за 1 час глотками — суточная доза. Хорошо мытые листья нарезать, намять, выжать сок, смешать его с равным количеством меда, варить 20 минут. Принимать по 2-3 столовые ложки в день. Хранить в хорошо закрытой посуде в прохладном темном месте.

14. Ревень волнистый.

При гастритах с пониженной кислотностью ревень в малых дозах (0,05—0,2 г) оказывает вяжущее действие. Принимают порошок из высушенного корня ревеня, заготовленного осенью. Корни промывают в воде, режут на куски, провяливают на солнце и сушат при температуре не выше 60°.

15. Салат посевной — однолетнее растение.

Настой листьев употребляют при хроническом гастрите (столовую ложку измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 1-2 часа, процедить. Пить по 1/2 стакана 2 раза в день или по стакану на ночь).

16. Смородина черная.

Свежий сок пьют при гастритах с пониженной кислотностью, принимают по 1/4 стакана сока 3 раза в день.

17. Тысячелистник обыкновенный.

а) отвар травы употребляют при хронических гастритах и язвенной болезни (чайную ложку залить 250 г кипятка, кипятить 5—10 минут на слабом огне, процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день в течение 25—30 дней).

Тысячелистник применяют в сборе при гастритах с повышенной кислотностью:

б) трава тысячелистника — 2 части, трава зверобоя — 2 части, цветки ромашки аптечной — 2 части, трава чистотела — 1 часть. Столовую ложку сбора заварить стаканом кипятка. Принимать по 1/3 стакана 4 раза в день.

18. Вещества, содержащиеся в плодах аронии и в соке, получаемом из них, увеличивают кислотность желудочного сока, поэтому полезны больным анацидным гастритом.

ГАСТРИТ, ДИСПЕПСИЯ ПЛОХОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ, ИЗЖОГА ГАЗЫ В ЖЕЛУДКЕ

Лекарство самое простое: сок сырой картошки. Надо пить 1 стакан сока сырой картошки утром натощак. После присма сока надо лечь в по-

тель на полчаса. Через час можно завтракать. Так делать 10 дней подряд. Затем 10 дней пропустить и снова повторить 10-дневное лечение.

Этот способ лечения очень часто приносит хорошие результаты.

ГЕМОРРОЙ

1. Противогеморройный сбор. Крапива (лист) — 1 часть, крушина, (ра) — 1 часть.

8 г смеси на 1 л кипятка. Кипятить 10 минут на слабом огне, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1 стакану 4 раза в день при сильных болях без шипшек.

2. Горец почечуйный (геморройная трава).

2 чайные ложки сухой травы на 0,5 л воды. Кипятить 15 минут на слабом огне, настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день, за 30 минут до еды. Применяется как мочегонное, нежное слабительное, болеутоляющее и кровоостанавливающее средство.

3. Тысячелистник, трава с вершушками.

15 г травы с цветками на стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день до еды. Можно принимать и без дозировки, если 1 столовую ложку травы настоять в 0,5 л кипятка. Свежий сок тысячелистника пополам с медом принимать 3 раза в день по 1 чайной ложке. При длительном лечении это — радикальное средство. Тысячелистник применяется как потогонное, мочегонное и кровоостанавливающее средство и очень эффективен в борьбе с геморроем на начальной стадии и при кровотечениях. Настойка тысячелистника на воде или спирте. Принимать по 30 капель 3 раза в день.

4. Картофель сырой. Из картофеля вырезать свечку и при геморрое вставлять в задний проход. Если сильно сушит, то обмакнуть картофельную свечу в мед.

5. Мед засахаренный. Вставить в задний проход свечку из засахаренного меда.

6. Вода холодная. 1 л колодной воды налить в таз и сделать сидячую ванну от 1 минуты до 5 минут. Делать 2 раза в день — утром и вечером. Хорошо в эту воду бросить несколько крупинок марганцовки, так чтобы вода была нежно-розового цвета. В холодной воде мочить тряпочки и прикладывать на шишки, когда они нагреются — сменить. Применение холодной воды при геморрое очень хорошо облегчает состояние больного.

7. Рябина красная. Из зрелых ягод рябины красной отжать сок. Принимать по 75-100 г сока 3 раза в день, можно добавить в него мед или сахар. Запивать холодной водой. Прекрасное послабляющее средство. Замечено, что от приема сока раскрывается закрытый геморрой и наступает облегчение.

8. Пиявки медицинские ставят на геморройные шишки от 3 до 10 штук. Больной быстро получает облегчение.

9. Зверобой продырявленный.

Применяют в виде отвара: столовую ложку измельченной травы залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на слабом огне, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.

10. Земляника лесная.

Отвар листьев применяют для клизм и обмываний (столовую ложку листьев заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить).

11. Калина обыкновенная.

При геморроидальных кровотечениях употребляют отвар коры (4 чайные ложки измельченной коры залить стаканом воды, кипятить 30 минут, процедить горячим, долить воды до первоначального объема и принимать по столовой ложке 3 раза в день до еды).

12. Капуста.

Рассол квашеной капусты пьют от 1/2 до 2 стаканов в теплом виде.

13. Каргана гривастая.

Применяют внутрь отвар надземной части (столовую ложку измельченного лекарственного сырья залить стаканом кипятка, настоять на водяной бане 30 минут, процедить, принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день).

14. Костяника каменная.

Отвар листьев готовят так: столовую ложку листьев залить стаканом горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить. Пить по столовой ложке 3-4 раза в день.

15. Крапива двудомная.

а) столовую ложку сухих листьев крапивы залить стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне, остудить, процедить. Пить по столовой ложке 4-5 раз в день.

б) 2 столовые ложки сухих листьев крапивы заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 2 раза в день.

16. Кровохлебка лекарственная.

Отвар корней пьют при геморроидальных кровотечениях: столовую ложку измельченных корней залить стаканом воды, кипятить 30 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить. Принимать по столовой ложке 5 раз в день до еды.

17. Лук репчатый.

Применяют свежий сок лука по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.

18. Одуванчик лекарственный.

2 чайные ложки измельченного корня залить стаканом холодной кипяченой воды, настоять 8 часов. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой.

19. Ромашка аптечная.

Наружно настой используют для промываний при геморрое (2-3 столовые ложки заварить стаканом кипятка, настоять 1 час в хорошо закрытой посуде, процедить).

20. Ячмень.

Настой ячменного солода употребляют при геморрое (семена ячменя поместить в теплую, влажную среду и, когда они прорастут, высушить их. 2 столовые ложки измельченных сухих проростков ячменя залить 1 л кипятка, настоять 4 часа. Пить по 1/2 стакана 4-6 раз в день, добавив сахар).

21. Хвощ полевой.

Настой травы применяют при геморроидальных кровотечениях. Готовят настой так: 2 чайные ложки измельченной травы заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Выпить глотками в течение дня.

22. Ментол — 2,5 г; новокаин — 1,5 г; анестезин — 1,5 г; спирт 96° — 100 мл.

Метод употребления: ватой, смоченной вышеуказанным составом, мазать больное место два раза в день. Если больной почувствовал кратковременное жжение, то не надо бояться, т. к. это пройдет быстро.

Больная, страдающая геморроем 15 лет, излечилась от него за 3 дня.

23. Коровяк.

Цветы коровяка следует заваривать в чайнике и пить как чай. Кровотечение останавливается через 2-3 дня, а еще через несколько дней болезнь исчезает совершенно.

24. Картофель.

Натереть сырую картофелину, выжать сок в столовую ложку и маленькой спринцовкой ввести на ночь. Срок лечения 10 дней.

П р и м е ч а н и е

При геморрое:

- следить, чтобы не было запоров;
- не раздражать желудок спиртными напитками, пивом, не есть соленого, острого, пряного;
- остерегаться простуды, особенно нижней части тела;
- избегать продолжительной ходьбы и работы стоя;
- никогда не садиться на холодное место, особенно на металл;
- после каждого туалета подмываться холодной водой;
- ставить ежедневно вечером клизмы из ромашки или из сушеницы.

ГЕПАТИТЫ

1. Аир болотный.

При гепатитах применяют настой корневищ, который готовят так: чайную ложку измельченного сырья залить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить 4 раза в день по 1/2 стакана за 30 минут до еды.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

1. Пустырник (трава) — 3 части. Сушеница (трава) — 2 части. Багульник (трава) — 2 части. Почечный чай — 1 часть.

1 полную столовую ложку сбора заварить в 300 мл кипятка. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 4 часа, процедить. Принимать в теплом виде 3-4 раза в день, по 0,5 стакана за 20 минут до еды. Применяется при гипертонической болезни 1 и 2-й стадии и при симптоматических гипертониях без сердечной недостаточности.

2. Адонис (трава) — 1 часть, боярышник (цветы) — 1 часть, березовые листья — 1 часть, пустырник (трава) — 2 части, сушеница (трава) — 2 части, хвощ полевой (трава) — 1 часть.

2 столовые ложки измельченной смеси на 500 мл кипятка, настоять, укутав, 5-6 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой.

жид едой в теплом виде. Применяется при гипертонической болезни 1 и 2-й стадии при симптоматических гипертониях, осложненных сердечной недостаточностью 1 и 2-й степени в стадии компенсации и субкомпенсации.

3. Пустырник (трава) — 3 части, сушеница (трава) — 3 части, багульник (трава) — 2 части, хвощ полевой (трава) — 1 часть, крушина (кора) — 1 часть.

2 столовые ложки смеси (измельченной) на 500 мл крутого кипятка. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. Применяется при гипертонической болезни и ожирении.

4. Адонис (трава) — 1 часть, боярышник (плоды) — 1 часть, мята перечная (трава) — 2 части, пустырник (трава) — 3 части, сушеница (трава) — 2 части, почечный чай — 1 часть.

2 столовые ложки измельченной смеси залить 500 мл крутого кипятка. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. Применяется при гипертонической болезни 1 и 2-й стадии и при симптоматических гипертониях со стенокардией.

5. Пустырник (трава) — 1 часть, сушеница (трава) — 1 часть, боярышник (цветы) — 1 часть, листья омелы (трава) — 1 часть.

4 столовые ложки смеси настоять 8 часов в 1 л кипятка, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день, через час после еды. Применяется при гипертонической болезни.

6. Боярышник кроваво-красный.

Применяют в виде сборов цветки и плоды.

а) цветки боярышника, трава пустырника, трава сушеницы, лист омелы (всек поровну), 4 столовые ложки измельченной смеси заварить 1 л кипятка, настоять 8 часов, процедить. Настой принимать по 1/2 стакана 3 раза в день через час после еды при гипертонии.

б) плоды и цветки боярышника, трава пустырника, трава сушеницы, трава василистника, плоды шиповника (всек поровну).

4 столовые ложки смеси заварить 1 л кипятка, настоять 8 часов, процедить. Настой принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день при гипертонии.

в) плоды боярышника — 3 части, цветки боярышника — 3 части, трава хвоща полевого — 3 части, трава омелы — 3 части, измельченные луковички чеснока — 3 части, цветки арники — 1 часть.

Столовую ложку измельченной смеси заварить стаканом кипятка, настоять 6-8 часов, процедить. Настой принимать по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды при гипертонии.

7. Брусника обыкновенная.

В народной медицине применяют сок из ягод при легкой гипертонической болезни.

8. Валериана лекарственная.

При гипертонической болезни 1-й стадии как проявлении общего невроза применяют в виде настоя, отвара и порошка:

а) настой валерианы: 10 г корней и корневища заливают 200 мл кипящей воды, кипятят 30 минут, затем настаивают 2 часа, принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.

б) отвар валерианы: 10 г корней и корневищ измельчают (длина частиц должна быть не более 3 мм), заливают 300 мл воды комнатной температу-

ры, кипятят 15 минут и охлаждают. Принимают по полстакана 3 раза в день.

а) порошок валерианы: толкут корни а ступке. Принимают по 1-2 г порошка 2-4 раза в день.

Эффективность валерианы оказывается более высокой при систематическом и длительном ее применении авиду медленного развития максимального лечебного эффекта.

9. Жимолость голубая.

Является весьма эффективным средством против гипертонии. Используют с этой целью свежие ягоды.

10. Календула лекарственная.

Для достижения гипотензивного эффекта необходимо длительно применять настойку календулы (20:100 на 40-градусном спирте). Принимают по 20-30 капель 3 раза в день. При этом отмечается исчезновение головных болей, улучшение сна и повышение работоспособности.

11. Картофель.

При гипертонии едят печеный картофель "а мундире" вместе с кожурой.

12. Клевер луговой.

Настой цветков применяют при гипертонии (столовую ложку цветков заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана 3.раза в день).

13. Лук репчатый.

При гипертонии едят свежие луковицы.

14. Чеснок.

При склеротической форме гипертонии применяют свежий чеснок (2-3 зубка ежедневно).

15. Салат посевной.

Употребляют настой листьев (столовую ложку измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 1-2 часа, процедить. Пить по 1/2 стакана 2 раза в день или по 1 стакану на ночь).

16. Свекла красная.

Сок свеклы с медом (пороану) рекомендуется при гипертонии (по столовой ложке 4-5 раз в день).

17. Смородина черная.

Варенье и отвар сушеных плодов применяют при гипертонии.

Отвар готовят так: 2 столовые ложки сушеных плодов залить стаканом горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/4 стакана отвара 4 раза в день.

18. При гипертонии применяют также сбор:

плоды малины — 2 части, трава душицы обыкновенной — 2 части, цветки липы сердцевидной — 2 части, лист мать-и-мачехи — 2 части, лист подорожника большого — 2 части, корень солодки голой — 1 часть, плод мордовника обыкновенного — 1 часть, трава буковицы лекарственной — 1 часть, трава и семена укропа огородного — 3 части, плоды аниса — 3 части, трава мелиссы лекарственной — 3 части, трава пустырника пятилопастного — 3 части, плоды боярышника кроваво-красного — 4 части, плоды шиповника (истолочь) — 5 частей, трава бессмертника песчаного — 5 частей, трава сушеницы топяной — 6 частей. Принимать при гипертонической болезни. Способ приготовления и применения:

половую ложку измельченного сбора заварить 2,5 стакана кипятком 30 минут, процедить. Принимать по 150 мл настоя 3 раза в день за 10-15 минут до еды. Вкус настоя приятный, запах ароматный.

19. Омела белая.

Одноразовая доза — 4 г (1 стол. ложка с верхом). Омелу заваривают кипятком и варят на водяной бане 12-20 мин. Отвар почти не имеет вкуса, без запаха. Можно заваривать вместе с чаем. Омела хорошо регулирует нарушенный обмен веществ. Омела снижает артериальное давление, повышает диурез, обладает противошоковым эффектом. Само растение, порошковое и высушенное, — прекрасное средство для поднятия тонуса у ослабевших людей пожилого возраста.

20. Спирт — 100 мл, ментол — 2,5 г, новокаин — 1,5 г, анестезин — 1,5 г.

Этой смесью протереть на ночь шею, что даст неожиданные результаты, снижая артериальное давление.

21. Взять валериановыс капли, т.е. настойку (большой концентрации) без примеси и нюхать перед сном в течение 1-1,5 мин. в каждую ноздрю. Продолжительность 2-4 месяца.

На людей с высоким артериальным давлением валериана не оказывает быстрого и заметного действия, затем она начинает благотворно снижать артериальное давление.

22. Арония черноплодная.

Сок, получаемый из плодов, способствует снижению кровяного давления, поэтому людям, страдающим гипертонией, рекомендуется 3 раза в день съедать по 100 г ягод или выпивать 50 мл сока.

23. Свекольный сок.

Свекольный сок — 1 стакан, мед — 1 стакан, все хорошо смешать и пить по 1 ст. ложке 3-4 раза в день перед едой.

ГИПЕРТРОФИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. Лук репчатый.

Лук употребляют в свежем виде.

ГИПОТОНИЯ

1. Татарник колючий.

20 г сухих цветочных корзинок и листьев на стакан воды. Кипятить 10 минут на слабом огне, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день для поднятия тонуса и повышения кровяного давления. Можно заварить одни листья.

2. Лимонник, настойка.

Принимать по 20-30 капель 2 раза в день натощак перед завтраком и обедом за 30 минут до еды. Принимать на 1 столовую ложку воды.

3. Левзея сафлоровидная (маралий корень), настойка, жидкий экстракт.

Принимать экстракт по 20-30 капель 2 раза в день натощак, перед завтраком и обедом за 30 минут до еды. Настойку принимать по 30-40 капель так же.

4. Цмин песчаный (бессмертник).

10 г бессмертника на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Принимать по 1/3—1/2 стакана 2—3 раза в день за 30 минут до еды в охлажденном виде.

5. Золотой корень (родиола розовая), настойка.

Принимать по 20—40 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды, в течение 10—20 дней.

6. Жень-шень, настойка.

Принимать от 5 до 20 капель 2 раза в день, утром и в обед до еды, в течение 2—3 недель.

ГЛАЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Василек синий.

Примочки из настоя цветков применяют как противовоспалительное и дезинфицирующее средство при воспалении слизистой оболочки глаз (1—2 чайные ложки цветков заварить стаканом кипятка, настоять час, процедить).

2. Костяника каменистая.

При воспалении конъюнктивы к глазам прикладывают листья растения.

3. Ромашка аптечная.

Настой травы и цветков ромашки используют для промывания глаз при воспалении (2—3 столовые ложки заварить стаканом кипятка, настоять 1 час в хорошо закрытой посуде, процедить).

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

1. Мята перечная — 1 часть, душица — 1 часть, кипрей — 1 часть.

1 столовую ложку смеси на 500 мл кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1/2—1 стакану при головных болях.

2. Мелисса.

15 г травы на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1—2 столовой ложке 5—6 раз в день. Применяется при болях в сердце, сердцебиениях, бессоннице, коликах в животе, вздутии кишечника, почечных коликах, головокружении, головной боли, шуме в ушах, малокровии, как средство, успокаивающее нервную систему, болезненных месячных.

3. Душица (трава).

1 столовую ложку сухой травы на 0,5 литра кипятка. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 0,5—2 стакана 2—3 раза в день при головной боли. Беременным женщинам пить нельзя.

4. Ментоловое масло.

Аптечный препарат. При простуде и насморке с головной болью помазать ментоловым маслом лоб, виски, за ушами, затылок. Хорошо снимают головные боли в начале заболевания.

5. Чай зеленый или корица.

Сделать хорошую заварку из зеленого или черного чая, добавить ту щепотку мяты. Выпить бокал такого чая. Через 15—20 минут проходит головная боль.

6. Брусника обыкновенная.

В народной медицине используют свежие ягоды.

7. Бузина сибирская.

Применяют настой цветков бузины: столовую ложку сухих цветков заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать по 1/4 стакана (лучше с медом) 3—4 раза в день за 15 минут до еды.

8. Валериана лекарственная.

Применяют в виде настоев и отваров. Эффективность валерианы оказывается более высокой при систематическом и длительном применении.

в) настой: столовую ложку измельченного корня залить стаканом холодной воды, настоять 6—8 часов, процедить. Принимать по столовой ложке 3 раза в день.

б) отвар: столовую ложку измельченного корня залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на водяной бане, настоять 10 минут, процедить. Принимать по столовой ложке 3 раза в день.

9. Девясил высокий.

Настой корня применяют 4 раза в день по 1/4 стакана за 30 минут до еды: чайную ложку измельченного корня залить стаканом воды, настоять 10 часов, процедить.

10. Зверобой продырявленный.

При головных болях пьют отвар травы: столовую ложку травы залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.

11. Калина обыкновенная.

Свежий сок пьют при головных болях.

12. Капуста белокочанная.

Помогает прикладывание свежих листьев к голове.

13. Картофель.

Сок свежего картофеля пьют по 1/4 стакана при систематических головных болях.

14. Клевер луговой.

Применяют настой цветков: столовую ложку цветков заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.

15. Клубника полевая.

В народной медицине свежие ягоды применяют при головной боли.

16. Сирень обыкновенная.

Свежие листья прикладывают к больному участку при головной боли.

17. Смородина черная.

Применяют по 1/4 стакана свежего сока при сильных головных болях 3 раза в день.

ГОРЕЧЬ ВО РТУ

1. Льняное семя растереть, чтобы получить 1 ст. ложку муки, заварить как жидкий кисель и пить утром и вечером до еды.

ГРИПП, ПРОСТУДА

1. Рецепт старого русского агронома Болотова:

Буквица, (трава) — 1 часть, ромашка аптечная — 1 часть, шалфей — 1 часть.

Все измельчить в хорошо смешать. 1 столовую ложку смеси с верхом (1 щепотку) на 0,5 литра кипятка. Настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. На ночь выпить 2—3 чашки горячего настоя с медом. Днем пить, как чай в течение дня. Если простуда с головной болью, то добавить мяты — 1 часть к основному сбору. Если простуда с промерзанием, то добавить цветков черной бузины — 1 часть к основному сбору. Приготовление и прием так же, как указано выше.

2. Шиповник. Сухие ягоды растолочь. 5 столовых ложек ягод на 1 литр холодной воды. Поставить на огонь, прокипятить 10 минут. Настоять, укутав, 8—10 часов, процедить. Пить рано с утра по 1 стакану через каждые 2—3 часа в течение суток. Пить с медом, вареньем, сахаром. Можно заварить погуще. Желательно в этот день ничего не есть. После каждого приема полоскать рот теплой водой, иначе кислота разъедает зубы. Желательно при гриппе пить шиповник в течение недель, постепенно снижая количество приемов.

3. Полынь, настойка на водке. В четвертинку водки насыпать травы полыни горькой. Настоять 21 день в темном месте, процедить. Принимать при простуде и промерзании по 20 г 1 раз в день. Принимать 2—3 дня, не более.

4. Цветы липы — 1 часть, плоды калины — 1 часть.

2 столовые ложки смеси на 2 стакана кипятка. Кипятить 5—10 минут, процедить. Пить горячим на ночь по 1—2 чашки. Применяется при ревматизме, гриппе и простудных заболеваниях.

5. Плоды малины — 40 г, листья мать-и-мачехи — 40 г, душица, (трава) — 20 г.

Способ приготовления и применения — как в рецепте № 4.

6. Мята перечная (листья) — 1 часть, бузина черная (цветки) — 1 часть, липа (цветы) — 1 часть.

Способ приготовления и применения — как в рецепте № 4 (только брать 1 столовую ложку смеси на 2 стакана кипятка).

7. Липа (цветы) — 1 часть, черная бузина (цветы) — 1 часть.

2 столовые ложки смеси на стакан кипятка, кипятить 5—10 минут, процедить. Выпить горячим в один прием при гриппе и простудных заболеваниях.

8. Брусника обыкновенная.

а) в народной медицине при гриппе применяют ягоды брусники в виде морсов. При простудных заболеваниях пьют также настой одностебельных веточек, столовую ложку травы залить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 4—5 раз в день.

Применяют бруснику в сборе:

б) все растения брусники, все растения земляники (поровну), столовую ложку смеси залить стаканом воды, довести до кипения. В отвар добавить мед (по вкусу) в пять горячим по стакану 3—4 раза в день при простудных заболеваниях.

9. Чеснок.

При гриппе применяют свежий чеснок по 2—3 зубка ежедневно (также и для профилактики в период эпидемии).

10. Малина обыкновенная.

от настой сухих плодов применяют при простудных заболеваниях, гриппе (столовую ложку плодов заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут. Пить по стакану горячего настоя 2 раза в день).

Плоды малины входят в состав различных потогонных и других сборов: б) плоды малины, цветки липы (поровну). Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по стакану горячего настоя на ночь как потогонное.

в) плоды малины, цветки липы, лист мать-и-мачехи, плоды аниса, кора ивы (все по поровну). Столовую ложку измельченной смеси заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по стакану горячего настоя на ночь при гриппозном состоянии как потогонное.

г) плоды малины — 2 части, лист мать-и-мачехи — 2 части, трава душицы — 1 часть. Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана горячего настоя 3—4 раза в день, как потогонное.

д) плоды малины — 1 часть, лист малины — 2 части, трава душицы — 1 часть, лист мать-и-мачехи — 2 части. Столовую ложку измельченной смеси заварить двумя стаканами кипятка, кипятить 5—10 минут на слабом огне, процедить. Пить по 1/2 стакана горячего отвара 3—4 раза в день перед едой при простудных заболеваниях как потогонное отхаркивающее средство.

ДЕРМАТИТ

1. Хмель.

Хорошо смешать шишки хмеля с чередой — по 1 ч. ложке той и другой травы. Залить смесь 150 мл кипятка, настоять, укутав, процедить и выпить в один прием горячим перед едой и особенно на ночь. Места экземы обложить смоченной в этом растворе марлей.

2. Растертые шишки светло-зеленого цвета заварить кипятком: на 1/4 стакана шишек стакан кипятка. Настоять, укутав, полчаса и пить по 50 мл перед едой.

ДИАБЕТ

1. Крапива двудольная.

Для приготовления настоя 50 г листьев крапивы заливают 500 мл кипятка, при этом лучше использовать эмалированную посуду. Спустя 2 часа настой процедить и пить по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. Лучше заваривать свежие листья. Из молодой крапивы можно приготовить щи и разные витаминные салаты.

2. Стручки фасоли.

Собирают в августе и используют в виде отвара: 15—20 г стручков варят в течение 3—4 часов в 1 л воды до половины объема. Полученный отвар следует остудить, процедить и принимать по 1/2 стакана за 30 минут до еды 3—4 раза в день в течение 3—4 месяцев.

3. Корень одуванчика.

1 чайную ложку мелко нарезанного корня заваривают как чай в стакане кипятка, настаивают 20 минут, охлаждают, процеживают. Принимают по 1/4 стакана 3—4 раза в день.

4. Листья ореха грецкого.

Для приготовления настоя 1 столовую ложку измельченных листьев заливают стаканом кипятка, кипятят 20—30 секунд, настаивают, процеживают и принимают в течение дня. Можно также использовать перегородки грецкого ореха. Для этого перегородки от 40 штук грецких орехов заливают стаканом кипятка и томят на водяной бане в течение 1 часа. Внутренняя кастрюля должна быть стеклянной или эмалированной. Затем следует остудить, процедить и принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды.

5. Козлятник лекарственный (галега).

Способ приготовления: 1 столовую ложку сухой травы прокипятить 10—15 секунд в 250 г кипятка, затем процедить, отжать и пить по 0,5 стакана 3—4 раза в день до еды. Использовать козлятник лекарственный необходимо под контролем врача. Необходимо отметить, что растение способствует повышению артериального давления.

6. Осина, кора.

Начальная стадия диабета. 1 столовую ложку сухой измельченной коры осины кипятить 30 минут на малом огне в 2 стаканах воды. Настоять, укутав, 2—3 часа, процедить. Принимать по 1/5—1/4 стакана 3 раза в день до еды. Пить до 3 месяцев и более. Хорошо помогает в начальной стадии диабета.

7. Черника, лист.

1 столовую ложку сухих листьев черники на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Принимать по стакану настоя 3 раза в день в охлажденном виде небольшими глотками. Применивается при начальной стадии диабета.

8. Свекла красная.

Свежий сок свеклы пьют при диабете по 1/4 стакана 4 раза в день.

9. Черника.

Настой пьют при нетяжелых формах сахарного диабета. Находящийся в листьях неомертвиллин значительно понижает содержание сахара в крови (1 чайную ложку измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут на горячей плите, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день).

10. Сбор.

Лопух (корни) — 1 часть, фасоль стручковая, сухие створки — 1 часть, черника (лист) — 1 часть. 60 г сбора настаивать в литре колодезной воды 12 часов. Затем кипятить 5 минут, настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 3/4 стакана 5 раз в день через час после еды.

11. Брусника обыкновенная.

При диабете благотворное действие оказывают свежие ягоды брусники.

12. Голубика болотная.

В народной медицине применяют отвар молодых побегов и листьев (1 столовую ложку травы заварить стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить. Принимать по столовой ложке 3 раза в день).

13. Сбор.

Черника (лист) — 1 часть. Фасоль стручковая, сухие створки — 1 часть. Лен (семена) — 1 часть. Овсяная солома — 1 часть.

3 столовые ложки сбора на 3 стакана воды. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Принимать по 1/4 стакана 6—8 раз в день.

14. Трава хвоща полевого — 20 г, трава горца птичьего — 20 г, трава земляники — 20 г. Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, кипятить 3—5 минут, настоять 10—15 минут. Процедить. Принимать по столовой ложке за 20—30 минут до еды 3—4 раза в день.

15. Листья черники — 25 г, листья одуванчика — 25 г, трава галеги лекарственной — 20 г. Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, прокипятить 5 минут, настоять, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2—3 раза в день перед едой за 20 минут.

16. При диабете 2—3 измельченных луковицы залить 2 чашками теплой воды, выдержать 7—8 часов, процедить и пить настой по чайной чашке 3 раза в день перед едой.

17. Листья черники — 25 г, трава галеги лекарственной — 25 г, листья крапивы двудомной — 25 г. Одну столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка. Прокипятить 15 минут, настоять 5 минут, процедить. Принимать по 1—3 столовые ложки 3—4 раза в день перед едой за 20 минут.

18. Хвощ полевой.

Для приготовления отвара берут 30 г хвоща полевого, заливают 1 стаканом кипятка, кипятят 5—7 минут, затем настаивают 2—3 часа. После процеживания через марлю принимают по 2—3 столовые ложки 3—4 раза в день перед едой.

Хвощ полевой можно использовать в свежем виде (салаты, начинка для пирогов), а также в виде настоя.

Салат из хвоща полевого: 2 стакана мелко порезанных листьев полевого хвоща смешать с 50 г зеленого лука, шавелем 20 г, можно добавить 40—50 г листьев одуванчика. Заправить либо растительным маслом, либо сметаной. По вкусу посолить.

Пестики полевого хвоща можно добавлять в окрошку.

19. Шиповник.

Для приготовления отвара берут 10 измельченных плодов шиповника, заливают 1 стаканом кипятка, кипятят 3—5 минут, настаивают 4—5 часов, после процеживания отвара принимают по 1/2 стакана 3—4 раза в день.

20. Листья пустырника — 10 г, листья земляники — 15 г, листья шелковицы — 20 г.

Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, кипятить 3—5 минут, настоять в течение часа. Процедить, принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день после еды.

21. Листья черники — 50 г, стручки фасоли — 50 г, трава галеги — 50 г, листья мяты — 50 г.

2 столовые ложки сбора залить 0,5 л крутого кипятка и настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

ДИЗЕНТЕРИЯ

1. Куриный желудок, пленка.

При обработке кур обмыть желудок внутри, обдать горячей водой, аккуратно отделать его от мяса, промыть и положить сушить на чистую бу-

магу. На следующий день он высохнет. Прв поносак пленку желудка растолочь в порошок и принять, запив водой. Принимать 2—3 раза в день. Прекрасное средство при любых поносах, даже кровавых и дизентерии. Хранить пленки желудков в коробке.

2. Чай.

Сухую заварку черного или зеленого чая (половина чайной ложки) пожевать и слегка запить водой. С 1—2 раз останавливает понос.

3. Кровохлебка лекарственная, корень.

1 столовую ложку измельченного корня на стакан кипятка. Кипятить 30 минут, процедить. Принимать 4—6 раз в день по 1 столовой ложке отвара на 1/4 стакана воды. Применяется при лечении острой дизентерии, геморроя, при желудочно-кишечных заболеваниях, как вяжущее, противопосное и сильное бактерицидное средство. Останавливает различные внутренние кровотечения.

4. Крахмал картофельный.

1 чайную ложку крахмала развести в 0,5 стакана холодной кипяченой воды. Хорошо размешать и выпить за один прием. Хорошо и скоро помогает.

5. Рис.

Рисовый отвар или рисовая каша, сваренная на воде вкрутую без соли, прекрасно помогает взрослым и детям при поносах.

6. Ежевика, листья.

1 столовую ложку листьев или веточек ежевики на стакан кипятка. Дать прокипеть 3—5 минут, укутать на 30—40 минут, процедить. Принимать 0,5—1 стакан на прием 2—3 раза в день. Результаты неплохие.

7. Горец змеевидный, корень (раковая псыка, змеевик, завязный корень). 5 г измельченного корня на 200 г кипятка. Кипятить 20 минут на малом огне, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 2—3 раза в день или в виде порошка при кровавых поносах. Порошок замешивают на меде и делают из него пилюли весом 0,5—1 г, которые принимают 3 раза в день.

8. Алоэ древовидное.

Сок алоэ применяют внутрь по 1—2 чайной ложке 2—3 раза в день за 30 минут до еды.

9. Голубика.

Ценится в народной медицине как противодизентерийное средство в виде отвара сухих ягод.

10. Горец птичий (спырыш).

Применяют в виде отваров и в сборах:

Столовую ложку измельченной травы спырыша залить 0,5 л горячей воды, кипятить 10 минут, остудить, процедить. Пить по 1/2 стакана 3—4 раза в день при воспалении желудочно-кишечного тракта в дизентерии.

11. Трава спырыша —1 часть, трава лапчатки гусиной —1 часть, лист подорожника —2 части. 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканам кипятка, настоять 30—40 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды при поносе.

12. Дуб обыкновенный.

Настой коры применяют при воспалении желудочно-кишечного тракта, поносах, дизентерии (чайную ложку измельченной коры залить 2 ста-

клинами холодной кипяченой воды, настоять 8 часов, процедить. Выпить глотками в течение дня. Детям не назначать).

13. Рябина сибирская.

Свежие плоды и сок рябины применяют при дизентерии (по 100 г плодов принимать 3 раза в день за 20—30 минут до еды; рябиновый сок из отжатых ягод принимать по 1/4 стакана 2—3 раза в день за 30 минут до еды).

Применяется в сборе:

14. Корневища вира, корь дуба, трава тимьяна, лист ореха грецкого (поровну). Чайную ложку смеси настоять 6 часов в стакане холодной воды, затем выпить 10—15 минут на слабом огне, процедить. Выпить глотками в течение дня при поносе.

15. Овсяные хлопья употребляют при воспалении желудочно-кишечного тракта, поносе, заболеваниях печени и сердца (100 г овсяных хлопьев залить 1 л колодной воды, настоять 4 часа, затем варить до густоты).

16. Свежие плоды черники.

а) при желудочно-кишечных расстройствах принимают по 50—100 г свежих плодов черники или настой из сухих плодов (4 чайные ложки сухих плодов настоять 8 часов на стакане воды комнатной температуры. Выпить в течение дня глотками).

Плоды черники входят в состав вяжущих сборов:

б) плоды черники — 2 части, корневище лапчатки — 1 часть, цветки бессмертника — 1 часть, плоды тмина — 1 часть, лист шалфея — 3 части. Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, кипятить 10 минут, после охлаждения процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 15—20 минут до еды.

в) плоды черники — 2 части, плоды черемухи — 3 части. Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, кипятить 20 минут на слабом огне, процедить. Принимать по 1/4—1/2 стакана 3 раза в день.

17. Готовят также сбор:

Плоды рябины — 4 части, трава зверобоя — 3 части, корень алтея — 2 части. Столовую ложку смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять 40—60 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день при поносах.

18. Черемуха обыкновенная.

в) отвар плодов черемухи употребляют при гастритах, колитах, дизентериях, поносе (столовую ложку плодов черемухи заварить стаканом кипящей воды, кипятить 5 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить. Пить по 1/4 стакана 2—3 раза в день).

б) плоды входят в состав желудочного (вяжущего) чая (плоды черемухи — 3 части, плоды черники — 2 части, корневище лапчатки — 1 часть. 2 столовые ложки измельченной смеси залить 2 стаканами кипятка, кипятить 10 минут, процедить. Пить 1/4 стакана 3—4 раза в день до еды).

ДИФТЕРИЯ

1. Алоэ древовидное.

Применяют сок растения по 1—2 чайные ложки 2—3 раза в день.

ЖЕЛТУХА

1. Кора ивы.

60 г сушеной и измельченной коры ивы кипятить в 1 литре воды 15—20 минут, настоять, укутав, сутки, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.

2. Бессмертник.

25 г бессмертника кипятить в 1 литре воды до половины объема, то есть до 0,5 литра. Когда остынет, процедить. Принимать до полного выздоровления.

3. Сок квашеной капусты. Ежедневно с утра пить сок по стакану через каждые 2—3 часа. Принимать до полного выздоровления. Обычно на это уходят 1—2 недели.

4. Лесной орех (листья). Листья высушить в духовке без газа. 1 чайную ложку измельченных в порошок листьев настоять с вечера до утра в стакане белого вина. Принимать эту настойку в течение дня натошак в 3 приема. По истечении 12—15 дней желтуха проходит.

5. Овсяная соломка (полова). Горсть измельченной овсяной соломы кипятить в 1 литре воды до половины объема, процедить. Принимают по стакану 3 раза в день до еды.

6. Копытень, листья, — 1 часть. Бессмертник, цветы — 1 часть. 15 г смеси на стакан кипятка. Настаивать, укутав, 3 часа, процедить. Принимать по стакану в течение дня за 3—4 приема.

7. Толокнянка (листья) — 1 часть, спорыш, (трава) — 1 часть, кукурузные рыльца — 1 часть, стручки фасоли — 1 часть, грыжник голый (трава) — 1 часть.

15 г смеси на стакан кипятка. Настаивать, укутав, 3 часа, процедить. Принимать теплым по 1/2 стакана 3 раза в день.

8. Шалфей — 25 г, полынь горькая (серебристая) — 25 г.

1 чайную ложку смеси на стакан кипятка. Настаивать, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 3—4 столовых ложки 3 раза в день. Ежедневно с пищей принимать 5—6 перечных зерен.

9. Бессмертник (цветы) — 40 г, вахта трехлистная (лист) — 30 г, мята (лист) — 20 г, корнандр (плоды) — 20 г.

2 столовые ложки сбора на 2 стакана воды. Кипятить 10 минут, настаивать, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2—3 раза в день за 15—20 минут до еды. Применяется при желтухе и воспалении желчных путей.

ЖЕЛЧЕГОННЫЕ

1. Сбор № 1. Одуванчики (корни) — 10 г, стальник (корень) — 10 г, крушина (кора) — 10 г, мята перечная (листья) — 10 г.

1 столовую ложку смеси заварить в 1 стакане кипятка, поставить на час, процедить. Принимать по 1—2 стакана в день перед едой.

2. Сбор № 2. Вахта (трифоль), (листья) — 10 г, полынь горькая (трава) — 10 г, мята перечная, (листья) — 10 г.

2 столовые ложки смеси заварить в стакане кипятка, настаивать 30 минут. Процедить, принимать по 3 столовых ложки настоя за полчаса до еды 3 раза в день.

3. Сбор № 3. Зверобой, трава — 10 г. Бессмертник, цветки — 15 г.

2 столовые ложки смеси настаивать 12 часов в 0,5 литра воды, кипятить 5 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день через час после еды.

4. Сбор № 4. Бессмертник, цветы — 15 г. Лынянка, трава — 10 г.

20 г смеси настаивать 2 часа в 0,5 литрах кипятка, процедить, принимать по 0,5 стакана 4 раза в день через час после еды.

5. Сбор № 5. Бессмертник, цветы — 200 г. Брусника, листья — 100 г. Шиповник, трава — 200 г. Ромашка, цветы — 100 г.

2 столовые ложки сбора заварить в 100 г кипятка, настоять, укутав, не менее 5—6 часов. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде.

6. Сбор № 6. Березовые листья — 150 г, зверобой (трава) — 150 г, мята перечная (листья) — 200 г, шиповник (плоды толченые) — 200 г, чай почечный — 100 г.

1 столовую ложку смеси заварить в 300 г кипятка, кипятить 5 минут, настаивать 4 часа в теплом месте. Принимать в теплом виде по 1/2 стакана 3 раза в день за 15—20 минут до еды.

7. Сбор № 7 (Швеченской фармацевтической фабрики лекарственных растений). Желчегонное. Бессмертник (цветы) — 40 г, вахта трехлистная (листья) — 30 г, мята (листья) — 20 г, корвандр (плоды) — 20 г.

2 столовые ложки сбора облить 2-мя стаканами воды, кипятить 10 минут. Процедить, принимать по 1/2 стакана 2—3 раза в день за 15 минут до еды при желтухе и воспалении желчных путей.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Айр болотный.

Применяется в сборе:

Корневища аира — 1 часть, кора корицы — 1 часть, лист вахты трехлистной — 1 часть, кожура апельсина — 2 части, трава золототысячника — 2 части, трава полыни горькой — 2 части. Чайную ложку сбора заварить стаканом кипятка, остудить, процедить. Пить по 1/4 стакана настоя 4 раза в день перед едой при отсутствии выделения желудочного сока — ахилии.

2. Анис обыкновенный.

а) плоды аниса — 1 часть, плоды фенхеля — 1 часть, плоды тмина — 1 часть, лист мяты перечной — 2 части.

2 чайные ложки смеси заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Выпить глотками в течение дня при спазмах желудка и метеоризме.

б) плоды аниса — 1 часть, плоды фенхеля — 1 часть, корень солодки — 2 части, кора крушины — 6 частей. Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Выпивать утром и вечером по стакану настоя при атонии кишечника.

3. Бадан толстолистный.

Отвар корней и корневищ бадана принимают при колитах, энтероколитах и других желудочно-кишечных расстройствах неинфекционной этиологии (столовую ложку измельченных корневищ залить стаканом

кипятка, кипятить 30 минут на водяной бане, процедить. Пить по 2 столовые ложки 3—4 раза в день).

4. Валериана лекарственная.

Употребляют в виде настоев, отваров, настоек.

а) настой валерианы: столовую ложку измельченного корня залить стаканом колодной кипяченой воды, настоять 6—8 часов, процедить. Принимать по столовой ложке 3 раза в день.

б) Отвар: столовую ложку сырья залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на слабом огне, настоять 10 минут, процедить. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Настойка продается в аптеке, принимать по 15—20 капель 2—3 раза в день.

5. Гореч птичий.

Столовую ложку травы залить 0,5 л горячей воды, кипятить 10 минут, остудить, процедить. Пить по 1/2 стакана 3—4 раза в день при воспалении желудочно-кишечного тракта.

6. Девясил высокий.

Настой корня применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: чайную ложку измельченного корня залить стаканом колодной кипяченой воды, настоять 10 часов, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

7. Дуб обыкновенный.

Кора дуба оказывает противовоспалительное и вяжущее действие. Настой коры применяют при воспалениях желудочно-кишечного тракта, при склонности к поносам. Чайную ложку измельченной коры залить 2 стаканами холодной кипяченой воды, настоять 8 часов, процедить. Выпить глотками в течение дня. Детям не назначать.

8. Зверобой продырявленный.

Отвар травы применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (столовую ложку измельченной травы залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на слабом огне, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день).

9. Земляника лесная.

Настой листьев и корневища принимают при желудочно-кишечных заболеваниях (гастрит, воспаления толстых в тонких кишках, поносы): столовую ложку листьев залить 2 стаканами колодной кипяченой воды, настоять 6—8 часов, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день.

10. Календула лекарственная (ноготки).

Настой и настойку цветков применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря (2 чайные ложки цветков заварить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, процедить). Пить по 1/2 стакана настоя 4 раза в день. Настойку календулы (продается в аптеке) принимают, начиная от 30 капель до 1 чайной ложки на прием 2—3 раза в день.

11. Карагага гривастая.

Отвар надземной части готовят так: столовую ложку измельченного лекарственного сырья залить стаканом кипятка, настоять на водяной бане 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

12. Клюква болотная.

Отвар всего растения пьют при болезнях желудка, в частности, при гастрите (2 столовые ложки смеси листьев и ягод заварить 2 стаканами горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день).

13. Костяника каменистая.

Отвар листьев применяют по одной столовой ложке 3—4 раза в день. Приготовить его так: столовую ложку листьев залить стаканом горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить.

14. Крапива двудомная.

Растение применяется как в чистом виде, так и в смеси с другими растениями.

При желудочно-кишечных заболеваниях его применяют в сборах:

а) лист крапивы — 2 части, трава зверобоя продырявленного — 2 части, трава володушки золотистой — 1 часть, лист какалии копьевидной — 1 часть. 3 столовые ложки измельченной смеси заварить 0,75 л кипятка в термосе, настоять 2 часа, процедить. Пить по стакану 3 раза в день за 20 минут до еды при хроническом гастрите с пониженной кислотностью. Лечение длительное, прерывистыми курсами (через каждые 8 недель лечения 10 дней перерыв).

б) лист крапивы — 2 части, лист подорожника — 2 части, трава зверобоя продырявленного — 3 части, цветки бессмертника (или кукурузные рыльца) — 1 часть. 3 столовые ложки измельченной смеси заварить 0,75 л кипятка в термосе, настоять 3 часа, процедить. Пить по стакану 3 раза в день за 25 минут до еды при хроническом гастрите с пониженной кислотностью. Лечение длительное (1,5—2 года), прерывистыми курсами (через каждые 8 недель лечения 10 дней перерыв).

в) лист крапивы, лист подорожника, трава зверобоя продырявленного, цветки ромашки аптечной (всех поровну). 4 столовые ложки смеси заварить 1 л кипятка, настоять 2 часа в теплом месте. Пить по стакану, до 1,5 л в день в течение 7—10 дней при остром гастрите.

г) лист крапивы, трава зверобоя продырявленного, трава спорыша, лист мяты перечной (всех поровну). 4 столовые ложки смеси заварить 1 л кипятка, настоять 2 часа в теплом месте. Пить по стакану до 1,5 л в день в течение 7—10 дней при остром гастрите.

д) лист крапивы — 1 часть, цветки тысячелистника — 1 часть, кора крушины — 3 части. Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, кипятить 10 минут, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1/2—1 стакану на ночь при привычных запорах. Курс лечения 2 недели, при необходимости его повторяют.

е) лист крапивы — 1 часть, трава душицы — 2 части, кора крушины — 2 части. Столовую ложку смеси залить 300 мл горячей воды, кипятить 5 минут, настоять 4 часа в теплом месте. Пить в теплом виде по 1/2 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды при геморрое.

15. Кровохлебка лекарственная.

Отвар корней пьют при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (столовую ложку измельченных корней залить стаканом воды, кипятить 30 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить. Принимать по столовой ложке 5 раз в день до еды).

16. Крыжовник обыкновенный.

В народной медицине отвар плодов принимают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта как болеутоляющее и слабительное средство

(столовую ложку плодов залить стаканом горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить, добавить по вкусу сахар. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день).

17. Лук репчатый.

Применяют свежий сок по 1 чайной ложке 3—4 раза в день.

18. Чеснок.

Свежий чеснок употребляют при инфекционных заболеваниях желудка и кишечника, желудочных и кишечных коликах по 2—3 зубка ежедневно.

19. Мать-и-мачеха обыкновенная.

Применяют в виде настоя: 4 чайные ложки листьев заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день.

20. Мята перечная.

а) настой листьев применяют при желудочно-кишечных расстройствах (поносах, тошноте, рвоте, метеоризме). 2 чайные ложки измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Выпить глотками в течение дня.

б) при повышенной кислотности желудочного сока, сопровождающейся запором и кислой отрыжкой, используется настой следующего состава: лист мяты перечной — 15 г, лист вахты трехлистной — 2 г, цветки тысячелистника — 15 г, семена укропа — 15 г, трава зверобоя — 30 г. Две столовые ложки смеси залить 2 стаканами кипятка, парить 2 часа, процедить. Применять в течение дня всю порцию по 1—2 столовые ложки на прием.

в) при пониженной кислотности употребляют настой иного состава: лист мяты перечной — 20 г, трава сушеницы болотной — 15 г, трава спорыша — 15 г, цветки тысячелистника — 15 г, цветки ромашки аптечной — 10 г, семена укропа — 10 г, семена тмина — 10 г, корень валерианы — 10 г, шишки хмеля — 5 г.

4 столовые ложки смеси заварить 1 л кипятка, настоять в духовке 10—12 часов, процедить. Утром натощак выпить 1 стакан, а далее по 1 стакану через 2 часа в течение дня.

21. Облепиха крушиновидная.

а) отвар плодов пьют при заболеваниях желудка (3 столовые ложки плодов залить 0,5 л горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, процедить. Добавить мед по вкусу и пить как чай по 2—3 стакана в день лучше натощак).

б) отвар листьев и ветвей применяют при расстройстве желудочно-кишечного тракта (столовую ложку мелко изрубленных листьев и ветвей залить холодной водой, довести до кипения, кипятить 5 минут на медленном огне, настоять 30 минут, процедить и выпить за один прием. При необходимости повторить).

ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Анр болотный.

Применяют настой по 1/2 стакана 4 раза в день, чайную ложку измельченного корневища залить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить.

Горец птичий.

Среднюю ложку измельченного корня спорыша залить стаканом воды комнатной температуры, поставить на 30 минут на кипящую водяную баню, настоять 15 минут, процедить. Принимать по столовой ложке 3—4 раза в день при холециститах, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

3. Душица обыкновенная.

Применяют в виде настоя: чайную ложку травы заварить стаканом кипятка, настоять 2 часа. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.

4. Зверобой продырявленный.

обладает противовоспалительным и желчегонным действием. Пьют отвары травы 3 раза в день по 1/4 стакана: столовую ложку травы залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут, процедить.

Применяется трава зверобоя в сборах:

Трава зверобоя — 2 части, трава бессмертника — 3 части. 4 столовые ложки смеси залить 1 л холодной воды, настоять 12 часов, затем кипятить 10 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день через 30 минут после еды при заболеваниях печени.

Трава зверобоя — 8 частей, корень одуванчика — 8 частей, цветки бессмертника — 3 части, трава спорыша — 3 части, лист вахты — 3 части, цветки ромашки — 3 части, трава золототысячника — 3 части. 3 чайные ложки смеси заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать по стакану настоя утром и вечером при холециститах.

5. Календула лекарственная.

Применяют настой и настойку цветков.

а) настой: 2 чайные ложки цветков заварить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день.

б) настойка продается в аптеке, принимают, начиная от 30 капель до 1 чайной ложки 2—3 раза в день.

6. Крапива двудомная.

При заболеваниях печени и желчных протоков применяют сбор:

Лист крапивы — 2 части, плоды шиповника — 2 части, трава спорыша — 1 часть, корень синюхи голубой — 1 часть, трава веродушки золотистой — 1 часть. 3 столовые ложки смеси заварить в термосе 0,75 л кипятка, настоять 2—3 часа, процедить. Выпить за день 3—4 приема за 30 минут до еды при хронических ангиогепатохолециститах. Лечение длительное (1,5 — 2 года), прерывистыми курсами (через каждые 8 недель лечения 10 дней перерыва).

7. Кукуруза.

Настой из кукурузных рылец применяют как желчегонное при холециститах, холангитах, гепатитах: столовую ложку рылец заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1 столовой ложке через каждые 3 часа.

8. Одуванчик лекарственный.

Настой корней пьют по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой. Готовят так: 2 чайные ложки измельченного корня залить стаканом холодной кипяченой воды, настоять 8 часов.

9. Подорожник большой.

Пьют при холецистите настой трав: столовую ложку сырья заварить

стаканом кипятка, настоять 10 минут, процедить. Выпить за 1 час глотками — суточная доза.

10. Рябина.

Применяют как желчегонное: сок плодов и свежие ягоды (по 100 г плодов 3 раза в день за 20—30 минут до еды или сок по 1/4 стакана 2—3 раза в день за 30 минут до еды).

11. Тысячелистник обыкновенный.

Применяют настой травы: 2 чайные ложки сырья заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день до еды.

12. Шалфей лекарственный.

Настой листьев применяют при воспалениях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени (2 чайные ложки измельченных листьев заварить 2 стаканами кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по столовой ложке через каждые 2 часа).

13. Плоды шиповника входят в сбор:

Толченые плоды шиповника — 3 части, корень одуванчика лекарственного — 3 части, кукурузные рыльца — 3 части, побеги хвоща полевого — 3 части, цветки бессмертника песчаного — 4 части, лепестки розы белой — 2 части, плоды земляники лесной — 2 части, цветы ромашки аптечной — 2 части, плоды можжевельника обыкновенного — 1 часть, трава сушеницы лесной — 1 часть, лист березы белой — 1 часть, семена укропа огородного — 1 часть, надземная часть календулы лекарственной — 1 часть. Столовую ложку измельченной смеси заварить 0,5 л кипятка, томить 30 минут, процедить. Принимать по 150 мл 3 раза в день за 10—15 минут до еды при заболеваниях печени и желчного пузыря. Вкус настоя горьковатый.

ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Зверобой продырявленный.

Пьют при воспалениях половых органов (столовую ложку травы залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день).

2. Калина обыкновенная.

Пьют как противовоспалительное средство и средство, повышающее тонус мускулатуры матки.

Отвар цветков (столовую ложку цветков заварить стаканом кипятка, кипятить 10 минут, пить по столовой ложке 3 раза в день).

3. Карагана лекарственная.

Применяют отвар для спринцеваний при воспалительных процессах: столовую ложку травы залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут, процедить.

4. Тысячелистник обыкновенный.

а) готовят сбор: трава тысячелистника — 20 г, лист шалфея — 20 г, лист розмарина — 20 г, кора дуба — 40 г. Сбор залить 3 л воды, кипятить 30 минут, процедить. Ежедневно проводить по 2 вагинальных спринцевания при белях.

Применяются также сборы:

б) трава тысячелистника — 5 частей, трава пастушьей сумки — 5 частей, корневище лапчатки прямостоячей — 5 частей, кора дуба — 2 части. Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, кипятить 5 минут на слабом огне, настоять 15 минут, процедить. Утром и вечером принимать по стакану отвара при обильных менструациях.

в) трава тысячелистника, трава лапчатки гусиной, корень валерианы (поровну). 2 Чайные ложки сбора заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день при обильных менструациях.

В гинекологии и в акушерской практике применяются также:

5. Горец птичий.

При гинекологических заболеваниях и в акушерской практике применяют траву в сборах:

а) трава спорыша — 1 часть, трава хвоща полевого — 1 часть, трава золототысячника — 3 части, трава лапчатки гусиной — 5 частей.

Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Выпить глотками в течение дня при болезненных месячных.

б) трава спорыша, трава пастушьей сумки, трава омелы белой (все поровну). 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, процедить. Принимать утром и вечером по 1 стакану за 3—5 дней до менструации и весь срок ее. При обильных месячных.

в) трава спорыша — 5 частей, лист крапивы — 3 части, кора дуба — 1 часть, цветки ромашки аптечной — 1 часть. 2 столовые ложки смеси залить 1 л горячей воды, довести до кипения, кипятить 5 минут на слабом огне, дать остыть, процедить. Применять для спринцеваний и вагинальных тампонов при белях.

6. Бадан.

Для лечения эрозий шейки матки отвар употребляют в виде спринцевания. 2 столовые ложки измельченных корневищ залить стаканом кипятка, кипятить 30 минут на водяной бане, процедить горячим, охладить.

7. Девясил.

Отвар корня употребляют при болезненных и нерегулярных менструациях, а также для профилактики преждевременных родов (чайную ложку измельченного корня залить стаканом кипятка, кипятить 10—15 минут на слабом огне, настоять 4 часа. Принимать по столовой ложке 3—4 раза в день).

8. Земляника лесная.

Столовую ложку листьев залить 2 стаканами колодной кипяченой воды, настоять 6—8 часов, процедить. Принимать по 1/2 стакана настоя ежедневно при чрезмерных менструациях. Настой листьев приготовить и по другому рецепту: столовую ложку измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по столовой ложке 3—4 раза в день.

9. Календула лекарственная.

2-процентный раствор настойки календулы (чайная ложка настойки календулы на 1/4 стакана воды) используют в виде спринцеваний для лечения эрозии шейки матки и трихомонадных кольпитов.

10. Костяника.

Отвар листьев применяют при остановке менструаций, белях и других гинекологических заболеваниях, при геморрое и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

11. Крапива двудомная.

а) Сох из свежих листьев крапивы принимать внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день и 1/4 стакана воды за 20 минут до еды при чрезмерных менструациях и различных кровотечениях.

б) Жидкий экстракт крапивы (аптечный препарат). Принимать по 30—40 капель за 30 минут до еды и 1/4 стакана воды для профилактики маточных кровотечений.

а) Ватный тампон, смоченный соком из свежих листьев крапивы, вложить в вагину из листьев на тампоне во влагалище при эрозии шейки матки.

12. Облепиха крушиновидная.

При гинекологических заболеваниях — эрозии шейки матки, эндоцервикитах, кольпитах — облепиховое масло используется и в виде тампонов. Лечение продолжительное, эпителизация наступает через 8—12 дней, иногда и раньше. Результаты стойкие. Облепиховое масло обладает токсическими и раздражающими слизистые оболочки свойствами, поэтому может быть использовано при лечении эрозии у беременных женщин.

ЗАПОРЫ

1. Рябина красная, ягоды.

Созревшие (до мороза) ягоды нарвать, перебрать, промыть. Насыпать в большую бутылку слой ягод, слой сахарного песка до верха. Обвязать тряпочкой и поставить на солнце или другое теплое место. Через некоторое время сахар растворится и образуется сироп.

Настаивать 3—4 недели. Пока сироп не начал бродить, его процедить и отжать ягоды. В полученный сироп добавить спирт, чтобы он не бродил (25 г на 500 мл сиропа). Принимать сироп по 0,5—1 рюмке утром натощак, можно запить холодной водой. Прослабляет скоро и мягко. Как только наладится стул, сделать перерыв. Затем курс можно снова повторить. Одно из лучших послабляющих средств.

2. Пшеничные отруби. 2 столовые ложки отрубей залить стаканом горячего молока. Настоять, укутав, 30—40 минут. Есть утром натощак чайной ложкой полстакана отрубей. Можно отруби с молоком минут 15 поварить. Так принимать отруби 2 раза в день в течение месяца. При этом раз в неделю желательно делать очистительную клизму.

3. Льняное семя.

При хронических запорах ежедневно пьют настой из 1 чайной ложки льняного семени на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 4—5 часов. Выпить всю норму вечером перед сном вместе с семенами.

4. Мед — 300 г, столетник, сох — 150 г.

Столетник перед срезанием не поливать 2 недели. Отжать сок из листьев столетника, слегка растопить мед, если он засахаренный, и смешать с соком столетника. Хранить в холодильнике. Принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день — утром натощак и на ночь, запивая водой.

5. Алоэ древовидное.

Сок растения применяют при хроническом запоре: пить по 1—2 чайные ложки 2—3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 1—2 месяца.

6. Рассол квашеной капусты оказывает послабляющее действие, пьют по 1/2 стакана теплого рассола.

7. Сок свежего картофеля применяют при спастическом запоре по 1/4 1/2 стакана.

8. Одуванчик лекарственный.

Настой корней пьют при запоре: 2 чайные ложки корня залить стаканом кипяченой колодной воды, настоять 8 часов. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой.

9. В дозах 0,2—2 г порошка корня ревеня оказывает слабительное действие при атонии кишечника, спастическом запоре.

10. Применяют следующие сборы:

а) цветки бузины, плоды жостера (поровну). Столовую ложку измельченной смеси заварить стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить. Утром и вечером выпивать по стакану отвара при запорах.

б) цветки бузины — 2 части, плоды фенхеля — 2 части, кора крушины — 2 части, плоды аниса — 1 часть. Столовую ложку измельченной смеси заварить стаканом кипятка, настоять 1—2 часа. После обеда и ужина выпивать по стакану настоя при запорах.

в) цветки бузины, плоды фенхеля, корень солодки, трава фиалки трехцветной, лист березы белой, кора крушины (всех поровну). Столовую ложку измельченного сбора заварить стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить. Настой выпить глотками за день при кожных сыпях, вызванных хроническими запорами.

ИСПУГ

1. Пустырник — 3 ч. Вереск — 4 ч. Сушеница — 3 ч. Валериана — 1 ч.

4 ст. ложки смеси залить 1 л кипятка, настаивать, принимать по 4—5 глотков через каждый час в течение дня. Кроме испуга, помогает и при мнительности.

КАМНИ В ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКАХ И ПЕЧЕНИ

1. Свекольный сироп.

Взять несколько головок свеклы, очистить, вымыть, порезать и сварить. Варить длительное время, пока не загустеет отвар, станет как сироп. Принимать по 1/5 стакана 3 раза в день до еды. Считается, что от такого сиропа камни в желчном пузыре растворяются постепенно и относительно безболезненно.

2. Рябина красная. От камней в печени и протоках надо есть в течение 1,5 месяца лесную, но не садовую рябину. Есть с чем угодно: с хлебом,

чаем, сахаром, медом и т. д. в течение дня, съедая 2 стакана свежей рябины.

3. Березовый лист.

Весенний лист березы, величиной с копейку, собрать и высушить. 2 столовые ложки листа на стакан кипятка. Кипятить на малом огне до половины объема, когда остынет, процедить. Принимать по 1 десертной ложке 3 раза в день за час до еды. Курс лечения 3 месяца. Хорошо применять при мелких камнях. Будут боли, схватки, колики, тошнота. Нужно потерпеть. Все камни выйдут.

4. Березовый лист (2-й вариант).

Столовую ложку (с верхом) сухих березовых листьев на стакан кипятка. Кипятить 20 минут, настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать утром и вечером по стакану настоя за полчаса до еды. Пьют продолжительное время при желчекаменной болезни.

5. Сок свежего растения лапчатки гусиной смешать с соком зеленого растения ржи. Принимать по 3 столовых ложки в день до еды как средство от желчных и печеночных камней.

6. Сок квашеной капусты.

Ежедневно принимать сок квашенной капусты 0,5 — 1 стакану 3 раза в день до еды. Курс лечения 1,5—2 месяца.

7. Живучка мохнатая — 10 г, жостер (плоды) — 10 г, цикорий (прикорневые листья) — 10 г, вероника — 10 г, подорожник (семя) — 20 г.

Залить 2 стол. ложки смеси 500 мл кипятка, настаивать 15 минут. Принимать теплым с сахаром по 150 мл 3 раза в день перед едой.

8. Кукурузные рыльца — 30 г, подсолнечник (цветы) — 20 г, фиалка трехцветная (травы) — 10 г, земляника (листья) — 10 г.

Заварить 2 ст. ложки смеси 600 мл кипятка. Настаивать в течение 20 мин., пить за 30 мин. перед едой.

9. Ястребинка волосистая (травы) — 20 г, зверобой (травы) — 20 г, репяхов (травы) — 20 г, тмин (раздробленное семя) — 10 г, крушина (раздробленная кора) — 10 г.

Заварить 1 стол. ложку смеси 500 мл кипятка, настаивать полчаса с медом (2 стол. ложки меда на 500 мл воды). Эта смесь применяется при запорак, часто сопровождающих дискинезию желчных путей.

10. Земляника.

Необходимо принимать 3—5 стаканов ягод ежедневно в течение всего сезона, т. е. 3 недели. Это поможет при этой мучительной болезни на долгое время.

11. Пропустить через мясорубку 1 стакан конопляного семени. Смешать с 3 стаканами сырого непастеризованного молока, уварить до 1 стакана. Горячим процедить и пить натощак по стакану в день в течение 5 дней. Через 10 дней курс повторить. Не есть ничего острого. Возможны приступы от боли печени, нужно потерпеть. Через год курс повторить. Считается, что помогает хорошо. Применяется при камнях в печени и почках.

12. Мелисса лимонная (травы) — 5 г, крушина (кора) — 10 г, мята (травы) — 10 г, шиповник (плоды мелко толченые) — 30 г, чистотел (травы) — 25 г, бессмертник (цветы) — 10 г.

Сварить 1 чайную ложку 300 мл кипятка. Настаивать 15 мин., выпить за один прием с медом. Данную смесь принимать при сильных болях в области печени и желчного пузыря.

13. Одуванчик (корень мелко раздробленный) — 10 г, крапива (листья) — 10 г, календула (цветы) — 40 г, донник — 3 г, василек (цветы) — 20 г.

Заварить 1 ст. ложку этого сбора 1 л кипятка, положить 4—5 кусков сахара, размешать и накрыть салфеткой, упаривать час. Пить по 200 мл 3—5 раз в день перед едой.

14. Прованское (оливковое) масло. Принимать прованское масло за полчаса до еды. Начинать с половины чайной ложки и дойти постепенно до 0,5 чайного стакана, все время постепенно увеличивая дозу. Лечение обыкновенно длится 2—3 недели. По народным наблюдениям, при таком лечении уменьшается выделение желудочного сока, а это будто бы предохраняет от язв и нарывов в желудке. Это средство изгоняет камни из желчного пузыря и без операции выталкивает их.

15. Редька, мед.

Умни в желчных протоках и почках. Редьку натереть, сок отжать, залить корешком пополам с медом. Принимать по 1/3—1/2 стакана, а то и стакана в день. До стакана доходить постепенно. Предупреждает образование камней в желчных протоках и почках, а также препятствует развитию атеросклероза, болезней печени и водянки.

16. Брусника обыкновенная.

Листья обладают кампепастворяющим действием при желчекаменной болезни: столовую ложку листьев заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Настой принимать по 2 столовые ложки 4—5 раз в день.

17. Горьц птичий.

Как желчегонное трава спорыша полезна при заболеваниях печени, желудка и желчекаменной болезни.

18. Пропустить через мясорубку 1 стакан конопляного семени. Смешать с 3 стаканами сырого, непастеризованного молока, уварить до 1 стакана, горячим процедить и пить натошак по 1 стакану в день в течение 10 дней. Через 10 дней повторить. Не есть ничего острого. Возможны приступы от боли печени, но надо выдержать. Через год повторить курс лечения.

ОТ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

1. Принимать оливковое масло за полчаса до еды. Начинать с 1/2 чайной ложечки и дойти до чайного стакана, все время постепенно увеличивая дозу. Лечение обыкновенно длится от 2 до 3 недель. Это средство также изгоняет камни из желчного пузыря и выталкивает их.

2. Взять несколько головок свеклы, очистить, вымыть и сварить вкрутую. Продолжать варить эту смесь до тех пор, пока она станет почти как суп. Пить по 3/4 стакана несколько раз в день, и камни в желчном пузыре скоро растворяются.

3. При заболеваниях печени и желчных протоков применяют траву в сборах:

а) трава спорыша — 3 части, цветки ромашки аптечной — 1 часть, кора крушины — 2 части, трава зверобоя продырявленного — 4 части, цветки бессмертника песчаного — 4 части. 4 столовые ложки смеси залить на ночь 1 л холодной воды, утром поставить на плиту, довести до кипения, кипятить 5—10 минут, остудить, процедить, первый стакан выпить натощак утром, а остальное разделить на 4 приема, каждый из которых выпить через час после еды, при заболеваниях печени и желчекаменной болезни. Исключить из пищевого рациона острое, соленое, копченое, жареное, жирное.

б) трава спорыша, трава чистотела, корень одуванчика, кукурузные рыльца, трава зверобоя продырявленного, трава фиалки трехцветной, плоды аниса, плоды кориандра (всех поровну). 3 столовые ложки смеси залить 3 стаканами кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1 стакану 3 раза в день при желчекаменной болезни.

в) столовую ложку травы спорыша заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1 столовой ложке 2—3 раза в день за 30 минут до еды при камнях желчного пузыря.

4. Земляника лесная.

Столовую ложку смеси (ягод и листьев) заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать по 1/2—1 стакану настоя 3 раза в день при склонности к камнеобразованию.

5. Кукуруза.

Настой и жидкий экстракт кукурузных рылец применяют как желчегонное — при холециститах, холангитах, гепатитах столовую ложку кукурузных рылец заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по столовой ложке через каждые 3 часа.

6. Жидкий экстракт кукурузных рылец (продается в аптеке) принимают по 30—40 капель 2—3 раза в день перед едой.

В народе кукурузные рыльца считают средством, "сокрушающим" мочевые и желчные камни в песок.

7. Мята перечная.

Применяют настой листьев: 2 чайные ложки травы заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Выпить глотками в течение дня.

8. Пырей ползучий.

Настой корневищ применяют при желче- и мочекаменной болезни (4 чайные ложки измельченных корневищ залить стаканом холодной воды, настоять 12 часов и в прохладном месте, процедить. Сырье повторно залить стаканом кипятка, настоять 10 минут, процедить. Оба настоя смешать и принимать по 1/2 стакана 4 раза в день).

9. Укроп огородный.

Отвар плодов применяют при желчекаменной болезни (2 столовые ложки плодов залить 2 стаканами кипятка, кипятить на слабом огне 15 минут, охладить, процедить. Пить по 1/2 стакана теплого отвара 4 раза в день. Курс лечения 2—3 недели).

Сборы при желчекаменной болезни

1. Сбор № 1. Чистотел, трава — 1 часть. Ромашка аптечная, цветы — 1 часть. Вахта трехлистная, листья — 1 часть.

Ис хорошо измельчить и смешать. 1 столовую ложку сбора на стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день — утром и вечером через час после еды.

2. Сбор № 2. Хвощ полевой, трава — 10 г. Чай почечный — 10 г. Спорыш, трава — 20 г. Крапива двудомная — 10 г.

1 столовые ложки сбора заварить 500 мл кипятка. Настоять, укутав, не менее 5—6 часов. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде.

3. Сбор № 3. Чистотел, трава — 10 г. Мята перечная — листья — 10 г. Подорожника золотистая, трава — 10 г.

1 столовую ложку сбора на стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по стакану настоя утром и вечером за полчаса до еды.

4. Сбор № 4. Спорыш, трава — 1 часть. Кукуруза, рыльца — 1 часть. Фасоль (карликовый сорт), стручки — 1 часть. Грыжник гладкий, трава — 1 часть. Медвежий ушки, трава — 1 часть.

15 г смеси на стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Напар выпивают теплым весь в течение дня.

КАМНИ В ПОЧКАХ И МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ

1. Морковь, семена.

а) размолоть семена моркови в порошок. Принимать по 1 г 3 раза в день за 30 минут до еды. Гонит камни в песок.

б) 1 столовую ложку семян моркови на стакан кипятка. Настоять, укутав, 12 часов, процедить. Принимать теплым по 0,5 стакана 5—6 раз в день до еды при почечно-каменной болезни и как ветрогонное.

2. Петрушка, корни, листья.

1 чайную ложку мелкопорезанных корней петрушки и 1 чайную ложку порезанных листьев петрушки залить стаканом кипятка. Настоять, укутав, 3 часа. Принимать стакан в 3 приема до еды небольшими глотками. Чайной можно пить сушеную петрушку. Заварить так же.

3. Донник, трава с цветами — 6 г. Можжевельник, плоды — 20 г. Пастушья сумка, трава — 20 г. Толокнянка, листья — 20 г. Шиповник, плоды — 120 г. Шиповник, цветы — 20 г. Крапива, трава — 40 г.

Заварить чайную ложку смеси 300 мл кипятка. Принимать горячим 2 раза в день с медом.

4. Барбарис, измельченный корень — 30 г. Земляника, листья — 40 г. Алтей, измельченный корень — 50 г. Кукурузные рыльца — 30 г. Береза, листья — 20 г.

Заварить 0,5 стакана смеси в 1 л кипятка, настаивать, укутав, в течение 10—12 часов. Пить с медом по 200 мл после подогрева.

5. Шиповник, корни.

2 столовые ложки измельченных корней на стакан воды, кипятить 15—20 минут, настоять, укутав, пока не остынет, процедить. Принимать этот отвар 4 раза в день по 0,5 стакана. Принимают в течение недели и

более. Этот отвар растворяет всякие камни в желчном пузыре и почечной лоханке на мелкие песчинки. Губительно действует на малярийных паразитов.

6. Вереск, трава.

1 столовую ложку вереска настаивать ночь в 0,5 литра кипятка, утром процедить. Принимать по 100 г 3 раза в день до еды. Применяется при воспалении мочевого пузыря и мочевых путей, болезнях почек, почечно-каменной болезни, ревматизме, подагре.

7. Выпивая сок одного лимона в смеси с 0,5 стакана горячей воды несколько раз в день и 0,5 стакана смеси морковного, свекольного и огуречного сока 3—4 раза в день, можно добиться исчезновения песка и камней в течение нескольких дней или недель, в зависимости от размера камней.

8. Березовый сок.

Весной обязательно пить натошак 3 раза в день до еды по стакану березового сока. Березовый сок гонят камни и песок из почек и мочевого пузыря.

9. Уродан (аптечный препарат).

1 чайная ложка на 0,5 стакана воды 3—4 раза в день до еды. Применяется при подагре, почечных и мочевых камнях, сломилиартритах, полиартритах.

10. Спорыш, 3 чайные ложки свежей травы спорыша настаивать 4 часа в 2 стаканах кипятка, укутав потеплее, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день до еды.

11. Василек синий (цветки) — 30 г, брусника (листья) — 20 г, вероника (трава) — 30 г, буквица — 20 г.

Заварить чайную ложку смеси 300 мл кипятка и настаивать 20—30 мин. Выпить за один раз в горячем виде до еды.

12. Ромашка — 30 г, хмель (шишки) — 20 г, татарник колючий (трава) — 50 г, смородина (листья) — 20 г, кукурузные рыльца — 30 г, подмаренник (трава) — 10 г.

Заварить 1 ст. ложку смеси в 300 мл кипятка. Настаивать 20—30 мин., выпить в два приема с медом вечером.

13. Хвощ полевой — 30 г, укроп (семя в порошке) — 30 г, ромашка — 20 г, петрушка (семя в порошке) — 30 г, белая акация (бутоны) — 50 г.

Заварить стакан смеси 1 л кипятка. Настаивать час, пить в теплом виде по одному стакану.

14. Кукурузные рыльца — 10 г. Грыжник голый — 5 г. Фасоль, стручки — 10 г. Спорыш — 10 г. Толокнянка — 10 г.

Заварить 3 ст. ложки смеси в 0,5 л кипятка. Томить 30 мин., пить по 150 мл теплым. Этой смесью выводят камни из почек в виде песка ежедневно.

15. Чеснок.

Перед каждым новолунием взять небольшую горсть очищенного, порезанного чеснока, залить литром водки, настаивать 9 дней на солнце но не у огня. Как только начнется новолуние, принимать по рюмке чесночной настойки. Принимать 1 раз в день натошак. Перед употреблением взбалтывать. Обычно к новолунию обостряются мочекаменные болезни. Принимать во время всего новолуния. При

мочиспускании всю мочу до конца не выпускать, а немного оставлять, чтобы камень непосредственно не прикасался к мочевому пузырю.

16. Сбор № 1. При почечно-каменной болезни. Полынь обыкновенная (чернобыль), (трава) — 10 г, толокнянка (листья) — 15 г, квощ полевой (трава) — 10 г, морковь (семена) — 15 г, укроп (плоды) — 10 г.

12 г смеси настаивать в протопленной духовке 12 часов в 2 стаканах воды. Кипятить 5 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день через час после еды.

17. Сбор № 2. При почечно-каменной болезни. Бессмертник (цветы) — 15 г, ревень (корня) — 10 г, тысячелистник (трава) — 25 г.

1 столовую ложку смеси на стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды.

18. Сбор № 3. Камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре. Нижа (цветы) — 10 г, квощ полевой (трава) — 10 г, репешок (трава) — 10 г, брусника (лист) — 20 г, ая (корневище) — 20 г, пырей (корневище) — 20 г.

1 столовую ложку смеси на стакан кипятка. Настаивать, укутав, 1—1,5 часа, процедить. Принимать утром во время завтрака и вечером по стакану.

19. Сбор № 4. Камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре. Шиповник, плоды — 25 г. Стальник, корень — 25 г. Адонис, трава — 25 г. Можжевельник, плоды — 25 г.

1 столовую ложку смеси на 1 стакан кипятка. Настаивать, укутав, 1 час, процедить. Принимать 2 стакана в течение дня.

20. Сбор № 5. Камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре. Дрок, трава — 15 г. Можжевельник, плоды — 15 г. Брусника, лист — 15 г. Спорыш, трава — 15 г. Хвощ полевой, трава — 30 г.

1 столовая ложка смеси на стакан кипятка. Настаивать, укутав, 1 час, процедить. Принимать утром, во время завтрака и вечером по стакану.

СРЕДСТВО ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ КАМНЕЙ В ПЕЧЕНИ, ПОЧКАХ И ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

24 часа голодать. В течение этого времени можно пить воду. По истечении 24 часов необходимо поставить клизму. Через час после клизмы выпить 1 стакан прованского масла и сразу 1 стакан сока "грейпфрут", т. е. надо пить одно вслед за другим. Обычно после этого бывает сильная тошнота. Чтобы избежать рвоты, надо лежать и сосать лимон. Воду пить нельзя. В случае острой жажды можно выпить 1 глоток соленой воды, но лучше преодолеть жажду и не пить воды вовсе.

Через 15 минут после принятия прованского масла с соком "грейпфрут" надо выпить слабительного — английскую соль. Минут через 15 после принятия этого слабительного (или когда закошется) можно пить воду. НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖАТЬ ГОЛОДАТЬ, а через сутки надо снова пить прованское масло с соком "грейпфрут", т. е. надо повторить описанную выше процедуру. Потом, когда очистится желудок, надо следить, выходят ли камни. Они плавают в моче и имеют зеленоватый,

коричневатым, а иногда и кремовый цвет. Когда моча остынет, камни осядут на дно. Следует продолжать принимать прованское масло с соком "грейпфрут" (и, конечно, продолжать голодать) до тех пор, пока камни не растворятся все. Нередки случаи, когда для растворения всех камней придется пить это лекарство 5, 6, а иногда и 7 дней подряд. Надо помнить, что бывают очень сильные боли при этом. Перед началом лечения необходимо сделать рентгеновский снимок для того, чтобы знать, какого размера камни, сколько их и их местонахождение. По окончании лечения нелишне еще раз сделать рентгеновский снимок, чтобы убедиться в полном исчезновении камней.

КАШЕЛЬ — ПРОСТУДНЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ

1. Деяснл, корень

20 г измельченных корней отварить на малом огне 10 минут в стакане воды. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день за 20 минут до еды. Применяется как отхаркивающее средство.

2. Подорожник, лист.

а) 1 столовую ложку сухих листьев подорожника на стакан кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по столовой ложке 4 раза в день за 20 минут до еды и при приступах кашля.

б) Вариант. 3 столовые ложки свежих листьев подорожника смешать с 3 столовыми ложками сахарного порошка или меда. В закрытом сосуде поставить на теплую плиту на 4 часа. Сироп принимать по чайной ложке 4 раза в день за 30 минут до еды.

3. Сахарный песок.

2 столовые ложки сахарного песка расплавить на сковороде. Как только расплавится песок, выключить газ и налить в песок 0,5 стакана кипятка. Наливать осторожно, издали, так как образуется сильное кипение и брызги. Тот час же снять с плиты. Детям давать по чайной ложке время приступа кашля и перед сном на ночь. Дневная доза 4—5 лож. Хорошо помогает и взрослым.

4. Сосновые почки.

1 столовую ложку почек на стакан крутого кипятка. Настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Принимать по 1—2 глотка при позывах к кашлю, помогает сразу.

5. Бузина черная (цветы).

1 столовую ложку суш. цветов на 0,5 литра кипятка. Настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Делать вечером. Пить на ночь по 1—2 чашки тепленьким, не горячим, с сахаром или медом, с добавлением молока. Помогает хорошо.

6. 2 столовые ложки сливочного масла. 2 желтка свежих диетических яиц, 1 чайную ложку пшеничной муки, 2 чайные ложки меда.

Все хорошо смешать, принимать при кашле по 1 чайной ложке многократно в день. Очень хорошо, если к этому составу прибавить 1 чайную ложку порошка корня солодки. Эффект будет еще лучше.

7. Бедреиец-камнеломка, корин. Смотри рецепт "Астма" № 5.

8. Картофель.

Отварить в мундире 4—5 крупных картофелин, но так, чтобы они не рассыпались. Наложить на грудь или спину несколько листов бумаги, а на них разрезанный пополам картофель. Сверху укутать. По мере остывания листы бумаги вытаскивать. Делать это вечером. Уже на другой день человек получает облегчение.

9. Анис обыкновенный.

Применяют в сборе с другими растениями.

Плоды аниса — 1 часть, лист мать-и-мечехи — 1 часть, цветки коровяка — 1 часть, цветки просвирняка — 2 части, цветки самосейки — 2 части, трава тимьяна — 2 части, корень алтея лекарственного — 2 части, корень солодки — 5 частей. Столовую ложку смеси настоять на стакане холодной воды, через 2 часа довести до кипения и кипятить 5—6 минут на слабом огне, после остывания процедить. Пить по 1/4 стакана теплого отвара 4 раза в день при кашле, трахеобронхите, бронхите.

10. Бузина.

Употребляется в смеси с другими лекарственными растениями.

а) цветки бузины — 1 часть, семена пажитника сennого — 1 часть, плоды фенхеля — 1 часть, липовый цвет — 2 части, трава фиалки трехцветной — 2 части. Столовую ложку измельченного сбора настоять на стакане холодной воды в течении 2 часов, варить несколько минут и после остывания процедить. Отвар пить теплым в несколько присмоек за один день при трахеобронхите, хроническом бронхите, кашле.

б) цветки бузины, трава роснянки, лист подорожника, трава фиалки трехцветной (всех поровну). 4 чайные ложки измельченного сбора настоять на стакане холодной воды в течении 2 часов, кипятить несколько минут и после остывания процедить. Отвар выпить за один день в три приема при бронхиальной астме, бронхите и бронхоэктазиях, кашле.

в) цветки бузины, трава лапчатки гусиной, трава шандры, трава чистотела, сосновые почки (всех поровну). Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

г) цветки бузины — 1 часть, кора молодой ивы — 1 часть, лист мать-и-мечехи — 1 часть, плоды аниса — 2 части, плоды шиповника — 2 части. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

11. Гореч птичий.

а) столовую ложку измельченной травы залить стаканом кипятка, кипятить 5—10 минут на водяной бане, настоять 1—2 часа, процедить. Принимать по столовой ложке 3—4 раза в день при туберкулезе легких и коклюше.

б) трава спорыша, плоды аниса, плоды укропа, почки сосновые, трава чабреца, мелко измельченный корень солодки (всех поровну). 4 чайные ложки смеси залить 1,5 стакана холодной кипяченой воды, настоять 2 часа, поставить на плиту, довести до кипения, кипятить 2—3 минуты, остудить, процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 10 минут до еды. Применяется с хорошим эффектом при бронхоэктатической болезни, хроническом бронхите, коклюше, бронхиальной астме, хронической пневмонии, долго не проходящем кашле.

12. Девясил высокий.

Настой корня эффективен при кашле: чайную ложку сырья залить стаканом кипяченой холодной воды, настоять 10 часов, пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

13. Душица обыкновенная.

Готовят настой травы в чистом виде и сборе:

Трава душицы — 1 часть, корень алтея — 2 части, лист мать-и-мачехи — 2 части. Столовую ложку сбора заварить 2 стаканами кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день после еды как отхаркивающее средство.

14. Калина обыкновенная.

Применяют отвар цветков как отхаркивающее средство. Готовят также отвар плодов с медом: стакан плодов залить 1 л горячей воды, кипятить 10 минут, процедить, добавить 3 столовые ложки меда. Пить по 1/2 стакана 3—4 раза в день.

15. Редька посевная.

Употребляют сок с медом (вырезать в редьке углубление, заполнить медом, накрыть кусочком редьки, настоять 4 часа, сок слить). Принимают по столовой ложке 3 раза в день.

16. Редька.

Нарезать сырую редьку очень тонкими ломтиками (6—8 штук). Посыпать каждый ломтик сахарным песком. Появившийся сладкий сок принимать по столовой ложке каждый час. Это средство излечивает самый тяжелый кашель в короткое время.

КЛИМАКС

1. Ромашка аптечная (цветы) — 10 г, тысячелистник (травы) — 10 г, лапчатка гусиная — 10 г, чистотел (травы) — 5 г.

1 столовую ложку сбора на стакан кипятка. Настаивать 30—40 минут. Процедить, принимать по 2 стакана настоя в день небольшими глотками.

2. Календула (ноготки) (цветы) — 10 г, просвирняк (цветы) — 10 г, грыжник (травы) — 15 г, анис (плоды) — 15 г, фенхель трехцветный — 15 г, стальник колючий (корень) — 15 г, бузина черная (цветы) — 15 г, крушина (кора) — 15 г, солодка (корень) — 15 г.

Все хорошо перемешать. 1 столовую ложку сбора на стакан кипятка. Настаивать, укутав, 30 минут. Принимать 2 стакана настоя в течение дня небольшими глотками.

3. Орех грецкий (листья) — 10 г, стальник колючий (корень) — 20 г, пырей (корневище) — 20 г, можжевельник (плоды) — 20 г, золотарник (травы) — 20 г.

Настаивать как в предыдущем рецепте № 2. Принимать утром и вечером по стакану.

4. Ясменник пахучий — 20 г, ежевика (листья) — 25 г, боярышник (цветы) — 10 г, пустырник (травы) — 20 г, сушеница болотная — 15 г.

1 столовую ложку смеси на стакан кипятка. Укутать на час, процедить. Принимать как чай 3 раза в день по стакану. Этот состав применяется при "женском увядании" (прекращении месячных).

После 10-дневного приема такого чая значительно уменьшается "прилив крови к голове", прекращается обычный зуд тела, особенно шен, прекращаются головные боли, возвращается аппетит, появляется крепкий здоровый сон, и женщина, до того, казалось бы, безнадежно больная, как бы "заново рождается". Так по крайней мере женщина определяет и характеризует улучшение своего состояния после приема чая из указанной выше смеси (М. А. Носаль, И. М. Носаль).

5. Боярышник, цветы.

а) 3 столовые ложки цветов на 3 стакана сырой воды. Настаивать ночь. Утром ставят на огонь, дают прокипеть 5—7 минут. Снять с огня, укутать на 30 минут. Процедить, отжать. Принимать стакан утром натощак, а остальное после еды по стакану.

б) Боярышник кроваво-красный.

Столовую ложку сухих плодов заварить стаканом кипятка, настоять 2 часа в теплом месте (в духовке, на плите), процедить. Настой принимать по 1—2 столовых ложки 3—4 раза в день до еды при гипертонической болезни, вегетоневрозак, головокруженияк, удушье, климаксе.

в) Взять поровну плодов и цветков, хорошо перемешать, 3 столовые ложки смеси заварить 3 стаканами кипятка, настоять 2 часа в теплом месте, процедить. Настой принимать по стакану 3 раза в день за 30 минут до еды или через час после еды при сердечных заболеваниях, удушье, головокружениях, в начале климактерического периода до исчезновения признаков заболевания и восстановления хорошего самочувствия.

6. Пастушья сумка.

Отвар пастушьей сумки 40 г на 1 литр кипятка. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день пожилым женщинам в предклимактерическом периоде при изнурительных маточных кровотечениях.

7. Вероника колосовидная или дубравная.

Столовую ложку сухой травы заварить 300 мл кипятка. Выпить половину за 10 мин. до еды, и остальное — в перерывах между едой. За день надо выпить 600 мл настоя. Хорошо помогает при головокружении, головной боли, в климактерический период.

8. Каштан конский.

При маточных кровотечениях, возникших в период климактерия или от других причин, не связанных со злокачественными новообразованиями, пользуются отваром из корки зрелых семян каштана. Делают промывание.

15 г корки на 250—300 г воды. Кипятить 10 минут на слабом огне. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Промывание сделать 2 раза в день — утром и вечером слегка теплым составом.

9. Применяют также сбор:

Цветки бузины — 3 части, трава грыжника — 3 части, плоды аниса — 3 части, трава фиалки трехцветной — 3 части, корень стальника колючего — 3 части, кора крушины — 3 части, корень солодки — 3 части, цветки календулы — 2 части, цветки просвирника — 2 части. Столовую ложку измельченного сбора заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут. Настой пить по 2 стакана в день глотками в климактерический период.

КОЖИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Брусника обыкновенная.

Сок ягод применяют наружно при лишае и чесотке.

Сок свежей травы спорыша применяют для лечения кровоточащих или старых ран, язв (соком смочить салфетку и, предварительно обмыв тем же соком рану, положить ее на место поврежденных тканей).

Помогает трава также при ожогах, нарывах.

2. Дуб обыкновенный.

Отвар коры используют для обмываний и компрессов при кожных заболеваниях, ранах, ожогах, отморожениях.

3. Зверобой продырявленный.

Для лечения ожогов, различных кожных заболеваний и ускорения заживления ран используют масло зверобоя (столовую ложку цветков зверобоя залить стаканом растительного масла, настоять 14 дней, временами взбалтывая).

4. Калина обыкновенная.

Соком плодов смазывают лицо при угрях и лишае.

Настой плодов лечит экзему (плоды растереть в ступке, залить кипятком из расчета 1—2 столовые ложки плодов на стакан воды, настоять 4 часа. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день).

5. Клюква болотная.

Компрессы из клюквенного сока применяют при лишае, сухой экземе и других экссудативных кожных процессах.

6. Лопух большой (репейник).

а) настой и отвар корней применяют при нарушении обмена веществ, экземе (чайную ложку измельченного корня залить 2 стаканами кипятка, настоять 12 часов, процедить. Пить по 1/2 стакана теплого настоя 4 раза в день; чайную ложку измельченного корня залить стаканом кипятка, кипятить 5—10 минут на слабом огне, остудить, процедить. Пить по 1 столовой ложке отвара 3—4 раза в день).

б) отвар в виде компресса используют при экземе, дерматитах, кожных сыпях, сопровождающихся зудом (столовую ложку измельченного корня залить 2 стаканами кипятка, кипятить 30 минут, остудить, процедить).

7. Морковь посевная.

Тертую морковь прикладывают к воспаленным участкам кожи, ожогам, гнойным ранам.

8. Облепиха крушиновидная.

Такие кожные заболевания, как кейлит, экзема, чешуйчатый лишай, язвенная волчанка, болезнь Дарье, довольно успешно излечиваются применением внутрь облепихового масла по 2 мл в день и наружно в виде 5-процентной мази из масла облепихи. Облепиховое масло способствует быстрому рассасыванию инфильтратов, снижает зуд, отек, боль и жжение, прекращает шелушение, способствует эпителизации и исчезновению зуда.

9. Тысячелистник обыкновенный.

Примочки из настоя рекомендуются применять при гнойничковых поражениях кожи (2 столовые ложки травы заварить 0,5 л кипятка, настоять 1 час, процедить).

10. Черника обыкновенная.

Настой листьев используют как вяжущее, антисептическое и противовоспалительное средство. Его применяют для наружной обработки ран, язв, а также в виде спринцевания (1 чайную ложку сырья заварить стаканом кипятка, через 30 минут процедить).

11. Шиповник.

а) каротелин — масляный экстракт из мякоти плодов шиповника, рекомендуют для лечения различных кожных заболеваний (трофические язвы, экземы, дерматиты, псориаз) для чего на пораженные участки 1—2 раза в день накладывают салфетки, пропитанные препаратом.

б) масло шиповника, полученное из семян и содержащее ненасыщенные жирные кислоты, каротиноиды и токоферолы, применяют наружно и внутрь. Им смазывают трещины сосков, трофические язвы и пролежни, ожоги, лучевые поражения кожи. При язвенном колите полезны клизмы маслом ежедневно или через день по 50 мл в течение 2—4 недель.

КОЛИТ

Колитом страдают многие. Как известно, при колите жировая оболочка кишок исчезает, поэтому кислоты в желудке действуют непосредственно на стенки кишок. Следующее народное средство зачастую излечивает эту жестокую болезнь.

Заварить в стакане кипятка по 1 чайной ложке золототысячника, шалфея и ромашки. Пить по 1 столовой ложке каждые 2 часа примерно 7—8 раз в день. По истечении некоторого времени (обычно от 1 до 3 месяцев) дозу сокращают, а промежутки между приемами лекарства удлиняют. Средство это считается безвредным, а потому им можно лечиться долгое время. К тому же болезнь эта весьма серьезная и требует продолжительного лечения. Во время курса лечения необходимо соблюдать диету.

КРАПИВНИЦА

1. Ряска.

Ряску сушеную в виде порошка по 1 стол. ложке 4 раза в день перед едой, можно с вареньем или медом. Сырую.

2. Можно делать отвар из ряски: 1 стол. ложку истолченной водоросли на 100 мл кипятка, настоять 10 мин. и сразу выпить.

3. Ряска.

При сильной крапивнице хорошо применять ряску болотную. В сухом виде дневная доза 16 г водоросли, в мокром виде — 30 г.

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ

1. Калина обыкновенная.

В научной медицине кору калины применяют в виде отвара и жидкого экстракта кровоостанавливающего, главным образом, маточного средства и

послеродовом периоде, при маточных кровотечениях на почве гинекологических заболеваний, при болезненных и обильных менструациях.

Такое действие коры калины обусловлено гликозидом вибурнином, который усиливает тонус мускулатуры матки и оказывает сосудосуживающее действие.

Отвар коры рекомендуют при маточных, носовых, зубных и геморроидальных кровотечениях (4 чайные ложки измельченной коры залить стаканом воды, кипятить 30 минут, процедить горячим, долить воду до первоначального объема и принимать по столовой ложке 3 раза в день до еды).

2. Крапива двудомная.

При кровотечениях крапива двудомная применяется так:

Столовую ложку сухих листьев крапивы залить стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне, остудить, процедить. Пить по столовой ложке 4—5 раз в день.

2 столовые ложки сухих листьев крапивы заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 2 раза в день.

3. Пастушья сумка.

1 г пастушьей сумки на 200 мл кипятка. Отвар принимать по 1 ст. ложке 4—5 раза в день.

4. Каллина.

Настойка готовится следующим образом: 4 ст. ложки коры калины залить 200 мл 70%-го спирта и дать настояться в темном месте 10 дней. Принимать по 1 ст. ложке 2 раза в день.

Можно также принимать отвар: 2 ст. ложки коры калины варить в 300 мл воды в течение 10 мин. Принимать отвар по 1 ст. ложке перед едой. Можно принимать с сахаром.

5. Кровохлебка лекарственная.

а) Отвар корней пьют при различных кровотечениях (столовую ложку измельченных корней залить стаканом воды, кипятить 30 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить. Принимать по столовой ложке 5 раз в день до еды).

б) Кровохлебка (корни).

2 стол. ложки дробленых корней залить стаканом кипятка, варить 5 минут и принимать по 2 стол. ложки каждый час. Кровохлебка очень вязкая на вкус, поэтому лучше принимать ее с вареньем. Используется при желудочных, кишечных, почечных и маточных кровотечениях.

6. Ива козья.

2 стол. ложки коры ивы заварить стаканом кипятка и варить 5 минут на водяной бане. Принимать по 50 мл 3 раза в день с вареньем. Это доступное средство, обладающее сильной бактерицидностью.

7. Горец.

2 стол. ложки любого горца заварить 200 мл кипятка. Принимать по 1 стол. ложке отвара 4 раза в день.

8. Тысячелистник.

Настой травы применяют при желудочных, кишечных, маточных, легочных, геморроидальных, носовых и раневых кровотечениях (2 чайные ложки сухой травы заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день до еды).

9. Подорожник большой.

Свежие истолченные листья применяют для остановки кровотечения из ран.

П р и м е ч а н и е:

Прежде чем принимать кровоостанавливающие препараты, нужно обязательно сделать анализ на протромбин и обязательно обратиться к лечащему врачу. Пользоваться ими нужно осторожно, так как при повышенном протромбиновом индексе это может привести к инсульту.

КРОВОТЕЧЕНИЯ НОСОВЫЕ

1. На стакан колодной воды сок $1/4$ лимона или 1 чайная ложка уксуса (не эссенции), или $1/3$ чайной ложки квасца. Втянуть полученную жидкость в нос и задержать там на 3-5 минут, зажав ноздри пальцами. Спокойно посидеть или постоять, но не ложиться. На лоб и нос положить мокрое колодное полотенце или лед.

2. Верное средство остановки кровотечения из носа. Если кровь идет из правой ноздри, то правую руку поднять вверх над головой, а левой зажать ноздрию, и наоборот.

3. Железный ключ.

Одеть железный ключ на шерстяную нитку и повесить его так, чтобы он был на спине между лопаток. Кровь скоро остановится. Народное средство.

4. При кровотечении из носа больной поднимает обе руки на голову, а второй человек зажимает ему обе ноздри или одну на 3-5 минут. Кровь скоро остановится.

5. Тысячелистник.

Растереть свежие листья растения, чтобы они стали влажными, и вставить в нос. Можно отжать сок и капать в нос. Сок действует лучше.

КРОВОТЕЧЕНИЯ МАТОЧНЫЕ

1. Тысячелистник, лист, цвет — 25 г. Крапива, лист — 25 г.

Все мелко порезать, хорошо смешать. 1 столовую ложку на стакан кипятка. Настоять, укутав, 1,5—2 часа. Принимать по 100 г 3 раза в день, за час до еды. Применяется при маточных, легочных, почечных кровотечениях.

2. Пастушья сумка.

1 столовая ложка сухой травы на стакан кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по столовой ложке 3-4 раза в день до еды.

Экстракт самодельный: отвар, сгущенный до половины, по 1 чайной ложке 3 раза в день.

Сок свежий, наполовину разведенный водой, по столовой ложке или по 40—50 капель на ложку воды 3 раза в день. Применяется как вяжущий и кровоостанавливающий препарат при маточных, легочных и почечных кровотечениях.

3. Огуречные плети, огудны. Собирают после уборки огурцов, сушат. 50 г измельченных сухих плетей на 0,5 литра воды. Довести до кипения,

кипятить 5 минут, настоять, укутав, час, процедить. Принимать по полстакана 3 раза в день. В первые же дни кровотечение останавливается, наступает общее улучшение. Желательно постельный режим 2—3 дня.

4. Крапива глухая, яснотка. 1 столовую ложку цветущих макушек или цветоа на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4—5 раз в день при маточных, легочных, почечных и носовых кровотечениях.

5. Горец перечный, перец водяной.

15 г сухой травы на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Экстракт: отвар, сгущенный до половины. Принимать по одной чайной ложке 3 раза в день. Применяется внутрь как сильное кровоостанавливающее и обезболивающее средства при маточных и геморроидальных кровотечениях.

ЛАКТОГОННЫЕ

1. Крапива двудомная, укроп огородный.

Способ приготовления лактогонных сборов: 2 столовые ложки смеси залить 2 стаканами воды, довести до кипения, остудить, процедить и пить по 1/2 стакана 2 раза в день через час после еды.

а) плоды укропа — 1 часть, трава донника — 1 часть, лист крапивы — 1 часть, плоды аниса — 1 часть.

б) корень одуванчика — 1 часть, лист крапивы — 1 часть.

в) лист крапивы — 2 части, семя укропа — 1 часть, семя аниса — 1 часть. 2 столовые ложки смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа. Выпить глотками в течение дня для повышения лактации.

2. Плоды аниса, плоды укропа, плоды фенхеля, трава душицы (порвну). Чайную ложку измельченной смеси заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по стакану настоя 2—3 раза в день для повышения секреции молока у кормящих женщин.

ЛАРИНГИТ

1. Полоскание из свеклы.

Натереть на мелкой терке свеклу. Отжать стакана сока. В него слить стол. ложку столового уксуса. Этим раствором полоскать горло 5—6 раз в день. При этом делать один глоток. Процедуру продолжать до выздоровления. Этот раствор можно употреблять также при фарингите и ангине.

ОТ БОЛЕЗНИ ГОРЛА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕВЦОВ И ДИКТОРОВ

Влить в кастрюлю 1 стакан воды. Насыпать туда 1/2 стакана анисовых семян. Кипятить 15 минут. Затем семена выбросить, а отвар кипятить с

1/4 стакана меда и влить туда 1 столовую ложку коньяка. Мед лучше брать липовый. Принимать по 1 столовой ложке через каждые полчаса.

Иногда случается, что невец или диктор должен выступать, а горло разболелось как раз перед концертом или передачей. Описываемое здесь средство восстановит голос певца или диктора.

ЛИШАЙ КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ

1. Отвар девясила высокого.

10 г девясила на 100 мл воды принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день при лечении красного плоского лишая.

ЛИШАИ ОТ КОШЕК И СОБАК

1. Натирать лишай разрезанным пополам кишмишем или изюмом. Подобного рода лишай сразу проходит, после первого натирания.

ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ

1. Арония черноплодная.

Сок из плодов аронии черноплодной применяют для профилактики и лечения лучевой болезни.

ЛЮМБАГО

1. Лимон, плоды, сок.

Лимоны применяют в народной медицине многих стран при самых различных заболеваниях, в частности, при люмбаго, остром ревматизме, подагре.

МАЛОКРОВИЕ (АНЕМИЯ)

1. Натереть на терке отдельно морковь, свеклу, редьку. Отжать сок этих корнеплодов, слить в темную бутылку в равных количествах. Бутылку обмазать тестом, но так, чтобы она не была плотно закупорена и жидкость могла испаряться из нее. Принимать по столовой ложке 3 раза в день до еды. Курс лечения 3 месяца. Это радикальное средство от малокровия.

2. Взять 400 г свиного, нутряного, несоленого жира, 6 больших антоновских зеленых яблок. Яблоки мелко порезать и положить в сало. Хорошо перемешать и поставить в духовку для томления на небольшой огонь. Пока сало топится, сделать следующее. Взять 12 яичных желтков и растереть их до бела со стаканом сахарного песка. Туда же натереть на мелкой терке 400 г шоколада (4 плитки высших сортов). Когда сало с яблоками перетонится хорошо, атакать из духовки, процедить через сито или марлю и добавить туда состав из желтков с сахаром и шоколадом и все хорошо перемешать, дать смеси остыть. Полученный продукт намазывать на хлеб.

Принимать 3—4 раза в день с каждой едой и обязательно запивать теплым, почти горячим молоком. Действие хорошее. Человек избавляется от малокровия, заметно прибавляет в весе, улучшается самочувствие, укрепляются легкие, проходит истощение.

3. Зверобой — 3 столовые ложки. Крапива глухая (яснотка), цветы — 2 столовые ложки. Ежевика, листья — 2 столовые ложки.

Все измельчить, хорошо смешать, залить 3 стаканами кипятка. Настоять, укутав, 3 часа, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день горячим. Применяется при малокровии.

4. Шиповник, плоды 5 столовых ложек измельченных плодов на литр воды. Кипятить 10 минут. Укутать на ночь. Пить чай в любое время суток с чем угодно. Прекрасно очищает кровеносную систему, улучшает обмен веществ. Настой богат витаминами и применяется при малокровии, цинге, при болезнях почек и мочевого пузыря, при больной печени как тонизирующее средство.

5. Морковь.

Ежедневно утром натощак съедать 100 г моркови со сметаной или растительным маслом.

6. Рябина сибирская.

Настой плодов употребляют как поливитаминное средство при истощении и малокровии (2 чайные ложки плодов залить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, добавить сахар по вкусу и выпить за 3—4 приема в течение дня).

7. При малокровии применяют сборы:

а) лист крапивы, цветки тысячелистника, корень одуванчика (всех поровну). Столовую ложку смеси заварить 1,5 стаканами кипятка, настоять 3 часа, процедить. Выпить за сутки в 3—4 приема за 20 минут до еды. Курс лечения 8 недель.

б) лист крапивы, цветущие верхушки гречихи, лист кипрея (всех поровну). 3 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипятка, настоять 3 часа, процедить. Выпить за сутки в 3—4 приема за 20 минут до еды. Курс лечения 6—8 недель.

в) лист крапивы, лист березы (поровну).

2 столовые ложки смеси залить 1,5 стакана кипятка, настоять 1 час, процедить, добавить 1/2 стакан свекольного сока. Выпить за сутки в 3—4 приема за 20 минут до еды. Курс лечения 8 недель.

8. Очистить и вымыть 300 г чеснока. Положить этот чеснок в 2-х литровую бутылку, залить 1 л 70 град. спирта и настаивать 3 недели. Доза: 20 капель настойки в 1/2 стакана молока 3 раза в день. Однако, настойка чеснока считается более слабым средством чем сам чеснок. Можно взять капсулы, заполнить чесноком и глотать их по 2 или 3 шт. утром натощак и перед сном. При глотании капсул, наполненных соком чеснока от употребляющего совершенно не пахнет чесноком. При лечении малокровия следует принимать от 4 до 5 капсул на прием 2 раза в день, как указано выше.

9. Набить четырехлитровую бутылку полынью. Необходимо брать полынь исключительно майского сбора. Залить полынь водкой. Настаивать 21 день в сухом, полутеплом, темном месте (температура должна быть выше комнатной).

Д о з а: капля настойки на 1 ст. ложку воды. Пить по утрам, раз в день, натощак. Принимать лекарство 3 недели. Если малокровие острой формы, то после 3-х недель сделать перерыва на 2 недели, а затем снова возобновить прием лекарства на 3 недели.

МАЛЯРИЯ, ЛИХОРАДКА

1. Хина.

Принимать только один раз утром при восходе солнца. Так принимать 5 дней подряд. Затем 2 дня отдохнуть, после чего 2 дня опять принимать на восходе солнца. Приняв хину, надо уснуть, то есть продолжить сон. Это главное условие. Через 10 дней человек здоров.

2. Рыба линь.

Раз в день принять желчный пузырь от рыбы линь. Запить водой. Можно пользоваться сухой желчью. Через 3 дня болезнь пройдет.

3. Петрушка (зелень).

2,5 кг зелени петрушки (без корней) пропустить через мясорубку, отжать сок. В отжатый сок влить 150 г водки, смешать. Принимать по 100 г утром натощак и второй раз вечером перед сном тоже 100 г. Третий раз выпить 100 г на следующее утро, все пройдет.

4. Ива (кора).

Настрогать коры ивы. Щепотку (чайную ложку) коры на 1,5 стакана воды. Кипятить на слабом огне, пока не останется 1 стакан. Принимать утром натощак как чай с медом, так как отвар горький. Принимать до полного выздоровления.

5. Чеснок.

Среднюю головку очистить от верхней шкурки, а розовую пленочку, прилегающую к зубчикам, оставить. Растолочь чеснок. Залить стаканом колодной воды (кипяченой). Настоять 12 часов. Принимать при начинающемся приступе 3—4 глотка в постели, хорошо укрыться. За день выпить весь стакан. Принимать в течении 4—5 дней.

6. Трифоль. Вахта трехлистная.

а) 100 г трифоли свежей с цветками и корнями растения измельчить, положить в литровую бутылку, залить водкой. Настоять 14 дней в темном шкафу. Принять 100 г во время приступа и укрыться в постели. Считается, что после 3-х приемов приступы прекратятся.

б) 1 чайную ложку сухих листьев трифоли на стакан кипятка. Настоять, укутав, 1,5 часа, процедить. Принимать по 1/3—1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.

7. Хмель (шишки).

25 г шишек хмеля на 2 стакана кипятка. Настоять, укутав, 1,5 часа, процедить. Принимать во время приступа 50 г, вечером еще 50 г, на следующий день также принять утром и вечером по 50 г хотя бы и не было приступа. Принимать 3 дня, лежа в постели, и после приема хорошо укрыться. В народе считают, что приступы проходят быстро. В течение 2—3 дней будет некоторая тяжесть в голове, которая скоро пройдет.

8. Сирень.

20 свежих липких листов заварить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1,5 часа, процедить. Принимать по 100 г 2 раза в день, утром нато-

щак за час до еды и вечером на ночь после еды в постели. Принимать 10 дней. Считается, что самая застарелая малярия и лихорадка пройдет. Можно принимать и 3 раза в день по 100 г до еды.

9. Сирень.

Второй вариант. 100 г свежих молодых листьев сирени засыпать в бутыл, залить 1 литром водки. Настоять в темном шкафу 14 дней. Принимать 1 чайную ложку до приступа, на другой день 1 чайную ложку во время приступа, на третий день 1 чайную ложку после приступа. Малярия и лихорадка пройдет бесповоротно. Лекарство горькое. Сохраняется долго. Можно принимать по 5 капель 3 раза в день.

10. Сирень.

Третий вариант. 20 штук свежих зеленых листьев сирени промыть и положить в литровую бутыл. Туда же 2 г свежей горькой полыни, долив 1 г эвкалиптового масла. Залить литром водки. Настоять 14 дней в темном шкафу. Принимать по 1 маленькой рюмке перед приступом малярии раз в день. Если болезнь не поддается, то принимать по рюмке 2—3 раза в день до еды.

МЕТЕОРИЗМ

1. Укроп (мелкораздробленное семя) — 50 г. Ромашка, цветы — 50 г. Душица, трава — 30 г. Тмин, мелкораздробленное семя — 30 г.

1 ст. ложку смеси залить 200 мл кипятка. Пить по полстакана два раза в день.

МОЗОЛИ

1. Лук.

Взять луковицу, очистить ее, разрезать пополам, положить в стакан, залить уксусом. Поставить на сутки в теплое место. Потом вытащить лук. Прикладывать к мозолям по листочку 2 раза в день — утром и вечером, завязывая тряпкой.

2. Лук. Второй вариант.

Луковую шелуху вымочить в уксусе в течение 2-х недель. Наложить на мозоль слой шелухи в 1—2 мм, завязать. Делать на ночь. Повторить несколько раз, и мозоли сойдут.

3. Инжир.

Распарить ногу, вытереть досуха, на мозоль приложить внутренней стороной разрезанную ягоду инжира. Делать ежедневно на ночь. Можно ягоду инжира натошак разжевать и привязать на мозоль. Менять ежедневно.

4. Мозоль, потертость, сбитые места с болями. В теплой воде развести марганцовку так, чтобы вода была розовая, добавить чуть-чуть соли. Опустить ноги на 15—20 минут. После вытереть. Быстро проходят боли, и человек получает облегчение.

5. В старину простые люди от мозолей делали следующую мазь. Надо накапать на медные питаки свечного сала (берутся старые медные питаки). Оставляют так 3 дня, отчего образуется зеленая мазь. Эту мазь прикладывают на мозоли и перевязывают.

6. Чернослив.

Разварить чернослив в молоке, вынуть из него косточки. Горячим прикладывать к мозолям, а когда остынет ягода, то замесить снова горячей. Продолжать так делать столько, сколько можно. Мозоли быстро пройдут.

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Анр болотный.

Принимают настой анра по 1/2 стакана 4 раза в день (чайную ложку измельченного сырья залить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить). Пить за 30 минут до еды.

2. Анис обыкновенный.

Применяют и мочегонном сборе: плоды аниса — 5 частей, плоды петрушки — 5 частей, трава пастушьей сумки — 1,5 части, плоды одуванчика — 1,5 части. Столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, кипятить 10—15 минут на слабом огне, процедить. Выпивать утром во время завтрака и вечером по стакану отвара при мочекаменной болезни.

3. Береза белая.

а) настой листьев или почек применяют как мочегонное средство при заболеваниях почек, отеках (2 столовые ложки измельченных листьев или 1 столовую ложку почек залить 0,5 л кипятка, добавить немного питьевой соды, чтобы растворились смолистые вещества, настоять 1 час, процедить). Пить по 1/2 стакана 4 раза в день до еды.

Листья и почки березы входят в различные сборы:

б) лист березы, трава хвоща полевого (поровну). Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять 15 минут, процедить. Принимать по столовой ложке 3-4 раза в день. Это мочегонный сбор. Противопоказан при остром воспалении почек и мочевыводящих путей, при беременности.

в) лист березы — 1 часть, плоды можжевельника — 1 часть, плоды шиповника — 1 часть, корни марены красильной — 2 части. Чайную ложку смеси залить стаканом холодной воды, настоять 10 часов, кипятить 5 минут, процедить. Принимать по 1/3—1/4 стакана 3—4 раза в день при камнях и почках. Противопоказания, как и предыдущем рецепте.

г) лист березы, лист толокнянки, кукурузные рыльца, корень солодки, корневища пырея (поровну). Столовую ложку смеси залить стаканом холодной воды, настоять 6 часов, кипятить 15 минут, процедить. Принимать по 1/3—1/4 стакана 3—4 раза в день при циститах. Противопоказания, как в предыдущем рецепте.

4. Брусника обыкновенная.

Листья брусники в виде настоев и отваров используются в качестве мочегонного, антисептического и вяжущего средства при мочекаменной болезни, воспалениях почек и мочевого пузыря.

При заболеваниях почек и мочевого пузыря готовят сбор: лист брусники — 2 части, трава лаванды холосовой — 1 часть, лист черной смородины — 1 часть, лист березы белой — 1 часть, трава будры плющевидной — 1 часть, плоды можжевельника обыкновенного — 1 часть, шишки хмеля

обыкновенного — 1 часть, лепестки розы крымской — 1 часть, лист толокнянки обыкновенной — 2 части, трава буковицы лекарственной — 2 части, лист подорожника большого — 2 части, трава крапивы даудомная — 3 части, плоды толченые шиповника коричневого — 4 части, плоды земляники лесной — 6 частей, побеги хвоща полевого — 6 частей, 2 чайные ложки измельченной смеси заварить 2,5 стакана кипятка, настоять 30 минут, процедить. Настой принимать в теплом виде по 150 мл 3 раза в день за 30 минут до еды при цистите.

5. Цветки василька.

Цветки василька, лист толокнянки, корень солодки (поровну). Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять 15 минут, процедить. Принимать по столовой ложке 3—4 раза в день. Противопоказан при остром воспалении почек и мочевого пузыря, беременности.

6. При заболеваниях почек и мочевыводящих путей применяют траву спорыша в сборе:

а) трава спорыша — 1 часть, плоды можжевельника — 1 часть, лист брусники — 1 часть, трава золотарника — 2 части, трава хвоща полевого — 2 части. 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, процедить. Утром и вечером за 30 минут до еды выпить по 1 стакану. Курс лечения длительный, через каждые 8 недель двухнедельный перерыв. Применяется при почечнокаменной болезни.

б) трава спорыша — 3 части, почки березы — 3 части, цветки бессмертника песчаного — 3 части, побеги туи — 3 части, лист толокнянки — 4 части, трава грыжника — 4 части, лист подорожника — 4 части. 2 столовые ложки смеси залить на ночь 1 л холодной воды, утром поставить на плиту, довести до кипения и кипятить 10 минут, охладить, процедить. Пить по стакану теплого отвара 5 раз в день при мочекаменной болезни.

в) трава спорыша, кукурузные рыльца, створки фасоли (предпочтительно карликовых форм), трава грыжника, лист толокнянки (все поровну). 3 столовые ложки смеси заварить в термосе 2 стаканами кипятка, настоять 1-1,5 часа, процедить. Выпить в течение суток. Применяется при моче- и желчекаменной болезни.

г) трава спорыша — 1 часть, лист брусники — 1 часть, лист крапивы — 2 части, трава зверобоя продырявленного — 3 части.

4 столовые ложки смеси заварить 0,75 л кипятка, настоять 1,5-2 часа в теплом месте, процедить. Пить по стакану 3 раза в день за 30 минут до еды при почечнокаменной болезни. Курс лечения длительный, через каждые 8 недель двухнедельный перерыв.

7. Зверобой продырявленный.

Трава обладает мочегонным, противовоспалительным, антибактериальным свойством. Готовят отвар так: столовую ложку сырья залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.

8. Клюква болотная.

Свежий сок используют для предупреждения камнеобразования в почках и при лечении инфекций мочевыводящих путей.

9. Лист крапивы.

При заболеваниях почек и мочевыводящих путей лист крапивы применяется в сборе:

а) лист крапивы — 1 часть, трава хвоща полевого — 1 часть, почечный чай — 1 часть, трава спорыша — 2 части. Столовую ложку смеси залить 300 мл горячей воды, кипятить 5 минут, настоять 4 часа в теплом месте. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды (мочегонный чай).

б) лист крапивы, трава зверобоя продырявленного, лист толокнянки, лист подорожника, плоды шиповника (всек пороану). 3 столовые ложки смеси залить 0,75 л холодной воды, довести до кипения, кипятить 5 минут, настоять 15-20 минут, процедить. Выпить за день в 3-4 приема за 20 минут до еды при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Лечение длительное (6 месяцев), прерывистыми курсами (через каждые 8 недель лечения 10 дней перерыв).

в) лист крапивы — 1 часть, лист брусники — 1 часть, лист толокнянки — 1 часть, плоды жостера — 1,5 части. 2 столовые ложки смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять 5-6 часов, процедить. Пить в теплом виде по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой (мочегонный чай).

10. Можжевельник обыкновенный.

Мочегонные сборы:

а) столовую ложку плодов заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по столовой ложке настоя 3-4 раза в день как мочегонное средство.

б) плоды можжевельника, корень солодки, корень стальника, корень любистока (всек пороану). Столовую ложку измельченной смеси настоять на стакане холодной воды в течение 6 часов, затем кипятить 15 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день. Противопоказано при беременности и острых воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

в) плоды можжевельника — 6 частей, плоды фенхеля — 2 части, корень солодки — 2 части. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

г) плоды можжевельника, корень солодки, корень петрушки, корень стальника (всек поровну). Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

д) плоды можжевельника — 4 части, корень любистока — 4 части, корень стальника — 4 части, трава фиалки — 2 части, плоды петрушки — 1 часть, плоды аниса — 1 часть. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

е) плоды можжевельника — 3 части, плоды петрушки — 3 части, трава аниса — 1 часть, плоды тмина — 1 часть, цветки бузины черной — 1 часть, плоды фенхеля — 1 часть. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

При воспалении мочевого пузыря:

ж) плоды можжевельника — 5 частей, лист березы — 5 частей, плоды петрушки — 2 части, корень любистока — 2 части. Столовую ложку измельченной смеси настоять на стакане холодной воды в течение 6 часов, затем кипятить 15 минут, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день. Оказывает действие при щелочной моче.

з) плоды можжевельника — 2 части, лист березы — 2 части, лист толокнянки — 2 части, трава хвоща полевого — 1 часть, корень бадрагана —

1 часть. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

и) плоды можжевельника — 3 части, корневище айры — 3 части, цветки терновника — 3 части, стручки фасоли — 3 части, лист толокнянки — 5 частей. 4 столовые ложки измельченной смеси заварить 1 л кипятка, после остывания процедить и сразу выпить. Стараться как можно дольше задерживать мочу, а при мочеиспускании принимать сидячую горячую ванну.

При камнях в почках мочевого пузыря и мочевого пузыря:

к) плоды можжевельника, плоды тмина, корень солодки, трава хвоща полевого, лист толокнянки, лист розмарина, лист плюща (всех поровну). Столовую ложку измельченной смеси заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1-2 стакана настоя в день.

л) плоды можжевельника — 3 части, лист толокнянки — 3 части, трава пастушьей сумки — 3 части, корень стальника — 3 части, корень любистока — 3 части, плоды аниса — 10 частей. Столовую ложку измельченной смеси настоять на стакане холодной воды в течение 6 часов, затем кипятить 15 минут, процедить. Выпивать утром во время завтрака и вечером по стакану отвара.

м) плоды можжевельника, лист розмарина, трава хвоща полевого (всех поровну). Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

н) плоды можжевельника — 1 часть, корень стальника — 1 часть, корень любистока — 1 часть, трава грыжника — 5 частей. Способ приготовления, как и в предыдущем рецепте. Выпивать по 2—3 стакана в день.

о) плоды можжевельника — 1 часть, трава дрока — 1 часть, лист брусники — 1 часть, трава спорыша — 1 часть, трава хвоща полевого — 2 части. Способ приготовления, как в предыдущем рецепте. Выпивать утром во время завтрака и вечером по стакану отвара.

п) плоды можжевельника — 1 часть, плоды шиповника — 1 часть, лист березы — 1 часть, корни марены красильной — 2 части. Чайную ложку измельченной смеси залить стаканом холодной воды, настоять 10 часов и затем кипятить 5 минут, процедить. Выпить за день глотками.

р) плоды можжевельника, плоды тмина, корень солодки, трава хвоща полевого, лист ромашки, лист брусники, лист земляники (всех поровну). Столовую ложку измельченного сырья заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день.

с) плоды можжевельника, корневище пырея, корень стальника, трава адониса (всех поровну). Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

т) плоды можжевельника, корневище пырея, корень стальника, лист березы, трава чистотела, трава руты, трава лапчатки гусиной (всех поровну). 4 столовые ложки измельченной смеси заварить 1 л кипятка, после остывания процедить и сразу выпить. Стараться как можно дольше задерживать мочу, а при мочеиспускании принимать сидячую горячую ванну.

11. Морозка.

В народной медицине используются все части растения. Свежие ягоды обладают мочегонным действием. Настой листьев применяют как мочегонное — при болезнях мочевого пузыря (столовую ложку листьев заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день ежедневно до наступления лечебного эффекта).

12. Пырей болотный.

Настой корневищ применяют при ревматизме, подагре, желчекаменной болезни, заболеваниях мочевого пузыря, воспалении мочеиспускательного канала, задержке и недержании мочи, заболеваниях дыхательных путей, нарушении обмена веществ (4 чайные ложки измельченных корневищ залить стаканом холодной воды, настоять 12 часов в прохладном месте, процедить. Оба настоя смешать и принимать по 1/2 стакана 4 раза в день).

13. Рябину применяют в сборе:

Плоды рябины — 3 части. Травы брусника — 1 часть. Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять 3—4 часа на плите, процедить. Пить по 1/2 стакана 3—4 раза в день за 30 минут до еды, добавляя чайную ложку меда, при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря.

14. Тысячелистник обыкновенный.

Применяют настой травы при воспалении мочевого пузыря (2 чайные ложки сырья заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день до еды).

15. Хвощ полевой.

а) настой травы применяют при заболеваниях почек и мочевого пузыря, мочекаменной болезни (2 чайные ложки измельченной травы заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Выпивать глотками в течение дня)

Трава хвоща полевого входит в состав различных сборов:

б) трава хвоща полевого — 2 части, лист толокнянки — 1 часть, лист шалфея — 1 часть, трава веронки — 1 часть, корень алтея лекарственного — 1 часть. Столовую ложку сбора залить стаканом холодной воды, настоять 6 часов, затем кипятить 15 минут на медленном огне, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день при заболеваниях мочевого пузыря. Противопоказано при беременности и острых воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

16. Шалфей лекарственный применяют в сборе:

Лист шалфея, лист Melissa, трава вероники, лист плюща, лист мать-и-мачехи (поровну). Столовую ложку сбора заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день для улучшения обмена при мочекаменной болезни.

При острых воспалениях почек и сильном кашле шалфей противопоказан.

17. Шиповник.

Входит в состав мочегонных сборов:

а) плоды шиповника — 2 части, корень аниса дакого — 2 части, корень любистока — 2 части, плоды петрушки — 1 часть, цветки просвирняка — 1 часть, лист толокнянки — 3 части, лист березы — 3 части, корень стальника — 3 части, корневище пырея — 3 части. Столовую ложку сбора залить стаканом холодной воды, настоять 6 часов, затем кипятить 15 минут, процедить. Принимать 1—2 стакана отвара в течение дня в несколько приемов при подостром нефрите.

б) плоды шиповника, плоды можжевельника обыкновенного, семена айвы (поровну). Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте. Употреблять при хроническом нефрите.

в) плоды шиповника — 1 часть, плоды можжевельника обыкновенного — 1 часть, лист березы белой — 1 часть, корень марены красильной — 2

части. Чайную ложку смеси залить стаканом холодной воды, настоять 10 часов, затем кипятить 10 минут, процедить. Выпить в течении дня глотками при почечнокаменной болезни.

г) отвар семян шиповника принимают при камнях в почках и мочевом пузыре (чайную ложку измельченных семян залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить. Пить по 1/4 стакана 3—4 раза в день перед едой).

д) отвар корней употребляют при воспалениях мочевого пузыря, а также как возбуждающее аппетит и вяжущее средство при желудочно-кишечных заболеваниях (2 столовые ложки измельченных корней залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут, настоять 2 часа, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день перед едой).

ОТ РАЗДРАЖЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

При раздражении мочевого пузыря и частых позывах к мочеиспусканию выпить натошак чашку чая из кукурузных рылец или стебельков черешни или вишни. Можно прибавить меду по вкусу. По мере надобности, можно повторить несколько раз ежедневно. И кукурузные рыльца, и стебельки можно сохранить сушеными.

МОЧЕГОННЫЕ

1. Бузина сибирская.

а) столовую ложку листьев заварить стаканом кипятка, кипятить 3—7 минут на слабом огне, охладить, процедить. Отвар применять по столовой ложке 3 раза в день, как мочегонное средство.

б) цветки бузины, цветки терновника, лист березы, трава крапивы двудомной (всех поровну). Столовую ложку измельченного сбора заварить стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить. Утром во время завтрака выпить стакан отвара для повышения диуреза.

2. Можжевельник обыкновенный.

а) столовую ложку плодов заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по столовой ложке настоя 3—4 раза в день как мочегонное средство.

б) плоды можжевельника, корень солодки, корень стальника, корень любистока (всех поровну). Столовую ложку измельченной смеси настоять на стакане холодной воды в течении 6 часов, затем кипятить 15 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день. Противопоказано при беременности и острых воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

в) плоды можжевельника — 6 частей, плоды фенхеля — 2 части, корень солодки — 2 части. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

г) плоды можжевельника, корень солодки, корень петрушки, корень стальника (всех поровну). Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

д) плоды можжевельника — 4 части, корень любистока — 4 части, корень стальника — 4 части, трава фиалки — 2 части, плоды петрушки — 1

ты, плоды аниса — 1 часть. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

б) плоды можжевельника — 3 части, плоды петрушки — 3 части, трава аниса — 1 часть, плоды тмина — 1 часть, цветки бузины черной — 1 часть, плоды фенхеля — 1 часть. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

Мочегонные сборы

Способ приготовления: столовую ложку сбора заварить стаканом кипятка, настоять 20—30 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3—4 раза в день.

1. Лист толокнянки — 2 части, трава череды — 1 часть, трава тысячеликника — 2 части, трава спорыша — 2 части.

2. Лист брусники — 1 часть, кукурузные рыльца — 1 часть, лист березы — 1 часть.

3. Плоды можжевельника — 2 части, трава хвоща полевого — 2 части, корни березовые — 2 части.

4. Корень девясила — 1 часть, лист вахты трехлистной — 1 часть, плоды петрушки — 1 часть, почки березы — 1 часть, цветки василька — 1 часть, лист толокнянки — 5 частей. Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать по столовой ложке 3—4 раза в день как мочегонное средство при заболеваниях почек.

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

1. Знаменитая фитотерапевт* нашей страны разработала и проверила многократно в клинических условиях нижеупомянутый сбор трав. Это замечательное средство при длительном употреблении в течении года не только способствует снятию изнурительных болей и выходу камней, но и предупреждает возможность осложняющей инфекции:

лаванда колосовая (травы) — 10 г, смородина черная (листья) — 10 г, белая (листья) — 10 г, будра плющевидная (травы) — 10 г, можжевельник (плоды) — 10 г, хмель (шишки) — 10 г, роза (лепестки) — 10 г, толокнянка (листья) — 20 г, буквица (травы) — 20 г, брусника (листья) — 20 г, подорожник (листья) — 20 г, крапива (листья) — 30 г, земляника (плоды) — 60 г, хвощ полевой (побеги) — 60 г, спорыш (травы) — 30 г, белая акация (бутоны) — 60 г, донник — 50 г, пастушья сумка — 15 г, василек синий — 30 г, лен (семена) — 40 г.

Если нет всех компонентов смеси, можно смешать имеющиеся, но не нарушать пропорций и заваривать по 10 г смеси на 750 мл кипятка. Принимать по 150 мл теплым. При отхождении камня дозу можно уменьшить до 5—6 г смеси на 500 мл кипятка.

Хорошо на время вывода камней запастись овсяной соломой и во время мочевого колика, связанной с выходом камня, делать горячие компрессы на место крепкого отвара на область почек.

Во время почечной колики хорошо помогают ванны из лекарственных трав.

а) ромашка (цветы) — 20 г, липа (цветы) — 20 г, овсяная солома — 100 г, мальва (листья) — 50 г.

* Н. Г. Ковалев

б) береза (ветки) — 100 г, малина (лист) — 20 г, манжета (лист — г, сушеница (травя) — 10 г.

Заварить смесь для ванн в том количестве, которое приведено выше, 5 кипятка в эмалированном ведре, укутать на час, процедить и вылить ванну, уровень воды в которой должен быть немного выше пояса.

Камни и мочевые пузыри имеют различный состав и происхождение, что зависит в основном от привычек больного, употребляемой им пищи и наличия инфекции в мочевых путях.

Общие положения для всех приведенных ниже рецептов народной медицины:

— Обильное питье — до 2—3 л и день для облегчения отхождения песка и камней.

— После каждого мочеиспускания нужно выпить 150—200 г теплого отвара.

— Употребление отваров во время хорошего самочувствия обычно должно вызывать боли, могут появиться острые приступы, во время которых отходят песок и камни.

— Прием отваров трав лучше всего начинать и период обострения болезни, так как уже и первые дни после начала приема травяных отваров улучшается общее состояние.

— Нельзя принимать не в смеси сильные мочегонные травы, вызывающие ослабление почечной функции.

— Полный покой, никаких резких движений, подъема тяжестей.

МОЧИ НЕДЕРЖАНИЕ

1. Зверобой (цветы и трава). 40 г сушеной травы с цветами на 1 литр кипятка. Настоять, укутав, на 2—3 часа. Принимать без нормы вместо чая и воды при недержании мочи. стакан чая с травой зверобоя, принятый перед сном, хранит ребенка и взрослого от мочеиспускания в постели (непроизвольного) во сне.

2. Шалфей лекарственный.

40 г травы на 1 литр кипятка. Настоять, укутав, на 1—2 часа. Принимать от 100 до 200 мл 3 раза в день.

3. Тысячелистник.

10 г травы с цветками на стакан воды. Кипятить 10 минут на слабом огне. Настаивать, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.

4. Укроп огородный (семена).

1 столовую ложку семян укропа на стакан кипятка. Настоять, укутав, 2—3 часа, процедить. Выпить весь стакан за 1 прием 1 раз в день. В народе считают, что настоем из семян укропа можно на короткое время вылечить недержание мочи у людей любого возраста. Были случаи и полного излечения.

5. Брусника обыкновенная.

а) 2 столовые ложки смеси листьев и ягод заварить 2 стаканами кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить. Половину полученного отвара дают ребенку в течение дня и несколько приемов, вторую дают выпить перед сном.

б) 2 столовые ложки смеси (листья и ягоды) и 2 столовые ложки травы зверобоя продырявленного заварить 3 стаканами кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить. Отвар выпить глотками, начиная с 4 часов дня и кончая отходом ко сну.

6. Тысячелистник обыкновенный.

Применяют настой: 2 чайные ложки травы заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день.

7. Черника обыкновенная.

Едят свежие ягоды.

8. Репяшок обыкновенный.

20 г травы на стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час. Принимать по 1/4—1/3 стакана 3—4 раза в день за 15 минут до еды. При возможности добавлять мед. Применяется при недержании мочи, особенно ночном.

9. Брусника (листья, ягоды).

Отваром из листьев брусники лечат ночное недержание мочи, которое довольно часто, иногда в обременительной форме, бывает у детей и у пожилых. Независимо от того, что листья действуют мочегонно, в этих случаях наблюдается известный эффект. В таких случаях употребляют смесь из ягод и листьев брусники (по столовой ложке того и другого) с добавлением 1-х ножек зверобоя. Эту смесь кипятят 10 минут в 3 стаканах воды. Принимают 3 стакана в день, начиная с 4-х часов и кончая отходом ко сну.

10. Шиповник.

Плоды толченые — 4 столовые ложки, ягоды костяники — 1 столовую ложку, кипятить в 1 литре воды 30 минут на слабом огне. Перед снятием с огня добавить 2 полных столовых ложки цветов шиповника. Дать слегка покипеть. Снять с огня, процедить. Принимать холодным по стакану 2 раза в день.

11. 1 столовую ложку ягод ежевики (свежей или сухой) и 1 столовую ложку ягод черники кипятить на малом огне 15—20 минут в 0,5 литра воды. Принимать по стакану 4 раза в день при недержании мочи.

12. Настоять хорошей глины в воде несколько часов, раза 2 меняя воду. Когда настоится, то воду слить и принимать по рюмке этой воды, насыпав еще 1 г порошка из корня калгана.

13. Самым надежным средством от недержания мочи русские народные лекари испокон веков считали смесь 2 трав: зверобоя и золототысячника. Их надо брать в одинаковом количестве (половина на половину), заварить и пить как чай, 1 чайную ложку на прием.

П р и м е ч а н и е. При частых позывах к моче следует исключить из диеты: сельдерей, арбузы, очень спелый виноград и спаржу до тех пор, пока осложнение с мочевым пузырем не пройдет совершенно.

НАРЫВЫ, ФУРУНКУЛЫ, ЧИРИИ

1. Нарезать мелко мыло, чтобы оно покрывало дно кружки. Налить туда молока а 2 раза больше. Кипятить смесь на малом огне 1—1,5 часа, помешивая, пока не будет густая масса в виде смазки. Наложить на больное место и перевязать. Менять ежедневно.

2. 2 части печеного лука и 1 часть натертого мыла. Растереть и хорошо смешать. Прикладывать пластырь на больное место несколько раз в сутки.

Очень хорошо очищает, помогает быстрому созреванию, очищает нарывы и фурункулы.

3. Лук.

Испечь лук, разрезать пополам, разрезанной стороной приложить к чирью и перевязать. Менять через 4—5 часов. Способствует быстрому созреванию нарыва.

4. Картофель.

Накладывать несколько раз в день на фурункулы или нарывы сырой тертый картофель, перевязать. Менять через 3 часа.

5. Крупа гречневая.

Нажевать сырую гречневую крупу, положить на марлю и приложить к нарыву или чирью. Быстро и безболезненно проходит. Менять через 3 часа.

6. Столетник, агава.

Сорвать лист, обмыть, срезать конец, разрезать вдоль или растолочь. Наложить на больное место и перевязать, менять ежедневно. Хорошо вытягивает гной и способствует созреванию.

7. Столетник, агава.

Второй вариант. Взять льняное, миндальное, персиковое или оливковое масло. Смешать пополам с соком алоэ. Намочить марлю в этом составе, наложить на больное место и перевязать. Менять раз в сутки. Хорошее бактерицидное и заживляющее средство.

8. Одуванчик.

10 г травы и корней на стакан кипятка, настоять, укутав, 3 часа, процедить. Принимать по столовой ложке 1 раз в день как кровоочистительное и улучшающее обмен веществ средство.

9. Крапива глухая (яснотка).

1 столовая ложка сухих цветов на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3—4 раза в день на фурункулах, экземах, как кровоочистительное средство.

НАСМОРК

1. Ментоловое масло (аптечный препарат). Закапать в каждую ноздрю по 3—5 капель ментолового масла. Делать вдохи-выдохи и одновременно смазать маслом: лоб, виски, за ушами, лицо, нос. Можно ментоловое масло хорошо смешать пополам с камфорным. Процедуры те же. Хорошо помогает при начинающемся насморке.

2. Каланхоэ (домашнее растение). При начинающемся насморке достаточно 2—3 раза в день смазать в носу соком из свежего листа каланхоэ, и насморк быстро прекратится. Можно закапывать по 3—5 капель.

3. На 100 г подсолнечного или оливкового масла берут 1 столовую ложку с верхом измельченного багульника. Настаивают 21 день в темном месте, ежедневно взбалтывая. Процедить, отжать. Закапывать по 2—3 капли в каждую ноздрю в первый раз. Потом закапывать по 1 капле 3—4 раза в день. Делать не более недели. Насморк проходит через несколько дней.

4. Керосин.

На ночь намазать подошвы ног керосином и замочить тонкую тряпочку в керосине, отжать, положить на подошвы. Одеть на ноги теплые носки или чулки и тепло укутать. Утром будет облегчение или насморк пройдет совсем.

5. Хронический насморк. Сделать слегка теплую, чуть подсоленную воду. Добавить туда 1 чайную ложку любой из перечисленных настоек (валендула, софора, эвкалипт). Воды брать 0,5 литра. Этой водой промывать нос. Процедура выполняется так: наклониться под углом 45°, носом втянуть раствор и выпустить из рта. Так пропустить весь раствор, поднимая головы высморкаться попеременно через каждую ноздрю. Делать при хроническом насморке дважды в день — утром и вечером.

6. Буквица лекарственная — 10 г в порошок, рути (трава) — 10 г в порошок. Копытень (корень) — 10 г в порошок.

Все хорошо перемешать. При хроническом насморке нюхать этот порошок 3 раза в день.

7. Свекла красная.

Закапывать в каждую ноздрю по 5—6 капель свежотжатого сока свеклы (свежей, не вареной). Можно ватный тампон намочить в свежем соке и закладывать в нос.

8. Горчица сарептская, свекла красная.

а) при хроническом насморке порошок горчицы насыпать в носки. Настоявшимся и забродившим отваром свеклы промывают нос при хроническом насморке.

б) хорошие результаты дает закапывание в нос свежего сока свеклы с добавлением 30% меда.

НЕВРАЛГИЯ

1. Безвременник осенний (корни, семена).

Ядовитое растение. Настойка клубней на уксусе. 1 часть сухих клубней (измельченных) на 12 частей уксуса. Настоять 2 недели. Применять для растирания. Спиртовая настойка. 1 часть мелко нарезанных корней на 5 частей 50-60%-ного спирта. Настоять 2-4 недели в темном месте, изредка встряхивая. Применять для растираний.

Препараты из безвременника содержат в клубнях и семенах кальцикины и другие препараты, которые в виде настоек применяются как наружное болеутоляющее средство при невралгии, суставном ревматизме, подагре. Обращаться осторожно, т.к. растение ядовитое.

2. Клопогон даурский (корневища с корнями).

1 часть корневища с корнями настаивают 7 дней на 5 частях 70% спирта. Принимать по 20 капель 3 раза в день на воде при невралгии, ревматизме.

3. Тополь черный, осокорь (листовые почки).

3 столовые ложки почек кипятить 5 мин. в 4 стакане воды, настоять 4 часа. Употреблять для сидячих ванн и примочек при ревматизме, подагре. Мазь: 1 часть порошка почек на 4 части коровьего масла или свиного жира. Применять наружно для растирания в тех же случаях.

4. Тысячелистник обыкновенный (травя).

1 столовую ложку сухой травы на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день до еды при невралгии, ревматизме.

5. Горьц земноводный (корневища).

1 чайную ложку свежих корневищ варить 10 минут в полтора стаканах воды, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день до еды. Применяется при невралгиях, подагре, ревматизме.

6. Во время невралгического приступа сварить корово вкрутую яйцо, разрезать его пополам и обе половины немедленно приложить к месту, где боль ощущается сильнее всего. Когда яйцо остынет, то и боль исчезнет, сравнительно долгое время невралгия не будет беспокоить больного. Это средство испытанное.

НЕВРАСТЕНИЯ

1. Пион уклоняющийся.

1 чайную ложку сухих корней на 3 стакана кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 15 минут до еды.

Настойка из корневищ, корней и травы пиона уклоняющегося применяется при неврастенических состояниях, бессоннице, вегетососудистых нарушениях различной этиологии. У больных улучшается сон, уменьшается головная боль, повышается работоспособность.

НЕВРОЗ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

1. Валериана лекарственная.

Для приготовления настоя 6—10 г сухого корня настаивают на 180—200 мл воды. По назначению лечащего врача взрослые принимают настой по 1—2 столовых ложки, дети старшего возраста — по 1 десертной ложке, маленькие дети — по 1 чайной ложке 3—4 раза в день.

Настой валерианы применяют по назначению врача для уменьшения возбудимости центральной нервной системы, усиления действия снотворных средств, бессоннице, при нервном возбуждении, неврозах сердечно-сосудистой системы, истерии, хронических нарушениях коронарного кровообращения, при гипертонической болезни I степени, сердцебиениях, пароксизмальной тахикардии, связанной с невротическим состоянием.

НЕРВНОЕ ИСТОЩЕНИЕ

1. Полевой шалфей.

Прекрасное средство при нервном истощении, утомляемости, гипертонии. 6 г бухвицы (3 стол. ложки). Эту дозу залить 500 мл кипятка с сахаром. Настоять 15 минут и пить как чай, перед едой. Это дневная доза.

НЕРВНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ

1. Боярышник.

а) цветки боярышника — 3 части, трава пустырника — 3 части, трава душицы — 3 части, цветки ромашки — 1 часть. Столовую ложку измельченной смеси заварить стаканом кипятка, настоять 8 часов, процедить. Настой принимать по полстакана 3 раза в день через час после еды при заболеваниях сердца и как успокаивающее при нервном возбуждении.

б) плоды боярышника — 3 части, цветки боярышника — 2 части, корень валерианы — 3 части, трава зверобоя — 3 части, трава тысячелистника — 3 части. Столовую ложку измельченной смеси заварить стаканом кипятка, настоять 5-6 часов, процедить. Настой принимать по 1/4 стакана 4 раза в день за 20-30 минут до еды.

НОГ ПОТЕНИЕ

1. Растолочь кристаллы борной кислоты и порошок или взять порошок тонкой борной кислоты. Каждое утро обильно посыпать этим порошком между пальцами и подошвы ног. Вечером ежедневно смывать водой 35-40°C. В течение первой недели лечения следует надевать чистые чулки или носки ежедневно. Дурной запах ног исчезает после 2-недельного лечения.

2. Взять немного дубовой коры и измельчить ее в порошок, обильно посыпать чулки или носки с внутренней стороны этим порошком ежедневно до тех пор, пока потение сократится наполовину. Полное исчезновение потения не желательно, так как человек может ощущать сильные головные боли.

3. Мыть ноги каждый день холодной водой. Мыть днем, но не вечером.

4. Квасцы. Порошок квасцов насыпать внутрь чулок или носков. Делать продолжительное время.

Мытье ног квасцами жжеными. 1/5 часть чайной ложки или на кончике ножа жженных квасцов на 1 стакан горячей воды, размешать и обмывать воспаленные места.

5. Овсяная солома.

Крепким отваром из овсяной соломы делают 15-20 минутные ножные ванны, часто с добавлением дубовой коры.

6. При сильном потении ног пользуются ваннами из отваров дубовой коры 50-100 г на 1 литр воды. Кипятить 20-30 минут на небольшом огне. В народе такие ежедневные ванны считаются вернейшим средством против потения ног.

7. Мыть ноги. 1/4 чайной ложки хлорной извести на 3 литра кипяченой воды. Сделать пену из детского мыла. Промыть ноги в этом составе. Не смывая, вытереть насухо.

8. Скрывшийся ножной пот вернее всего вызвать снова, если под теплыми ногами носить подошвы из бересты.

9. Обмывание ног соленой водой. 1 чайную ложку соли на стакан горячей воды. Обмывать ноги на ночь и утром прохладной соленой водой.

10. Обмывание ног содовой водой утром и вечером. 1 чайную ложку соды на стакан теплой воды. Промыть и обтереть ноги, положить

намоченную ватку в соде между пальцами на ночь. Будет чесаться саднить, надо потерпеть. Утром обмыть ноги содовой водой, обтереть обуться. Очень скоро пройдет пот и запах.

11. Потливость ног с запахом и нагноением. Хорошенько промыть ноги теплой водой с мылом, ополоснуть холодной водой. Взять солому овсяного ячменя или овса, или пшеницы, или траву пырея ползучего, переплести между пальцами, как плетут корзины. Надеть чистые носки, проспать ночь. Утром солому выбросить, ноги вымыть, одеть чистые носки. Так повторять ежедневно на ночь. В народе считается одно из лучших средств. Достаточно проделать это в течение недели, и болезнь проходит на долгие годы. Исчезает запах, потливость ног, нагноение.

12. 2 раза в день перекладывать ноги и пальцы свежими березовыми листьями.

ОТ ОТЕКОВ НА НОГАХ

Пить отвар из льняного семени. 4 чайных ложки семян на 1 литр воды. Кипятить 10-15 минут. Кастрюлю закрыть и поставить в теплое место. Дать настояться 1 час. Можно не процеживать. Для вкуса можно прибавить лимонного сока или какого-либо другого фруктового сока. Пить по 1/2 стакана через 2 часа 6-8 раз в день. Результат достигается через 2 или 3 недели. Лучше пить горячим.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

1. Для улучшения обмена веществ предлагается следующая смесь: череда (травы) — 10 г, бузина черная (цветы) — 10 г, орех грецкий (листья) — 10 г, лопух (листья, корень) — 10 г, хмель (шишки) — 10 г, береза (листья) — 10 г, вербена (травы) — 5 г, земляника (листья) — 10 г, душистый (травы) — 10 г, яснотка (травы) — 10 г, солодка (корень) — 10 г, подмаренник (травы) — 10 г.

1 ст. ложку этой смеси заварить стаканом кипятка, настоять как чай, и пить в промежутках между едой и на ночь. За день нужно использовать стакан сушеной смеси.

ОТ ОДЫШКИ И ГРУДНОЙ ЖАБЫ

1. 1 литр меда, 10 лимонов выжать, 10 головок чеснока почистить (целые головки) и смолоть чеснок в кашку. Все это смешать вместе и поставить на неделю в банку закрытым. Пить каждый день по 4 чайных ложечки 1 раз в день. 4 ложечки, но не сразу глотать, а не торопясь, медленно потреблять одну ложечку за другой. Дня не пропускать. Этого количества должно быть достаточно на 2 месяца.

Этим рецептом часто вылечиваются такие дряхлые старики, которые не могут пройти 50 шагов, не останавливаясь для отдыха.

2. 350 г чеснока размолоть. Выжать сок из 24 лимонов. Размолотый чеснок и сок лимонов налить в банку с широким горлом, поставить банку

В 24 часа и сверку завязать легкой, прозрачной тряпочкой. При приеме смачивать.

Принимать 1 раз в день перед сном. 1 чайную ложку этой смеси на стакан воды, размешать и выпить. По истечении 10-14 дней человек почувствует в этом средстве эликсир молодости и отсутствие усталости, и пользующийся этим чудесным средством будет награжден хорошим сном.

Это средство от одышки для омоложения крови, особенно у тучных людей с вялым дряхлым организмом, и почти эликсир молодости.

ОЖОГИ

Свежевыпущенная моча человека — прекрасное средство от ожогов. Смачивать ожог мочой. Перебинтовывать ожоги и все время смачивать бинты мочой, не давая высохнуть. При сильных ожогах делать такую процедуру в течение нескольких дней.

2. Картофель.

Очистить свежий картофель, натереть на терке. Наложить на тряпку и привязать на больное место. Как только компресс нагреется, сменить его.

3. Чай.

Заварить заварку черного или зеленого чая. Остудить заварку до 13-15°. Поливать этой заваркой обожженные места. Перебинтовывать обожженные места. Постоянно смачивать бинты заваркой, не давая им высохнуть. Делать так 10-12 дней. Помогает хорошо.

4. Ожог без ран, с волдырями.

Постное масло — 1 столовая ложка, сметана — 2 столовые ложки, яйцо свежее (желток) — 1 штука.

Все хорошо смешать. Смазать густо ожог и перебинтовать.

Менять повязку раз в сутки.

5. Зверобойное масло.

1 часть свежих цветков зверобоя настоять в 2 частях масла (подсолнечного, или льняного, или оливкового, или персикового). Настоять в закрытом флаке. Потом процедить, отжать. Полученное масло с ком применяется для лечения ожогов, даже если поражено 2/3 поверхности тела. На пораженные больные места делаются масляные компрессы. Это масло применяется также для лечения ран, язв, высыпаний рубцов при простуде.

6. Короваье масло, яйца.

100 г несоленого коровьего масла хорошо смешать с 2 свежими куриными яйцами (скорлупы выбросить). Положить эту смесь на обожженное место и перебинтовать. Когда мазь засохнет, заменить свежей. Эта мазь лечит даже большие ожоги.

7. Алоэ древоподобное.

Применяют свежий сок, пропитывая марлевую повязку и орошая раны.

8. Горьц птичий.

Применяют свежую траву а горьца кашицы или сок для примочек.

9. Дуб обыкновенный.

Отвар коры используют для обмывания ран и примочек.

10. Мазь календулы.

Для лечения ожогов применяют мазь календулы. Настойка календулы — 1 часть, вазелин — 2 части.

11. Капуста.

Используют свежие листья капусты в виде повязки.

12. Клевер луговой.

Делают примочки из цветков (2-3 столовые ложки суш. цветков обварить кипятком, завернуть в марлю, приложить к больному месту).

13. Лопух большой.

К ожогам прикладывают кашицу из свежих листьев.

14. Морковь посевная.

Прикладывают тертую морковь к больному месту.

15. Подорожник большой.

Свежие истолченные листья прикладывают к ожогу.

16. Тыква.

Компрессы из сока помогают при ожогах.

ОПРЕЛОСТИ

1. Гречиха посевная.

Муку из листьев применяют в виде присыпки при опрелости у детей.

ОПЬЯНЕНИЕ

1. Мята, настойка.

20 капель настойки мяты на стакан холодной воды. Выпить все сразу. Быстро проходит опьянение и снижаются головные боли и тяжесть в голове.

2. Нашатырный спирт.

5-6 капель нашатырного спирта на стакан холодной воды. Выпить за 1 прием. Применяется для отрезвления выпившего человека.

3. Чай.

Перед тем, как идти в гости и для того, чтобы не захмелеть, надо выпить бокал хорошо заваренного с мятой зеленого или черного чая. После приезда домой или в гостях снова повторить чаепитие. Опьянение вскоре проходит.

4. Кофе черный.

Перед ожидающим застольем выпить чашечку хорошо заваренного черного кофе с лимонным соком или с ломтиком лимона. После застолья повторить такую же процедуру. Опьянение быстро проходит.

ОСТЕОМИЕЛИТЫ

1. Алоэ древовидное.

Применяют сок алоэ в виде примочек.

2. Крапива двудомная.

В период рубцевания свищевые ходы промывают соком из свежих листьев.

ОТЕКИ

1. Береза белая.

Настой листьев или почек пьют по 1/2 стакана 4 раза в день до еды: 2 столовые ложки листьев или 1 столовую ложку почек залить 0.5 л кипятка, настоять 1 час, процедить.

2. Брусника обыкновенная.

Отвар листьев: 2 чайные ложки сырья залить стаканом воды, кипятить минут. Охладить, процедить и выпить глотками в течение дня.

3. Тыква обыкновенная.

Сок тыквы пьют по 0.5 стакана в сутки.

ПАРАЛИЧ

1. Пион уклоняющийся (корни).

1 чайную ложку сухих корней на 3 стакана кипятка. Настоять, укутав, час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. Спиртовую настойку принимать по 30-40 капель 3 раза в день до еды. Применяется при параличах, ревматизме, подагре.

2. Сумах дубильный, сумах красильный (свежие листья).

1 чайную ложку свежих листьев на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день при параличах, ревматизме, подагре.

3. Шиповник (корни, плоды).

Наружно отвар корней употребляется для ванн при параличах и слабости ног. Отвар сухих плодов используют для ванн при ревматизме.

ПАРАЛИЧ ДРОЖАТЕЛЬНЫЙ

1. Взять 100 г шалфея, залить 200 мл кипятка, затем настоять, укутав, в течение 8 часов. Принимать по 1 чайной ложке через час после еды, обязательно запивая молоком или киселем.

При лечении этой болезни необходимо сочетать прием шалфея внутрь с ваннами из шалфея. Для этого заварить 300 г шалфея на 8-10 литров воды. Наставать, закрыв посуду крышкой, 30 минут. Налить в ванну сначала колодной воды, а потом горячей и добавить туда процеженный отвар.

ПЕРЕЛОМЫ

1. Медь.

В русской народной медицине переломы лечили так: мелким шпильником (надфилем) от старой медной монеты настругивали медный порошок. Примерно 0.1 г этого порошка размешивали в молоке или сметане, или растирали с яичным желтком и давали больному внутрь 2 раза в неделю. Это способствовало быстрому сращиванию перелома.

2. Мазь.

Еловая смола живица — 20 г. Луковица растертая (растолченная) — 1 штука. Масло растительное, лучше оливковое — 50 г. Медный купорос в порошке — 15 г.

Все тщательно растирают и топят на огне, не доводя до кипения. Мазь обладает жгучим действием, активно лечит нарывы, ушибы и переломы костей.

3. Васнлек.

Мелко растолочь цветы и траву василька, смешать с соком терна. Принимать утром натощак ежедневно 8 дней по 1-2 столовые ложки. Применяется при переломах ребер и других суставов.

4. Мумие.

Суточная доза 0.15-0.2 г. Принимать утром натощак, разведя в теплой воде. После 10-дневного приема сделать перерыв 5 дней. Затем провести второй курс лечения. При переломах крупных костей (таз, позвоночник, бедра, голени) рекомендуется провести третий курс лечения — еще 10 дней.

5. Окопник, чернокорень.

При переломах костей, а также при туберкулезе делают обklady свежих или сушеных корней окопника или чернокорня. Для этой же цели готовят мазь из этих корней: истолченный свежий корень (можно пропустить через мясорубку) смешивать поровну со свиным несоленым топленым салом. Делают компрессы и наложения при переломах.

ПЕЧЕНИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Береза белая.

Настой листьев или почек применяют при заболеваниях печени для улучшения желчеотделения. 2 столовые ложки листьев или 1 столовую ложку почек залить 0.5 л кипятка, добавить немного пищевой соды, чтобы растворились смолистые вещества, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день до еды.

При заболеваниях печени и желчных протоков применяют также сборы:

2. Травы спорыша.

а) трава спорыша — 3 части, цветки ромашки аптечной — 1 часть, кора крушины — 2 части, трава зверобоя продырявленного — 4 части, цветки бессмертника песчаного — 4 части. 4 столовые ложки смеси залить на ночь 1 л колодной воды, утром поставить на плиту, довести до кипения, кипятить 5-10 минут, остудить, процедить. Первый стакан выпить натощак утром, а остальные разделить на 4 приема, каждый из которых будет через час после еды при заболеваниях печени и желчекаменной болезни. Исключить из пищевого рациона острое, соленое, копченое, жареное, жирное.

б) столовую ложку измельченного корня спорыша залить стаканом воды комнатной температуры, поставить на 30 минут на кипящую баню, настоять 15 минут, процедить. Принимать по столовой ложке 3-4 раза в день при колециститах, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

в) трава спорыша, трава чистотела, корень одуванчика, кукурузные рыльца, трава зверобоя продырявленного, трава фиалки трехцветной, плоды аниса, плоды кориандра (все по поровну). 3 столовые ложки смеси залить 3 стаканами кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1 стакану 3 раза в день при желчекаменной болезни.

г) столовую ложку травы спорыша заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1 столовой ложке 2-3 раза в день за 30 минут до еды при камнях желчного пузыря.

3. Деяснл аысокий.

Настой корня обладает желчегонным действием. Чайную ложку травы залить стаканом кипяченой холодной воды, настоять 10 часов, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

4. Зверобой продырявленный.

Отвар пьют как желчегонное и противовоспалительное средство: столовую ложку травы залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.

5. Календула лекарственная.

Обладает желчегонным действием, применяется в виде настоя.

2 чайные ложки цветков заварить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день.

6. Кукуруза.

Применяют желчегонный настой кукурузных рылец: столовую ложку сырья заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по столовой ложке через каждые 3 часа.

7. Тыква обыкновенная.

Мякоть плодов и сок употребляют при нарушении обмена веществ, холестазах печени (0.5 кг тертой мякоти сырой тыквы или 0.5 стакана сока мякоти в сутки).

ПНЕВМОНИЯ

1. Овес.

Один стакан промытого овса с шелухой залить 1 л молока и варить в течение часа на медленном огне. Процедив, пить горячим, можно с маслом и медом. Особенно полезно принимать его на ночь, но в термосе отвар пить нельзя, так как он быстро скисает.

Овес применяется при тяжелых пневмониях, особенно для ослабленных больных.

ПОВЫШЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА

Хорошим средством является морковный сок. Чем больше кислотности в желудке, тем больше следует потреблять морковного сока. Это средство очень старинное, а также повсеместно применяемое в России.

ПОДАГРА, ОТЛОЖЕНИЕ СОЛЕЙ

1. Шалфей.

2 коробки по 50 г на 6 литров воды. Кипятить 10 минут, когда остынет по горячей, насколько терпит рука, температуры, можно парить больные руки или ноги в этом отваре. Парить от 30 минут до 1 часа. Перед этим 1 литр отвара отлить и держать горячим, подливая его в таз или ведро время от времени. Делать раз в сутки перед сном в течение 1-2 месяцев. Рассасываются шишки рук и ног, снимаются боли. После процедуры одеть теплые шерстяные носки или перчатки на руки и лечь в кровать. Следить, чтобы не было холодного воздуха. Делать лучше перед сном.

2. Растопить свежее коровье несоленое масло в посуде над огнем. Когда масло начнет закипать, надо снять с него пленку. Добавить в масло

столько же очищенного винного (медицинского) спирта, размешать. Затем сжечь эту смесь и дать спирту выгореть. Оставшаяся масса — лучшее лечебное средство от подагры. Втирать в больные места обязательно вблизи жаркого огня: печи, камина, костра, плиты.

3. Пчелоужаливание.

При подагре приносит хорошие результаты. Но подходить надо осторожно, помня, что пчелиный яд токсичен, и его некоторые люди плохо переносят. Наши врачи успешно лечат пчелоужаливанием невралгии, ревматизм, подагру, артриты и другие болезни.

4. Ромашка аптечная, цветы.

Из отвара ромашки 100 г на 10 литров воды, смешанного с 200 г соли, делают ванны при подагрических опухолях рук и ног.

5. Ромашка аптечная, цветы черной бузины. Смесь слегка залить кипятком, подогреть на огне в кастрюле. Процедить, наполнить подушечки из материи и прикладывать на больное место, обвязать. Применяются также прогревания при подагре, флюсе, зубной боли с опухолью щеки, боли в щеках после простуды на сквозняках, когда болит голова, при болях и прострелах в пояснице.

6. Сирень майская (цветы) (не мнчуринская).

Цветы сирени насыпать рыхло в поллитровую бутылку до верха, залить водкой или спиртом. Настоять 21 день в темном месте, процедить. Принимать по 30 капель 3 раза в день до еды. Курс лечения 3 месяца. Этой же настойкой делать растирания и компрессы. Применяется при подагре, отложениях солей.

7. Земляника (ягода).

Когда созреет земляника, то есть ее свежую а течение всего сезона пока она созревает. Принимать ее ежедневно в больших количествах при подагре, ревматизме, при нарушениях обмена веществ.

8. См. раздел "Ревматизм, полиартрит", рецепты № 1, 2, 3, 4, 5.

9. Сирень обыкновенная.

2 столовые ложки цветов залить 200 мл водки или 70° спирта. Настояться а течение 7 дней в темном месте, периодически встряхивать. Принимать по 20-30 капель спиртовой настойки или по 50 капель водочной настойки 3 раза в день перед едой.

10. Череда.

Заваривать череду нужно свежим кипятком (не подогревая кипяченую воду) и настаивать 15 минут без укутывания под фарфоровым блюдцем. Процедить и пить только горячим. Если настой имеет цвет не золотистый, а зеленовато-мутный, то принимать его не имеет смысла. Лечить можно длительным питьем череды, заваренной как чай, без дозировки. Череда должна быть не перезрелой, ее нужно собирать на стадии бутонизации цветков, сушить обязательно в тени небольшими пучками.

11. Буканца или полевой шалфей.

5 г травы с цветами буквицы на 200 мл кипятка с 2 стол. ложками портвейна или другого десертного вина. Настоять, как чай, укутать на 15 минут и принимать по 1/3 стакана 3 раза а день перед сдой.

12. Вахта трехлистная (листья).

5 г листьев на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза а день до еды. ИЛИ: 1/2 чайной ложки

псы на 2 стакана холодной кипяченой воды. Настоять 8 часов, процедить. Принимать по 1/3—1/2 стакана 2—4 раза в день до еды. Применяется при подагре.

13. Плющ обыкновенный (листья).

1/2 чайной ложки листьев на 1 стакан холодной кипяченой воды. Настоять 1 час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день при подагре.

14. Пырей ползучий (корневища).

2 чайные ложки корневищ на 1 стакан воды. Кипятить 10 минут. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1—2 столовых ложки 4 раза в день. Или 4 чайные ложки сухих корневищ на 1 стакан холодной кипяченой воды. Настоять 12 часов, процедить. Остаток корневищ залить стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить. Смешать оба настоя. Принимать при подагре.

15. Ряска маленькая (растение целиком).

1 столовую ложку чисто вымытой и измельченной ряски настаивать 4 суток в 250 г водки, процедить, отжать. Принимать по 15—20 капель 2—3 ложками воды 2—3 раза в день. Вымытую измельченную ряску смешать с медом. Принимать по 1 г 2 раза в день. Применяется при подагре, ревматизме.

16. Агава американская.

Приготовить следующую настойку: 10 г свежих листьев агавы американской в 100 мл 70° спирта, настаивать 10 дней в темном месте. Принимать по 20 капель, 3 раза в день перед едой.

17. Хмель (шишки).

Для лечения подагры и ревматизма из порошка сухих "шишек" приготавливают мазь. 1 столовую ложку порошка "шишек" растереть с 1 столовой ложкой несоленого свиного сала или свежего сливочного масла. Употреблять как болеутоляющую мазь при подагре и ревматизме.

18. Сабельник болотный.

Приготовить спиртовую настойку из корня или стебля сабельника. 250 г сухого корня и 500 мл водки настаивать в темном месте 3 недели. Принимать по 25 г 3 раза в день перед едой. Курс лечения продолжается 2—3 месяца при регулярном приеме.

19. Хвощ полевой (травы).

4 чайные ложки сухой травы на 2 стакана кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 5—6 раз в день при подагре, ревматизме.

При остром нефрите и неврозонефрите не принимать из-за раздражения почек.

20. Лапчатка прямостоячая.

20 г лапчатки на 100 мл 70° спирта настаивать 6 недель в светлом месте и принимать по 40 капель 2—3 раза в день перед едой. При склонности к запорам это средство не рекомендуется.

21. Яблоня домашняя (плоды, сок).

Плоды препятствуют образованию мочевой кислоты, почему и употребляются при всех заболеваниях, связанных с накоплением в организме солей мочевой кислоты. Яблоки употребляются при подагре, хроническом ревматизме. Хорошо и полезно пить отвары и настои из

яблок. Нарезать 3—5 неочищенных яблок, кипятить в закрытой посуде минут, настоять 4 часа. Принимать в теплом виде как чай несколько раз в день. Или просто порезать яблоки в чай, дать им настояться и пить как чай.

22. Будра плющевидная (травя).

1 чайную ложку свежей травы на 1 стакан кипятка. Настоять, укутать на 1 час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 2—3 раза в день теплым настоем. В немецкой народной медицине настой будры употребляют для компрессов при подагре.

23. Барбарис.

25 г коры барбариса на 100 мл 70° спирта. Наставать 7—10 дней в темноте. Принимать по 30 капель 3 раза в день. Настойка способствует растворению отложенных солей в организме, и постепенному уменьшению при этом заболеваний подагрических узлов и снижению мышечных болей.

24. Осина (кора внутренняя молодых ветвей, лист).

Спиртовую настойку внутренней коры молодых ветвей с листьями (1 часть сырья на 10 частей 70° спирта) принимать по 25—30 капель на воде 3 раза в день при подагре и ревматизме.

25. При запущенной подагре помогает отвар:

вионил синий (цветы) — 5 частей, календула (цветы) — 5 частей, пион (цветы) — 5 частей, можжевельник (плоды) — 5 частей, крушина (кора) — 5 частей, бузина черная (цветы) — 10 частей, крапива двудомная (лист) — 10 частей; ива (кора) — 20 частей; хвощ полевой (травя) — 20 частей; береза молодая (лист) — 20 частей.

Столовую ложку с верхом смеси залить 300 мл кипятка в фарфоровой посуде, укутать. Через полчаса выпить весь горячий отвар. Повторять каждые два часа. Это рецепт профессора С. Я. Соколова.

26. Лен посевной (семена).

2 чайные ложки семян отварить 15 мин. в полутора стаканах воды, настоять 10 мин., взбалтывать 5 мин. в бутылке, процедить через марлю. Принимать по 1 столовой ложке 4—5 раз в день при подагре и ревматизме.

27. Любисток лекарственный (корни).

5 г сухих корней варить 10—15 мин. на малом огне после закипания. Настоять, укутав, 2—3 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день за 30 мин. до еды при подагре и ревматизме.

28. Латук дикий, лук компасный (травя).

Ядовитое растение. 1 чайную ложку травы на 3 стакана кипятка. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды при подагре. Точно соблюдать дозировку.

29. Лапчатка прямостоячая (корневища).

1 столовую ложку корневища на 1 стакан воды. Кипятить 15—20 минут. После кипячения настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день за 30 мин. до еды при подагре и ревматизме.

30. Козелец приземистый (корни).

1 столовую ложку сухих корней варить 10 мин. в стакане кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день при подагре.

31. Золотая розга, золотарник (травя).

2 чайные ложки травы на 1 стакан остуженной кипяченой воды. Настоять 4 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день до еды при подагре, ревматизме.

32. Капуста огородная.

Капусту употребляют при подагре в виде салатов. Сырые листья, приложенные к больным местам, "унимают подагрическую боль и колотье в боку".

33. Прострел луговой (листья).

Применяется в виде холодного настоя. 2 чайные ложка измельченного сырья на 1 стакан холодной кипяченой воды. Настоять 24 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке через каждые 2—3 часа при подагре и суставном ревматизме. Так как прострел сильно раздражает пищеварительный тракт, он противопоказан при гастрите и нефрите.

34. Лабазник вязолистный, таволга вязолистная (цветы).

15 г цветов на 1 латр кипятка. Настоять, укутав, 3 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день при подагре и ревматизме.

35. Черда трехраздельная (травя).

2 столовые ложки травы на 500 мл кипятка. Настоять, укутав, 12 часов, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день при подагре и артритах.

36. Смородина черная (лист).

1 столовую ложку листьев на 500 мл кипятка настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4—5 раз в день при ревматизме и подагре. Листья обладают сильным потогонным и мочегонным действием, освобождают организм от пуриновых веществ и избытка мочевой кислоты и поэтому служат хорошим средством при подагре и ревматизме.

37. Горичник русский (корни).

1 чайную ложку сухих корней на 2 стакана холодной воды. Настоять 8 часов, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3—4 раза в день за 30 мин. до еды при подагре, ревматизме.

38. Береза белая, повислая (почки, листья, сок).

Спиртовая настойка. Принимать по 15—20 капель 3 раза в день с водой. Отвар: 5 г березовых почек на 1 стакан воды. Капать 15 мин. на малом огне. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день через час после еды. ИЛИ: 1 столовую ложку сухих листьев на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 6 часов, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2—3 раза в день. Препараты из березы применяются при ревматизме, подагре и при различных поражениях суставов. При острых воспалениях почек не применять. Наружно: спиртовой настойкой из почек березы делают растирания и компрессы на больные суставы.

Сок березовый. Весной сок принимают по 1/2—1 стакану 3 раза в день как хорошее кровоочистительное средство, а также при подагре, ревматизме, артритах.

39. Орех грецкий (листья).

1/4 кг листьев отварить в 1 л воды. Употреблять для ванн и обмываний при подагре, ревматизме.

40. Дягель лекарственный (корневище и корни).

Спиртовую настойку (1:5) корневищ употребляют для натираний при подагре, мышечных болях, ревматизме.

41. Вероника лекарственная (травы).

2 чайные ложки травы на 2 стакана кипятка, настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день через 1 час после еды при подагре, ревматизме.

42. Буквица лекарственная (травы).

1 столовую ложку травы на 2 стакана кипятка. Настоять, укутав, 2 часа. Принимать по 1—2 столовых ложки 3—4 раза в день до еды при плохой циркуляции крови, болях в суставах, при подагре.

43. Герань луговая, кроваво-красная, лесная, болотная (травы).

2 чайные ложки сухой травы на 2 стакана холодной кипяченой воды. Настоять 8 часов, процедить. Принимать глотками в течение дня весь настой при подагре.

44. Бедренец-камнеломка (корни и корневища).

15 г корневищ с корнями на 500 мл воды кипятить 15 мин., после закипания настоять, укутав, 4 часа, процедить. Принимать по 1/4—1/3 стакана 3—4 раза в день до еды. Водочную настойку (1:5) принимать по 30 капель 4—5 раз в день с водой до еды. Применяется при подагре и ревматизме.

45. Пижма обыкновенная (цветы).

1 столовую ложку цветочных корзинок на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день за 20 минут до еды при ревматизме. Наружно настой цветочных корзинок и настоем листьев в виде теплых ванн и компрессов применяют как обезболивающее средство при подагре, болях в суставах, ревматизме.

46. Эвкомия вязколистная (стебли, кора).

Спиртовую настойку стеблей и коры принимать по 15—20 капель с водой 2 раза в день при подагре.

10 г коры на 1 стакан воды. Кипятить 10—15 мин., настоять, укутав, 4 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день при подагре.

47. Чеснок посевной (луковицы).

40 г измельченного чеснока настоять в закрытом сосуде в 100 мл спирта или водки (можно прибавить для улучшения вкуса мятных капель — 3—5 капель). Принимать по 10 капель 2 раза в день за 30 мин. до еды при подагре. Полнокровным, эпилептикам и беременным женщинам не принимать.

48. Черника обыкновенная (плоды).

1—2 чайные ложки ягод черники на 1 стакан кипятка, настоять, укутав, 3—4 часа, подсластить. Принимать по 1/4 стакана 5—6 раз в день при подагре, ревматизме и других заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ.

49. Вареный растертый корень репы прикладывают к больным местам при подагре.

50. Ментол — 2,5 г, анастезин — 1,5 г, новокаин — 1,5 г, спирт 90° — 100 мл.

Больные места смазывать жидкостью два раза в день.

51. Лопух тестообразный накладывать на больное место.

52. Сирень обыкновенная, рай-дерево (цветы, почки).

Весьма интересно применение цветков сирени в народной медицине Восточной Сибири, при отложении солей в суставах и особенно при шпоре пяточной. В этом случае рекомендуют высушенные цветки насыпать рыхло в пол-литровую бутылку и затем залить водкой, настоять 8—10 суток, после чего принимать внутрь по 30—40 капель 2—3 раза в день и одновременно делать компрессы из той же настойки или натирать болезненные участки. Рекомендовано (А. П. Попов) при ревматизме делать настойку на водке из цветов и почек сирени. Принимать как указано выше.

ПОЛИАРТРИТ

1. Чистотел большой (травя).

1 чайную ложку сухой травы на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. При хроническом полиартрите. Точно соблюдать дозировку, растение ядовитое.

ПОЛОВАЯ СЛАБОСТЬ, ИМПОТЕНЦИЯ

1. Левзея сафлоровидная (маралий корень).

Настойка. Принимать по 20—30 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как тонизирующее при переутомлении, половой слабости.

2. Заманиха высокая. Настойка.

Принимать по 30—40 капель 2 раза в день, утром и в обед за 30 минут до еды. Применяется в качестве тонизирующего и стимулирующего средства, при половом бессилии.

3. Аралия маньчжурская. Настойка.

Принимать по 30—40 капель 2 раза в день утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как стимулирующее центральную нервную систему, при половой слабости.

4. Родиола розовая (золотой корень). Настойка.

Принимать по 20—40 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Действует, главным образом, на нервную систему, при импотенции. Противопоказано при резко выраженных симптомах повышенной нервной возбудимости, гипертонических кризах, истощении корковых клеток, лихорадочных состояниях.

5. Пантокрин. Настойка.

Принимать по 15—20 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как сильное тонизирующее средство, при импотенции, как общеукрепляющее.

6. Элеутерокок. Настойка.

Принимать по 15—20 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как стимулирующее центральную нервную систему и весь организм, при импотенции.

Примечание:

Все перечисленные препараты принимать 2—3 недели, а затем сделать перерыв 1 месяц, потом курс повторить. Длительное время принимать нежелательно. Людям с повышенным давлением не принимать. Не принимать также весной и летом.

7. Баранка. Настойка.

20 г травы Барвинка малого с цветами варят на малом огне в 250 мл водки и употребляют по 8 капель 2 раза в день (утром и вечером) на протяжении 4 дней. После этого делают двухдневный перерыв и лечение повторяют.

ПОНОС КРОВАВЫЙ

1. Калган дикий — 20 г, подорожник (листья) — 20 г, яснотка (листья) — 20 г, спорыш — 20 г.

1 ст. ложку смеси заварить 200 мл кипятка и пить до и после еды.

2. Берут примерно 100 г грецких орехов, колют их и достают перегородки, которыми отделяются части зерна. Перегородки кладут в бутылку и заливают 200 мл 70° спирта и настаивают 6—8 дней. Принимают 3—4 раза в день, от 6 до 10 капель на небольшую дозу тепловатой воды.

Как только понос начнет сходить на нет, прием капель надо немедленно прескратить, т.к. средство это очень сильное и может создать запор.

3. Окопник.

10 г окопника заварить 200 мл молока. Принимать по 1—2 ст. ложке 3—4 раза в день.

ПОНОС У ДЕТЕЙ

1. В жаркое летнее время маленькие дети нередко болеют расстройством желудка, если упустить время, понос становится уже опасным.

Нужно взять чайную ложку риса, залить его водой (6—7 чашек), постоить на медленный огонь и кипятить. Полученный отвар остудить и в теплом виде давать больному ребенку по 1/3 чашки каждые 2 часа. Отвар пропустить через марлю или сито.

2. При очень сильном поносе у взрослых принять в пищу 1/2 чайной ложки толченой кожицы куриного желудка. Для этого нужно тщательно отделить твердую кожицу куриного желудка, вымыть ее и высушить на солнце, а потом спрятать. При необходимости ее надо мелко натолочь, просеять и принять в пищу 1 или 2 раза.

ПОХУДЕНИЕ

1. В день необходимо пить 2 литра яблочного сока, при этом можно есть все, а жидкость исключить, заменить яблочным соком. Курс продолжать 10 дней. Желательно пить свежий яблочный сок, приготовленный дома, на соковыжималке и пить тут же без хранения в холодильнике.

ПОЧЕЧНЫЕ КОЛИКИ

1. Малина (листья) — 20 г, береза (ветки) — 100 г, сушеница (травы) — 10 г, манжетка (листья) — 10 г.

Заварить всю смесь для ванны в 5 л кипятка в эмалированной посуде. Укутать на час, затем процедить и вылить в ванну. Уровень воды в ванне должен быть чуть выше пояса.

2. При болях в печени и ее опухолях надо 1/4 стакана хорошего прованского масла смешать с 1/4 стакана грейпфрута. Пить это надо на ночь, не раньше, чем через 2 часа после еды, предварительно сделав клизму. Потом лечь в постель на правый бок. Утром повторить клизму. Это можно делать через 4—5 дней снова, по мере надобности.

ПРОКТИТЫ И ПАРАПРОКТИТЫ

1. Календула лекарственная.

Для клизм используют 2-процентный раствор настойки календулы (чайная ложка настойки на 1/4 стакана воды).

ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Бузина сибирская:

а) столовую ложку сухих цветков заварить стаканом кипятка, настоять 10 минут, процедить. Настой принимать по 1/4 стакана (лучше с медом) 1—4 раза в день за 15 минут до еды при простудных заболеваниях.

При простудных заболеваниях, для усиления потоотделения используют сборы:

б) цветки бузины, липовый цвет, цветки ромашки аптечной, цветки коровяка, цветки терновника, кора ивы (всех поровну). Столовую ложку измельченного сырья заварить стаканом кипятка. Настоять 15 минут, процедить. Настой пить горячим по 2-3 стакана ежедневно;

в) цветки бузины, цветки ромашки аптечной (поровну). Способ приготовления, как в предыдущем рецепте;

г) цветки бузины, цветки ромашки аптечной, липовый цвет, лист мяты перечной (всех поровну). Способ приготовления, как в предыдущем рецепте;

д) цветки бузины — 2 части, липовый цвет — 2 части, кора ивы — 3 части, цветки пиона — 1 часть, корень солодки — 1 часть, цветки ромашки аптечной — 1 часть. 2 столовые ложки измельченного сбора заварить 0,5 л кипятка, настоять 15 минут, процедить. Настой выпить теплым в течение дня;

е) цветки бузины — 1 часть, семена пажитника сennого — 1 часть, плоды фенхеля — 1 часть, липовый цвет — 2 части, трава фиалки трехцветной — 2 части. Столовую ложку измельченного сбора настоять в стакане холодной воды в течение 2 часов, варить несколько минут и после остывания процедить. Отвар пить теплым в несколько приемов за один день при трахеобронхите, хроническом бронхите, кашле.

2. Горчица сарептская.

Делают ножные ванны с порошком горчицы в течение 10 минут. Эффективно в первые два часа заболевания.

3. Калина обыкновенная.

Отвар плодов с медом даст хороший эффект при простудных заболеваниях с сильными головными болями, кашлем и потерей голоса, полезен он при гипертонии, заболеваниях сердца, поносах (стакан плодов залить 1 л горячей воды, кипятить 10 минут, процедить, добавить 3 столовые ложки меда. Пить по 1/3 стакана 3—4 раза в день).

Отвар цветков применяют в качестве отхаркивающего и потогонного средства (столовую ложку цветков заварить стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне. Пить по столовой ложке 3 раза в день).

4. Картофель.

Делают ингаляции. В кастрюлю с водой кладут картофельную кожуру, варят и дышат парами в течение 10 минут.

5. Редька посевная.

При простудных заболеваниях употребляют сок с медом (вырезать в редьке углубление, заполнить медом и накрыть сверху кусочком редьки, настоять 4 часа в теплом месте, полученный сок слить. Принимать по столовой ложке, детям — по чайной ложке 3 раза в день).

6. Керосин.

При простудных заболеваниях полезно и эффективно протереть туловище керосином и обернуть туловище газетой (в два слоя). Тепло одеться и лечь спать. Не снимать газеты раньше 2—3 суток.

7. Череда трехраздельная.

7,5 г заливают стаканом кипятка, настаивают 10 минут, процеживают и выливают в ванну. Этот же раствор принимают и внутрь по 1 столовой ложке утром и вечером для оказания потогонного и мочегонного действия при простудных заболеваниях.

ПРОТИВ ОБРАЗОВАНИЯ КАМНЕЙ В ПЕЧЕНИ И ПОЧКАХ

1. Принимать по 1 столовой ложке сок редьки 3 раза в день в течение двух недель. Можно повторить курс несколько раз в году для профилактики.

ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ

1. Лук-чеснок.

Клизма из чеснока оказывает хорошее действие при острицах (5—8 зубчиков размять в стакане воды комнатной температуры, процедить).

2. Тыква обыкновенная.

Семена тыквы используют для борьбы с ленточными глистами (300 г сырых или высушенных семян освободить от твердой оболочки, обязательно сохраняя зеленую тонкую оболочку, тщательно растереть пестиком в ступке, добавляя семена небольшими порциями. Затем медленно добавить 50—60 мл воды при непрерывном помешивании порциями по 10—15 капель. К полученной массе для придания вкуса

добавить 10—15 г меда, варенья или сахара и дать больному натошак по чайной ложке в течение часа всю дозу. Через 3 часа выпить сернокислую магнезию (взрослым 10—30 г в полстакане теплой воды, детям — из расчета 1 г на один год жизни), а затем через 30 минут поставить клизму. Для детей доза семян 150 г (10—12 лет), до 100 г (5—7 лет), до 75 г (3—4 года), до 30—50 г (2—3 года).

ОТ ПРЫЩЕЙ И УГРЕЙ

1. Принимать внутрь от 2-х до 4-х чайных ложек пивных дрожжей каждое утро перед едой.

РАДИКУЛИТ

1. Ржаная мука.

Замешивается тесто из ржаной муки (без дрожжей). Когда тесто станет кислым, взять тряпочку или марлю, сложенную вчетверо, наложить на поясницу, а сверху наложить тесто в 1—2 см толщиной. Делать ежедневно на ночь. Достаточно до 10 процедур, и радикулит проходит. Некоторые добавляют в тесто 30 капель скипидара.

2. Из холстины сплести пояс с карманами. Положить в карманы плоды каштана конского и носить при радикулите. Считается, что это средство помогает при радикулите.

3. Каштан конский.

Плоды каштана вместе с хорицневой хоркой размолоть в муку. Нарезать черный хлеб тонкими ломтиками, сверху намазать камфорным маслом или сливочным несоленым маслом. Сверху на масло посыпать муку плодов каштана. Наложить на больное место и завязать теплым. Помогает при радикулите.

4. Редька черная.

Очистить, натереть на терке. На хлопчатобумажной или льняной тряпке намазать небольшой слой редьки и покрыть другой тряпкой. Наложить на больное место. Сверху кальку положить и теплым завязать. Держать такой компресс до тех пор, пока хватит терпения. При этом создается ощущение медленного и глубокого разогревания. Иногда достаточно сделать несколько раз, и болезнь отступает. Наружно тертую редьку употребляют для растирания при радикулите, ревматизме, подагре, при простудных заболеваниях.

5. Валериана.

Налить в блюдце валерианы (настойка), обмочить в ней марлю или тряпочку, наложить на больное место и сделать компресс. Держать, пока хватит терпения.

6. Шалфей.

Экстракт шалфея развести водой 1:5 или сделать крепкий навар из травы шалфея. Поставить в морозилку. Потом этим льдом натирать больное место.

7. Лопух.

Свежий лист лопуха смочить в холодной воде, полоскать, обратной стороной наложить на больное место и перевязать. Хорошее

обезболивающее средство. Листом нарвать листья лопуха с длинными черенками, высушить их. Зимой достаточно размочить в теплой воде и применять как указано.

8. Горчица.

а) Горчица в виде горчичников применяется как местное раздражающее и отвлекающее средство при простудных заболеваниях, плевритах, ревматизме, радикулите, неарите.

б) Вместо горчичников можно использовать горчичные ванны: 250—400 г горчичного порошка размешать, подливая к нему теплую (не горячую) воду до консистенции жиденькой кашицы, и растереть до появления резкого едкого горчичного запаха. После этого кашицу вылить в ванну (на 180—200 л воды) и хорошо перемешать. Ванну принимают при температуре 35—36° 5—6 минут. После ванны обмыться 1—2 минуты под теплым душем и закутаться в теплое одеяло. Применяется также при бронхитах, пневмонии.

9. Для лечения радикулита к болезненным участкам прикладывают толстым слоем свежие листья лопуха, сверху покрывают компрессной бумагой и связывают теплым платком.

10. Компрессы из сока и кашицы редьки используют при ревматизме, радикулитах и невритах.

11. Спирт 90° — 100 г, ментол — 2,5 г, анестезин — 1,5 г, новокаин — 1,5 г.

Больные места смазывают этой смесью два раза в день.

РАК

1. Жостер, волчьи ягоды.

Растение не ядовито, вопреки бытующему мнению. Часто продается в аптеках. Жостер считается противораковым средством. Он удобен в применении тем, что одной порции (стакана) достаточно, чтобы кишечник нормально функционировал несколько дней.

Помогает такая смесь:

Жостер — 2 ст. ложки. Ромашка — 1 ст. ложка.

1 ст. ложку смеси залить 200 мл кипятка и варить на водяной бане 5 мин. Настоять 40 мин. и выпить сразу, желательно на ночь.

РАК МАТКИ

2. Взять мед майский — 625 г, алоэ — 375 г (алоэ должно быть пятилетней давности, и до среза алоэ не поливать 9 дней), вино крепкое красное. Алоэ измельчить в мясорубке и смешать хорошо с медом и вином. Все это ставится в темное прохладное место на 5 дней. Принимать первые 5 дней — 3 раза в день по одной чайной ложке, а последующие дни по 3 раза в день по столовой ложке за час до еды. Срок лечения от 3 недель до 1,5 месяца.

РАНЫ, ПОРЕЗЫ, ЦАРАПИНЫ, ЯЗВЫ

1. Тысячелистник.

Отжать сок из свежего растения, нанести на рану (помазать). Останавливает кровотечение и заживляет рану. Хорошо лечит старые

раны, гноящиеся язвы. Зимой такое же действие оказывает напар из сухих цветов с прамесью 1/3 по весу цветов ромашки аптечной. Летом в поле или лесу сорвать тысячелистник, размять его или разжевать и наложить на рану. Менять траву несколько раз в день. Рана заживает за 3—5 дней.

2. Крапива жгучая.

Отжать сок из крапивы, помазать рану, смочить тряпки и перевязать ими рану. Можно размять листья до сока и прикладывать. Хорошо смешать сок крапивы пополам с соком подмаренника, обмывать этой смесью раны и прикладывать тряпочки.

3. Смола-жианца хвойных пород (кедр, пихта, сосна, ель).

В лесу и походе одно из прекрасных средств при ранах и порезах. Свежей жианцей смазать раны, язвы, трещины, расколы. Смазывать ежедневно. Заживление наступает быстро.

4. Разрезать кусочек листа кактуса алоэ и приложить одну из половинок ране или порезу. Прикладывать следует резаной стороной.

5. Приложить компресс из настойки листьев крапивы, предварительно промыв рану. Набить 200 мл бутылку почти доверху листьями свежей крапивы, затем долить доверху 70° спиртом, заткнуть пробкой и настаивать на солнце 2 недели.

6. Смешать половину на половину спирт с шеллаком и этой смесью залить свежий порез или рану. Боль прекратится моментально. Затем перевязать рану и залить повязку той же жидкостью. Держать повязку 4 дня. Даже очень большие порезы заживают а 4 дня.

7. Гриб дождевик (дедушкин табак).

Белое тело гриба обладает сильным ранозаживляющим и кровоостанавливающим средством. Разрезать гриб, внутренней мякотью приложить к ране. Прекращается кровотечение и рана заживает быстро, без нагноения. Припудривание ран созревшими спорами действует так же, как и мякоть гриба. Споры хорошо сохраняются при хранении, не теряя лечебных свойств.

8. Подорожник.

Свежие измельченные листья различных видов подорожника применяют при ранениях, ушибах, ожогах как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство. Применяют и при укусах насекомых. Измельченные до сока листья прикладывают на пораженные места, меняя повязку через 2—3 часа. Измельчить и смешать равные части листьев подорожника и тысячелистника. Применять как наружное средство. Менять повязку 2—3 раза в день.

9. Медунца.

Свежие листья растереть до сока, наложить на рану, порез, язву, ссадину, перевязать. Менять дважды в день. В народе медунца считается одним из лучших ранозаживляющих средств.

10. Жидкость Ноанкова. Аптечный препарат.

Смазывать раны раз в день. Заживление наступает быстро.

РАНЫ, ЯЗВЫ, ПОРЕЗЫ ДОЛГО НЕЗАЖИВАЮЩИЕ

11. Смола-жианца хвойных пород — 100 г. Сало свиное внутреннее, несоленое — 100 г. Воск пчелиный натуральный — 100 г.

Все положить в кастрюлю. Если смола сукая, растереть в порошок. Кипятить на малом огне 10 минут, все время мешая состав. Снимать пену с поверхности. Снять с огня, когда станет теплой, все сложить в стеклянную банку. Хранить в холодильнике. Рану промыть известковой водой. 1 столовую ложку негашеной извести на 1 литр воды. Дать настояться 5—6 часов, воду слить. Этой водой промывать рану. Тонким слоем намазать тряпочку приготовленной смесью, наложить на больное место и перевязать. Через 1—2 дня повязку менять. Раны быстро заживают.

12. Мед пчелиный натуральный — 80 г. Рыбий жир — 20 г. Ксероформ — 20 г.

Все тщательно смешать. Мазь накладывается на очищенную рану или язву в виде повязки. Менять раз в сутки. Применяется для лечения долго незаживающих ран, язв, свищей. Хранить в прохладном месте.

13. Полстакана негашеной извести залить холодной кипяченой водой. Настоять несколько часов. Слить верхний настой в другую посуду. Взять растительного масла столько по объему, сколько получилось настоя. Вскипятить масло на малом огне 10 минут, снять с огня. Когда станет теплым, как парное молоко, влить туда известковый настой и хорошо перемешать. Смазывать этим составом раны и накладывать тряпочки, смоченные этим же составом на раны, перевязать. Менять ежедневно. Раны заживают быстро.

14. Народное средство.

Рану, язву промыть спиртом. Срезать спелый пшеничный колосок с небольшим концом соломины. Перевернуть его концом колоса вниз на рану и осторожно водить по ране крест-накрест 3 раза. Делать так 3 раза в день: утром, в середине дня и вечером, каждый раз срезая новый колосок. И так делать 3 дня, истратив 9 свежих спелых колосков. Средство покажется смешным, но проходят кровотечения, гноетечения и через несколько дней рана заживает.

РАНЫ ГНОЙНЫЕ

1. Аир болотный.

Порошком из корневищ присыпают гноящиеся раны и язвы. Корневища аира применяют и в смеси с другими лекарственными растениями.

2. Алоэ древоподобное.

Применяют наружно сок алоэ в виде примочек и орошения ран.

3. Гречиха посевная.

Свежие размятые листья накладывают на нарывы и гнойные раны толстым слоем.

4. Какалия копьевидная (гусиная лапка).

Свежие и высушенные листья используют наружно в качестве заживляющего средства при гнойных ранах, долго не заживающих язвах, нарывах. В этом случае листья какалии накладывают толстым слоем на больное место (высушенные листья предварительно запаривают кипятком) и перебинтовывают.

5. Клюква болотная.

Для очищения и заживления гнойных ран применяют свежий сок ягод в виде примочек.

6. Морковь посевная.

Тертую морковь прикладывают к воспаленным участкам кожи, гнойным ранам.

7. Сирень обыкновенная.

Свежие листья прикладывают к больному участку.

8. Хвощ полевой.

Отвар травы используют для компрессов при гноящихся ранах (столовую ложку измельченной травы залить стаканом кипятка, кипятить 30 минут на медленном огне, процедить).

9. Черника обыкновенная.

Настой листьев применяют для наружной обработки ран. (1 чайную ложку измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут на горячей плите, процедить).

РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА

1. Калган и кровохлебка.

Смесь измельчить и заварить 2 стол. ложки в кипятке, настоять 20 минут и, добавив сахар, пить по полстакана каждый час. За несколько часов проходит даже сильное расстройство. Смесь является очень сильным средством, обладающим не только вяжущим, но и бактерицидным свойством.

2. Орех грецкий.

Взять один лист грецкого ореха, размельчить и заварить стаканом кипятка, настаивать 2—3 мин. и пить как чай. Желательно, без сахара.

3. Куриный желудок.

Желтая пленка, выстилающая желудок, снимается осторожно, промывается, высушивается и хранится впрок. Половину желудка измельчить в порошок и принимать, запивая теплой водой, а два приема. Питье без вкуса и запаха и действует очень эффективно.

4. Гранат.

Заварить 1 ст. ложку коры граната стаканом кипятка, настаивать до появления цвета и выпивать все сразу, как чай.

5. Ива козья и ромашка.

Ива козья (кора) — 1 часть, ромашка (цветы) — 1 часть.

Смесь заварить стаканом кипятка, настоять 15 минут и выпить в два приема с сахаром. Эта смесь обладает сильным дезинфицирующим свойством.

РЕВМАТИЗМ, ПОЛИАРТРИТ

1. Сабельник (декоп).

Сухие стебли сабельника нарезать длиной 1—2 см. Насыпать в бутылку на 1/3—1/2 и залить водки или спирта. Настоять 21 день в темном месте. Принимать от 1 чайной до 1 столовой ложки 3 раза в день до еды на воде. В особо тяжелых случаях принимать по 1 небольшой рюмке 3 раза в день. Пить желательно в холодное время года. Этой же настойкой растирают больные суставы и делают компрессы. Считается, что для того, чтобы был результат от лечения, надо выпить 2 пол-литровые бутылки этой настойки.

2. Вереск.

Делать на ночь. 2 столовые ложки сухой взмелыченной травы на 1 литр воды. Кипятить 10—15 минут на слабом огне, настоять, укутав на ночь. На следующее утро процедить и пить как чай и как воду в любое время суток. Пить с чем угодно. Курс лечения 3 месяца, перерыв 2—3 недели и снова повторить курс. Вереск применяется при ревматизме, подагре, при кашле, атеросклерозе, нервных расстройствах, бессоннице, при головокружении, нарушениях сосудов головного мозга, болезнях мочевых органов.

3. Сабельник, сухие стебли — 10 г. Девясил, корн — 25 г.

Измельченные корни и стебли засыпать в 0,5-литровую бутыл, залить водкой. Настоять 21 день в темном месте, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 1 раз в день, утром натощак, запивая водой. Первое время боли могут обостряться, надо терпеть. При приеме настоек от ревматизма нельзя есть соленого, кислого, острого, не пить спиртного.

4. Спирт 90—96° — 1 часть, крапива жгучая, сок — 1 часть, мед натуральнй — 1 часть.

Только что свежееотжатый сок крапивы смешать со спиртом. Добавить туда мед. Всех частей поровну. Хорошо размешать. Поставить вниз холодильника. Настоять 2 недели. После этого принимать по 30 г 3 раза в день за 30 минут до еды.

5. Брусничнй лист.

100 г брусничного листа залить 2,5 литра крутого кипятка, парить 2 часа, процедить и добавить в отвар 250 мл водки. Поставить на огонь и томить 15 минут, не доводя до кипения. Принимать по 100 г 3 раза в день за 30 минут до еды. Принимать 6 месяцев, а при полиартрите пить, пока не будет осадков в моче и движения не будут более свободными и раскованными. Хранить в прохладном месте. Этот настой применяется при ревматизме, полиартритах, камнях и песке в почках и мочевом пузыре.

6. Багульник (трава) — 2 части, брусника (лист) — 2 части, ромашка аптечная — 2 части, череда (трава) — 2 части.

Все измельчить и хорошо смешать. 2 столовые ложки сбора на 500 мл кипятка. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. Применяется при инфекционных полиартритах.

7. Багульник трава — 2 части, жостер — 1 часть, зверобой (трава), (цветы) — 2 части, чай почечный — 1 часть, тысячелистник (трава, цветы) — 1 часть, хвощ полевой (трава) — 2 части.

Все измельчить и хорошо смешать. 2 столовые ложки сбора на 500 мл кипятка. Настоять, укутав, 5—6 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде. Применяется при обменных полиартритах.

8. Лопух, лист.

Снимает боли. Свежий лист лопуха смочить в холодной воде, приложить к больному месту обратной пушистой стороной и перевязать. Когда боль утихнет, снять. Можно нарвать летом листьев лопуха с длинными черенками, засушить их в тени. Зимой достаточно лист размочить в теплой воде и прикладывать на больное место. Действие такое же.

9. Бузина сибирская:

в) цветки бузины — 2 части, лист крапивы двудомной — 2 части, хвощ полевой — 4 части, трава хвоща полевого — 4 части, лист березы — 4 части, цветки василька синего — 1 часть, цветки календулы — 1 часть, цветки пиона — 1 часть, плоды можжевельника — 1 часть, побеги паслена сладко-горького — 1 часть, кора хрушины — 1 часть. 3 столовые ложки измельченного сбора залить 0,5 л кипятка, через 10 минут довести до кипения и процедить. Пить по стакану горячего отвара каждые 2 часа при ревматических артритах;

б) цветы бузины, липовый цвет, трава золотарника, трава зверобоя (всех поровну). Столовую ложку измельченного сбора заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут. Пить по 2 стакана настоя в день при ревматизме, подагре.

10. Редька.

Сок редьки входит в состав смеси, применяемой при ревматизме: сок редьки — 1,5 стакана, пчелиный мед — 1 стакан, водка — 1/2 стакана, соль — 1 столовая ложка. Смесь хорошо перемешивают и используют для втирания в больное место.

При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, воспалениях желудочно-кишечного тракта, тяжелых заболеваниях печени прием препаратов редьки внутрь противопоказан.

11. Жиаучка женевская (травя).

2 чайные ложки травы на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день при ревматизме.

12. Зверобой продырявленный (травя).

10 г сухой травы на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 2—4 раза в день после еды. Спиртовую или водочную настойку травы зверобоя принимать по 30 капель с водой 3 раза в день после еды при ревматических заболеваниях.

13. Сабельник болотный (корни, стебли).

1 столовую ложку корней (стеблей) на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 2—3 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3—4 раза в день в теплом виде. Настойку стеблей (корней) на водке принимают по 30—40 капель на воде 3—4 раза в день до еды. Применяется сабельник при ревматизме, при простудной ломоте тела.

14. Сельдерей пахучий (корни).

Сок из свежих растений пить по 1—2 чайных ложки 2—3 раза в день. 1 столовую ложку свежих корней на 2 стакана кипятка, настоять, укутав, 4 часа, процедить. Принимать по 2 столовых ложки 3—4 раза в день за 30 мин. до еды. Можно в такой же пропорции настаивать в холодной воде 4 часа и принимать по 1/4—1/3 стакана 3 раза в день до еды. Применяется сельдерей при ревматизме и подагре.

15. Корень дягиля.

Приготовить настойку из корня дягиля. Корень настоять на спирту 70° в течение 7 дней в соотношениях 1 весовая часть спирта и 1/2 весовых частей дягиля. Растирать больные места 2—3 раза в день.

16. Грушанка круглолистная (листья).

2 чайные ложки сухих листьев на 1 стакан кипятка, настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1—2 столовых ложки 3 раза в день при ревматизме.

17. Грудница мокнатая (травы, цветы).

3—4 столовые ложки свежей травы обварить кипятком, завернуть в марлю. Подушечки прикладывать к больным местам как обезболивающее средство при ревматических болях.

18. Барбарис обыкновенный (корни).

1 чайную ложку сухих измельченных корней на 2 стакана кипятка. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день при ревматизме. Водочную настойку принимать по 30 капель 3 раза в день на водс. Беременным не принимать!

19. Подбел дубровниколистный (листья).

2 чайные ложки сухих листьев на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 2 столовых ложки 3—4 раза в день при ревматизме.

20. Девясил высокий (корневища с корнями).

10 г корневищ с корнями девясила и 10 г корней лопуха отварить 20 мин. на малом огне в 1 стакане воды. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день до еды при ревматизме. Припарки из свежих корней девясила употребляют на больные места при ревматизме.

21. Дурнишник обыкновенный (растение целиком).

1 столовую ложку травы на 1 стакан кипятка. Кипятить 10 мин., процедить. Или: настоять 1 час, не кипятя, и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4—5 раз в день при ревматизме.

22. Душица обыкновенная (травы).

Наружно душицу применяют для ванн, сухих и влажных компрессов при ревматизме и др. болях.

23. Тамариск, гребенщик (ветви, листья).

2 чайные ложки сухих листьев и ветвей на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день при ревматизме.

24. Синеголовник плосколистный (травы).

10 г травы на 1 стакан воды. Кипятить 5 мин. после закипания. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день до еды при ревматизме.

25. Репей обыкновенный (травы).

1 чайную ложку травы на 1 стакан воды. Кипятить 2—3 мин после закипания, настоять 2—3 часа, укутав, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 15 мин. до еды, подсластив, при ревматизме. 1 чайную ложку корней на 1 стакан кипятка, настоять, укутав, 3 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день до еды при запущенном ревматизме.

26. Редька черная (корнеплод).

Рекомендована для втирания при ревматизме. Полтора стакана сока редьки смешивают с одним стаканом чистого меда, с 1/2 стакана водки и одной столовой ложкой соли. Все хорошо смешивают. Втирают в больные

места, особенно желательно после бани перед сном, принимать внутрь по 1 рюмке этой смеси.

27. Корень лопуха поровну с корнем девясила.

Рекомендуется (А. П. Попов) для лечения ревматизма применять корень лопуха поровну с корнем девясила (20 г корней на 1 стакан кипятка). Настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Наружно он рекомендует отвар из корней лопуха в виде согревающего компресса не только на ревматические больные места, а на все туловище, особенно при упорном хроническом ревматизме.

28. Лавр благородный (лист).

Измельченную в порошок смесь лаврового листа (6 частей) и игл можжевельника (1 часть) растереть со свежим сливочным маслом (12 частей). Полученную лавроможжевелевую мазь употреблять для втирания как обезболивающее успокаивающее средство при ревматических и простудных заболеваниях.

29. Краснодерз желтый или красный (растение целиком).

1 столовую ложку на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день при ревматизме.

30. Кизил (корни).

1 чайную ложку корней отварить 15 мин. в 1 стакане воды. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 2 столовых ложки 3 раза в день при ревматизме.

31. Лопух большой (корень).

1 столовую ложку сухих корней на 2 стакана кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить, принимать по 1/2 стакана горячим 3—4 раза в день при ревматизме.

32. Фасоль обыкновенная (шелука "стручков").

15—20 г измельченной шелуки "стручков" фасоли кипятить 2—3 часа на малом огне в 1 л воды, когда остынет, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4—5 раз в день.

В немецкой народной медицине применяется настой или отвар при хроническом ревматизме, подагре.

33. Клевер луговой лилово-красный (цветы, цветочные головки и листья).

3 чайные ложки на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день за 20 мин. до еды при ревматических болях. То же самое действие оказывают остальные виды клевера при приеме внутрь.

34. Мелисса лекарственная (травя).

Культивируется как лекарственное и эфиромасличное растение. Наружно применяется в виде подушек-компрессов при ревматизме.

35. Брусника (ягода, лист).

1 чайную ложку листьев на полтора стакана кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить, принимать по 1/2 стакана 3—4 раза в день до еды, при подагре и затяжном суставном ревматизме. Свежую, моченую и вареную ягоду употребляют при ревматизме, подагре и как мочегонное.

36. Лук репчатый.

Кашица свежего тертого лука употребляется наружно при ревматизме (В. П. Махалюк).

37. Одуванчик лекарственный (корни).

1 чайную ложку корней и травы на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 мин. до еды при ревматических и подагрических заболеваниях.

38. Эфедра двухколосковая — хвойник двухколосковый (зеленые ветви, трава).

1 чайную ложку травы на 2 стакана воды. Кипятить, пока не останется 1 стакан, настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день при ревматизме. Припарки из травы употребляют наружно при ревматизме.

39. Татарник колючий (листья, цветочные корзинки).

1 столовую ложку листьев на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 2—3 раза в день при ревматизме, простуде. Порошок из листьев (без колючек) принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день запивая водой.

40. Щавель конский (корни).

Настойку корневищ на водке принимают по 15—20 капель 2—3 раза в день до еды при ревматизме.

41. Вяз гладкий, аяз раабинный (кора).

2 чайные ложки на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день при хроническом ревматизме, подагре.

42. Волчье лыко (кора, ягоды).

Спиртовую настойку коры и спиртовую настойку ягод применяют как наружное раздражающее средство при хроническом ревматизме, подагре, параличах, невралгии.

43. Адонис весенний (трава).

7 г сухой травы на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час. Процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Применяется при ревматических болях в суставах и мышечной системе.

44. Багульник болотный (трава).

1 чайную ложку травы на 2 стакана остуженной кипяченой воды. Настоять в закрытом сосуде 8 часов, процедить. Принимать по 1/3—1/2 стакана 4 раза в день при ревматизме (мышечном и суставном), подагре, болях в ногах.

45. Бадан толстолистный (корни).

1 столовую ложку измельченных корней на 1 стакан кипятка. Кипятить 20 мин. на малом огне. Настоять, укутав, 30 мин., процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день при суставном ревматизме, ревматических артритях.

46. Огуречная трава. Бурачник лекарственный (трава).

3 г сухих цветков или 10 г листьев на 1 стакан кипятка. Настоять в закрытой посуде 5 часов, процедить, добавить сахара по вкусу. Принимать по 1 столовой ложке 5—6 раз в день при ревматических, подагрических и других болях в суставах и мышцах.

47. Вербейник монетчатый, вербейник обыкновенный (трава).

Наружно траву употребляют для припарок при суставном и мышечном ревматизме, при воспалительных процессах суставов.

48. Донник лекарственный желтый (травя с цветущими верхушками).
Распаренная травя или настой из травя применяется наружно в виде ванн, компрессов, припарок, при ревматических опухолях, подагрических поражениях.

49. Оляха серая, черная (шишки).

1 столовую ложку шишек на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день при суставном ревматизме.

50. Крапива двудомная (листья).

1 столовую ложку сухих листьев на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день за 30 мин. до еды. Применяется при остром суставном ревматизме, мышечном ревматизме, подагре.

51. Ива белая, русская (кора).

1 чайную ложку сухой коры на 2 стакана остуженной кипяченой воды. Настоять 4 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2—4 раза в день до еды. Порошки коры ивы принимать по 1 г 3 раза в день до еды. Применяется при суставном ревматизме, подагре.

52. Фиалка душистая, фиалка трехцветная (травя).

1 столовую ложку сухой травя на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день при суставном ревматизме, подагре, артрите.

53. Костяника каменная.

Припарки из травя используют как болеутоляющее средство при подагре и ревматизме.

54. Черная смородина.

Настой листьев черной смородины пьют при заболеваниях мочевого пузыря, ревматизме, подагре, мочекаменной болезни, простуде, общем недомогании, кожных заболеваниях (столовую ложку измельченных листьев заварить 2 стаканами кипятка, настоять 6 часов, процедить). Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день.

55. Черника.

Свежие плоды черники в больших количествах употребляют при подагре, ревматизме и других заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ.

56. Сбор.

Травя душицы — 1 часть, лист мать-и-мачехи — 2 части, плоды малины — 2 части. 2 столовые ложки смеси залить 2 стаканами кипятка, кипятить 5—10 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана горячего отвара 3—4 раза в день при ревматизме в простудных заболеваниях.

57. Сбор.

50 г камфоры, 50 г горчицы в порошок, 100 мл спирта, 100 г яичного белка. Способ приготовления лекарства: спирт налить в чашку, растворить в спирте камфору, высыпать в этот раствор горчицу и растворить ее. Отдельно от этой смеси 100 г белка размешать и превратить в помаду. Смешать оба состава вместе. Получится жидкая мазь.

Вечером перед сном втирать, но втирать не до суха, так, чтобы пленка осталась на руке. Сухой тряпкой вытереть.

58. В бутылку из-под шампанского с хорошей пробкой налить 170 мл прованского масла. Прибавить туда от 10 до 20 стручков красного перца, в зависимости от желаемой крепости, и налить туда же 1/2 фунта хорошо очищенного керосина. Хорошо взболтать все вместе и оставить на 9 дней, ежедневно взбалтывая. Этой смесью делать втирание на ночь. Утром следует надевать теплое шерстяное нижнее белье и шерстяные чулки.

59. Взять мягкую тряпку достаточно большого размера, чтобы покрыть больное место (руку, ногу и т. д.). Намочить эту тряпку в керосине хорошего качества и приложить к больной части тела. Затем взять толстое полотенце и обмотать им то место, где приложена смоченная керосином тряпка, и закрепить полотенце несколькими английскими булавками.

Через некоторое время больной почувствует, что тело довольно сильно горит под полотенцем. Если это ощущение жжения станет почти нестерпимым для кожи, то следует полотенце немного ослабить, но совсем его не снимать. Держать полотенце от 30 минут до 2 часов. После снятия полотенца и тряпки, смоченной керосином, рекомендуется смазать вазелином те места, где была наложена тряпка с керосином. Это делается из предосторожности, чтобы не слезла кожа и не шелушилась.

60. Накопать свежих земляных красных червей и положить их в стеклянную банку и долить банку водкой. Не следует наливать водки до верхнего слоя червей. Покрывать банку с настойкой герметически. Держать банку на солнце в течение нескольких дней. Втирать эту настойку в больные ревматизмом места, по крайней мере, 1 раз в день, вечером перед сном.

61. Муравьиный спирт.

Муравьиный спирт, что продается в аптеках, может быть употребляем вместо самодельной муравьиной настойки, описанной ниже. Доза: 20, 40, 60 капель; пить несколько раз в день.

62. Муравьиная настойка.

Взять бутылку размером в 1 литр, набить ее до половины муравьями и долить бутылку до конца водкой. Следует настоять содержимое бутылки в течение 5—7 дней в теплом месте. Это средство очень полезно при острых ревматических болях, простуде с насморком и для того, чтобы вызвать потение. Следует пить эту настойку утром и вечером. Доза: от половины до 1 чайной ложки.

РЕВМАТИЗМ ХРОНИЧЕСКИЙ С ОПУХОЛЯМИ И БОЛЯМИ В СУСТАВАХ

Если ревматизм в ногах, то следует сшить мешки, имеющие форму ног и части туловища до пояса. Затем сорвать с дерева березовых листьев и набить ими мешки. Вечером, перед сном, следует поставить ноги больного в эти мешки с таким расчетом, чтобы довольно толстый слой листьев облегал поверхность ног со всех сторон. Ноги будут очень сильно потеть, точно так, как они потели бы в паровой бане. Иногда в полночь листья следует сменить, если они стали слишком мокрыми. Несколько подобных сеансов, и ... наступает полное излечение.

РЕВМАТИЗМ СУСТАВНО-МЫШЕЧНЫЙ

1. Физалис обыкновенный (плоды).

Плоды применяют при суставном ревматизме и подагре. В лечебных целях летом можно употреблять ежедневно 15—20 свежих плодов или 20—25 г плодового сока. Чаще используют отвар из сушеных плодов. 20 г сухих ягод варят 10—15 мин. в 0,5 л воды. Настаивают до охлаждения. Принимать по 1/4 стакана 4—5 раз в день.

РОЖА

1. Мел, красное сукно.

Утром, до восхода солнца, пораженное рожей место посыпать сверху чистым, мелко просеянным мелом. Сверху наложить чистое шерстяное красное сукно и все это перебинтовать. На следующее утро снова повторить такую же процедуру, сменив мел. Через несколько дней рожа проходит. Процедуру проводить раз в сутки и обязательно до восхода солнца.

2. Мед пчелиный натуральный, лоскут натурального шелка красного цвета, величиной с ладонь. Растереть на мелкие кусочки. Смешать с медом пчелиным натуральным, разделить эту смесь на 3 части. Утром за час до восхода солнца наложить эту смесь на пораженное рожей место и перевязать. На следующее утро процедуру снова повторить. Делать так ежедневно до выздоровления.

3. Мел, порошок — 1 часть. Шалфей, порошок листьев — 1 часть.

Все хорошо смешать. Насыпать смесь на хлопчатобумажную тряпочку и привязать на пораженное место. Менять 4 раза в сутки в полутемном месте, чтобы не попадали прямые солнечные лучи.

4. Ржаная мука.

Мелко просеянная ржаная мука присыпается на больное место. Сверху обкладывается синей оберточной бумагой из-под сахара и все перебинтовывается. Делать рано утром за час до восхода солнца. Менять повязку раз в сутки до восхода солнца.

5. Икра лягушечья.

Весной набрать лягушечьей икры, расстелить ее тонким слоем на чистую тряпочку, высушить в тени. При воспалении рожей икру слегка размочить в кипяченой воде комнатной температуры, намазать на чистую тряпочку и наложить на больное место на ночь. От 3 таких процедур рожа проходит. Считается радикальным средством при роже. Хранить икру в сухом прохладном месте 6 месяцев, не более.

Воспаление глаз при роже

6. Дурман (листья и семена).

20 г семян или листьев дурмана на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. Разбавить пополам водой. Делать примочки при воспалении глаз.

Настойка на водке семян или листьев. 1 чайную ложку настойки развести в 0,5 стакана кипяченой воды. Применять для примочек.

СЕЛЕЗЕНКИ БОЛЕЗНЬ

1. Цикорий (корень).

20 г корня на стакан кипятка настаивать, укутав, 30—40 минут, процедить. Принимать по 1—2 столовых ложки 3 раза в день. Можно принимать экстракт цикория, который продается в магазин. 1/4—1/3 чайных ложек на стакан кипятка. Размешать и пить как чай с медом или сахаром.

Настойка. Принимать по 20—25 капель 3 раза в день. Употребляется и для растирания больного опухшего места, но не покрасневшего. Цикорий применяется при увеличении селезенки как укрепляющее, успокаивающее, обезболивающее и ликвидирующее опухоль средство. Листы, заваренные кипятком, прикладываются наружно как припарха на опухшее место.

2. Хмель обыкновенный (шишки).

10 г шишек хмеля на стакан кипятка. Настаивать, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1—2 столовых ложки 3 раза в день. Применяется при болезнях селезенки, как успокаивающее, обезболивающее, уменьшающее опухоль. Оставшиеся шишки хмеля в теплом виде кладут на опухшую селезенку как припарку.

3. Полынь горькая, серебристая.

1 чайная ложка травы на 2 стакана кипятка. Настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Принимать как чай с медом или сахаром по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды при болезни селезенки.

4. Репяшок.

20 г травы на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Принимать по 1/4—1/2 стакана с медом 3—4 раза в день при болезни селезенки.

5. Тысячелистник (травя, цветы). Календула (цветы).

Тысячелистник и календулу смешать поровну. 20 г смеси на 500 г кипятка. Настоять, укутав, 40 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 2 раза в день. Применяется для лечения, увеличения селезенки.

6. Мыльнянка (корень). Вербя (кора).

20 г корня мыльнянки и 20 г коры вербы хорошо измельчить. Залить 1 литром холодной воды. Кипятить 15 минут, настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по стакану 3 раза в день при болезнях селезенки.

7. Шалфей (листья) — 1 часть. Крапива жгучая (листья) — 1 часть.

Все травы измельчить в мелкий порошок, хорошо смешать. Принимать 3 раза в день порошок на кончике ножа при опухоли селезенки.

8. Крапива глухая (яснотка), все растение — 1 часть. Фиалка трехцветная — 1 часть. Череду — 1 часть. Земляника (листья) — 1 часть.

Все растения измельчить, хорошо смешать. 20 г смеси на 500 мл кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать как чай в течение дня 3 стакана при болезнях селезенки.

9. Капуста белокочанная.

Сок из свежей капусты. Сок отжимают из натертого на мелкой терке кочана или через соковыжималку. Пьют по 1/2 стакана 2—3 раза в день за час до еды в теплом виде.

10. Гранат.

Ежедневно выпивать натуральный гранатовый сок по 1/2—1 стакану 2—3 раза в день. Принимать долго.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Боярышник кроваво-красный.

Понижает возбудимость центральной нервной системы, тонизирует сердечную мышцу, усиливает коронарное кровообращение, устраняет аритмию и тахикардию, снижает кровяное давление.

Лекарства из боярышника в домашних условиях готовят разными способами:

в) 0,5 кг зрелых плодов толкут деревянным пестиком, добавляют 100 мл воды, нагревают до 40 град. и отжимают сок. Пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Особенно показано применение в пожилом возрасте.

б) столовую ложку сухих плодов заварить стаканом кипятка, настоять 2 часа в теплом месте (можно заварить в термосе), процедить. Принимать по 1—2 столовые ложки 3—4 раза в день до еды.

в) 10 г сухих плодов настоять 10 дней в 100 г водки или 40-градусном спирте, профильтровать. Настойку принимать по 30 капель с водой 3 раза в день до еды.

Цветки боярышника входят также в сборы:

г) цветки боярышника — 5 частей, трава горца птичьего — 3 части, трава хвоща полсвого — 2 части.

2 чайные ложки измельченной смеси заварить стаканом кипятка, настоять 1—2 часа, процедить. Настой выпить в течение дня глотками при сердечной слабости.

2. Бузина сибирская.

Отвар коры и корней пьют при склерозе и болях в области сердца, сердцебиении, одышке, неврозах сердца, бессоннице. Столовую ложку измельченного корня заварить стаканом кипятка, кипятить 15 минут, настоять 30 минут, процедить. Принимать по столовой ложке 3 раза в день.

3. Василек синий.

Настой цветков используют при приступах сердцебиения. 1—2 чайные ложки цветков заварить стаканом кипятка, настоять час, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раз в день за 10—15 минут до еды.

4. Голубика болотная.

Отвар молодых побегов и листьев пьют при болезнях сердца (столовую ложку измельченных веток и листьев заварить стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне, охладить, процедить. Отвар принимать по столовой ложке 3 раза в день).

5. Календула лекарственная.

Настой применяют при нарушениях сердечного ритма: 2 чайные ложки цветков заварить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана настоя 4 раза в день.

6. Мята перечная.

Применяют настой листьев: 2 чайные ложки измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, выпить глотками в течение дня.

7. Травя тысячелистника.

а) трава тысячелистника — 2 части, шишки хмеля — 2 части, корень валерианы — 3 части, лист Melissa — 3 части. Столовую ложку сбора

заварить стикином кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день. Успокаивающий сбор при сердечном неврозе.

б) трава тысячелистника — 5 частей, трава зверобоя — 4 части, цветки арники — 1 часть. Столовую ложку сбора залить стаканом холодной воды, настоять 3 часа, варить 5 минут, выдержать 15 минут, процедить. Выпить глотками в течение дня.

8. Взять настойку валерианы на спирту большой концентрации без примеси и нюхать на ночь перед сном по 1,5 минуты в каждую ноздрю. У некоторых на следующий день болит голова. Это значит, что валериана действует, но доза была слишком велика, поэтому следует в первые дни лечения делать вдох неглубокий, затем постепенно увеличивать. Ни в коем случае нельзя нюхать валериану, когда необходимо бодрствовать. В этом случае борьба со сном после вдыхания валерианы ведет к нервному расстройству.

Опыт показал, что уже первый месяц вдыхания валерианы укрепляет организм. В течение 2—4 месяцев человек буквально перерождается, и самочувствие значительно улучшается.

9. Взять 50 г ромашки, заварить в стакане воды, вскипятить, снять с огня, остудить, процедить, добавить 30 капель спиртовой настойки боярышника (желательно, цветков), все смешать хорошо и пить два раза в день (1 порция).

СКЛЕРОЗ

1. Чесночное масло.

Головку чеснока средних размеров очистить, растолочь в кашицу. Сложить в стеклянную банку и залить стаканом нерафинированного подсолнечного масла. Поставить в холодильник вниз. На следующий день взять лимон, помыть, срезать шишку (от места, откуда растет), выдавить чайную ложку лимонного сока и слить в столовую ложку. Туда же добавить чайную ложку чесночного масла, размешать. Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс от 1 до 3 месяцев, затем месяц перерыв и курс повторить. Снимает спазмы сосудов головного мозга, сердечные спазмы, одышки. Прекрасное сосудорасширяющее средство.

2. Вереск.

1 столовую ложку измельченного вереска с верхом на 0,5 литра кипятка. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 3 часа, процедить. Пить как чай и воду в любое время дня, пить с чем угодно. Применяется при атеросклерозе, нервных расстройствах, бессоннице, сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях кровообращения головного мозга, болезнях печени, камнях и песке в почках и мочевом пузыре. Первую неделю принимать по 1/2 стакана, а затем по стакану.

3. Чеснок.

1/3 бутылки наполнить порезанным чесноком. Залить водкой или 50—60° спиртом. Настоять 14 дней в темном месте, ежедневно взбалтывая. Принимать по 5 капель 3 раза в день до еды на чайную ложку воды холодной. Очищает кровеносную систему от всевозможных отложений, снимает повышенное давление, очищает желудок, благотворно действует при спазмах сосудов головного мозга.

4. Мед, лук.

Натереть на мелкой терке лук репчатый, отжать. стакан лукового сока смешать со стаканом меда. Хорошо размешать. Если мед засахарился, слегка подогреть в водяной бане. Принимать по столовой ложке 3 раза в день за час до еды или через 2—3 часа после еды. Применяется при атеросклерозе, особенно при склерозе мозга.

5. Активный образ жизни, борьба с избыточным весом, диета. Ограничение в диете сахара, сладостей, животных жиров. Избегать продуктов, богатых холестерином: мозги, яичный желток, икра, жирные сорта мяса и рыбы, витамин Д, поваренная соль и экстракты иных веществ (мясные, бульоны, уха). Рекомендуются: творог, хорошо вымоченная сельдь, треска, овсянка, растительные масла: оливковое, кукурузное, подсолнечное, льняное. Больше овощей, фруктов, богатых растительной клетчаткой. При избыточном весе рекомендуются разгрузочные дни: яблочные, кефирные, творожные, компотные и т. д. Гулять больше на чистом воздухе, пить родниковую, колодезную или пропущенную через фильтры водопроводную воду. Осадок хлора, солей, извести насклерозивает кровеносные сосуды. Хорошо очищает сосуды, удаляет отложения: яблоки, хрен, чеснок, шиповник, цветы гречихи, вереск, сабельник, витамин Р-рутин, морская капуста, петрушка — зелень, корни, красная рябина. Пить зеленый чай.

6. Клевер красный (цветущие облиственные верхушки, собранные в начале цветения).

40 г цветков настоять в 500 г водки в течение 2-х недель. Процедить, отжать. Принимать по 20 г перед обедом или перед сном. Курс лечения 3 месяца с перерывом 10 дней. Через 6 месяцев курс можно повторить. Применяется при атеросклерозе с нормальным артериальным давлением, сопровождающимся головными болями и шумом в ушах.

7. Горячая вода.

Ежедневно утром натощак выпивать 200—300 г горячей воды, насколько терпимо. Это очищает кровеносные сосуды, очищает их и выводит из организма всевозможные отложения.

8. При склерозе, сопровождающемся шумом в голове, берется смесь клевера со стеблем в равных порциях. Смесь заваривать, как чай, и пить в течение дня.

Данный настой используется также при лечении язвенной болезни желудка, гастритов и колитов.

СКЛЕРОЗ СТАРЧЕСКИЙ

1. Девясил.

Настойка девясила на водке — старинное средство при старческом склерозе. 30 г сухого корня в 500 мл водки настаивать 40 дней. Принимать по 25 капель перед едой.

2. Кора рябины.

200 г коры залить 500 мл кипятка и варить на слабом огне 2 часа. Принимать по 25 капель перед едой.

При старческом склерозе принимают густой отвар рябины.

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

1. Солодка голая.

Солодка (корень) — 20 г, укроп (раздробленное семя) — 5 г.

Заварить 1 стол. ложку смеси кипятком и долго настаивать, укутав. Принимать по полстакана через час после еды.

2. Крушина.

Крушина (кора) — 4 части, укроп (раздробленное семя) — 1 часть, лен (семя) — 1 часть.

Заваривать, как предыдущую смесь.

3. Крушина (кора) — 4 части, кориандр, или кинза (плоды) — 1 часть, алтей (корень) — 1 часть.

Настоять 1 стол. ложку смеси в холодной воде в течение часа, затем довести до кипения и варить 5 мин. Выпить горячим.

4. Крушина (кора) — 4 части, тмин (раздавленное семя) — 1 часть, ромашка (цветы) — 2 части.

1 стол. ложку смеси залить 200 мл кипятка, варить 10 мин на водяной бане и выпить в один прием на ночь.

Крушина считается прекрасным испытанным средством при астенических запорах, спастических колитах, запорах при беременности, геморрое.

5. Жостер — 2 стол. ложки, ромашка — 1 стол. ложка.

1 стол. ложку смеси залить 200 мл кипятка и варить на водяной бане 5 мин. Настоять 40 мин и выпить сразу, лучше на ночь.

6. Терн.

Заваривать довольно густо: 2 стол. ложки смеси цветов и листьев на стакан кипятка. Пить, как чай, с медом.

7. Бузина черная.

20 г листьев залить стаканом кипятка, добавить 1 стол. ложку меда. Принимать по 1/4 стакана после еды.

8. Подорожник.

Растолченные семена подорожника заваривают кипятком, 10 г семян на полстакана кипятка. Настоять, процедить, выпить в один прием.

9. Конский щавель.

2 стол. ложки корня залить 500 мл кипятка и варить на водяной бане полчаса. Принимать по одному стакану на ночь. Меньшая доза не подействует.

В малых дозах он оказывает вяжущее действие, а в больших — это слабительное, действующее через 10-12 ч после приема.

10. Страдающие запорами должны пить воду, в которой долго варились сливы и овес. Сок редьки, рассол капусты в теплом виде, простоквашу и чай из сушеной вишни и сушеных яблок нужно пить от 4 до 5 раз в день.

11. Взять кору крушины, заваривать 12 г и пить, как чай.

12. Полезно также пить рассол капусты с дрожжами или с 4 г коры крушины.

13. В виде слабительного больному следует давать 4 раза в день рассол, надо держать огурцы в соленой воде в течение месяца. Когда рассол готов, то его и надо употреблять, а не огурцы.

14. Следующие ингредиенты весьма полезны в составе клизмы. Взять 1 столовую ложку толченого льняного семени или можно заменить овсом,

или ячменем, или листьями мальвы. Вскипятить в 4-х стаканах воды, процедить и добавить 1 столовую ложку соли или добавить 2 столовые ложки льняного или конопляного масла. Клизма должна быть весьма теплой при приеме.

СТАРЧЕСКАЯ НЕМОЩЬ

1. Крапива.

200 г майской крапивы залить 0,5 л водки или 50-60° спирта. Горло завязывать марлей или тряпочкой. Первые сутки держать на окне, а остальные 8 суток в шкафу и темноте. Процедить, отжать. Принимать по чайной ложке натощак за 30 минут до еды и 1 чайную ложку на ночь перед сном. Выпить всю бутылку. Человек делается бодрым, здоровым, сердце улучшает свою работу, улучшается состав крови, движения становятся легче, прокодит склероз.

2. Отруби пшеничные или ржаные.

1 столовую ложку с верком отрубей на 2 стакана воды. Кипятить 30—40 минут, помешивая. Прибавить 1 столовую ложку меда и дать немного прокипеть с медом. Принимать по 50 г 3—4 раза в день теплым или холодным. Питательная пища для тяжелобольных, старых людей, а также для ослабленных детей. Хорошо восстанавливает силы, дает много энергии. Мед можно класть по вкусу.

3. Овес в кожуре.

1 стакан овса в кожуре перебрать и промыть в холодной воде несколько раз. Залить 5-ю стаканами холодной воды. Поставить на огонь. Кипятить на малом огне до половины первоначального объема, процедить. В процеженный отвар добавить столько же по объему молока. Вновь прокипятить. Добавить туда 4 чайные ложки меда и еще раз прокипятить. Получившийся напиток применяется для укрепления сил при старческой слабости, для тяжелобольных, ослабевших людей, для людей, перенесших операцию, при болезнях почек как общеукрепляющее средство.

4. Звездчатка (травя), рожь (стебли).

Старческую немощь лечат настоем из травы звездчатки пополам со стеблями ржи. Такой настой пьют без нормы. Он придает силы, действует как общеукрепляющее средство.

5. Шиповник.

2 столовые ложки измельченных сухих плодов шиповника на 0,5 литра воды. Кипятить 15 минут на малом огне, настоять, укутав, на ночь, процедить. Принимать с медом в течение дня как чай и вместо воды. Применяется как общеукрепляющее, тонизирующее средство, ослабляющее развитие атеросклероза, повышающее сопротивляемость организма при инфекционных заболеваниях и как витаминное средство.

6. Тонизирующее средство — см. рецепты "Тонизирующие; переутомление".

СТЕНОКАРДИЯ

1. Боярышник (цветы).

Отвар. 2 столовые ложки сухих цветов на стакан воды. Кипятить 10 минут, когда остынет — процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3—4

раза в день. Настойка: 10 г сухих цветов на 100 г водки. Настоять 21 день в темном месте. Процедить, отжать. Принимать по 20—25 капель 3 раза в день. Еще лучше принимать по 7 капель на теплую воду. Принимать так, чтобы все рассосалось во рту. Полезно пить чай из плодов боярышника. 1 столовую ложку плодов на стакан воды. Кипятить 10—15 минут, настоять, укутав, 2 часа. Принимать по стакану 3 раза в день как чай. Некоторые с успехом применяют варенье из плодов боярышника. Собирают созревшие плоды, перетирают или толкут с сахаром в соотношении 1:1. Пользуются этим вареньем всю зиму.

Приступов не бывает.

2. Валериана (корень).

10 г сухого корня на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4—5 раз в день.

Настойка: принимать по 20—30 капель 3 раза в день.

3. Зверобой — 1 часть. Тысячелистник — 1 часть. Валериана (корень) — 1 часть.

Столовую ложку сбора на стакан холодной воды. Настоять 3 часа. Затем поставить на огонь, дать вскипеть, кипятить 5 минут. Когда остынет, процедить. Принимать стакан в течение дня в 3 приема.

4. Василнстник вонючий, настойка.

Аптечный препарат. Принимать по 15—20 капель 3 раза в день. Применяется при стенокардии, нарушении кровообращения, при гипертонической болезни.

СТОМАТИТ

1. Календула (Ноготки лекарственные).

Широко используются ноготки в качестве противовоспалительного и бактерицидного средства при заболеваниях слизистой оболочки рта, ангине, гингивите, пиорее. В этих случаях рекомендуются полоскания ротовой полости горла водным настоем (10 г цветков на 1 стакан кипятка) или настойкой (1 чайная ложка на 1 стакан теплой воды).

Для профилактики стоматита, гингивита раствором настойки или настоев ноготков полоскать полость рта утром и вечером, предварительно помассировав пальцами десны.

СТРАХ

1. Вереск — 4 ч., пустырник — 3 ч., сушеница — 3 ч., валериана — 1 ч.

Взять 4 ст. ложки смеси, залить 1 л кипятка, настаивать, затем принимать по 4—5 глотков через каждый час в течение дня. Данный настой помогает также при бессоннице и при расстроенных нервах.

СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ

1. Чабрец — 5 г на 500 мл кипятка, настаивать 40 мин. плотно закрытым. Его можно употреблять не более 2—3 раз в неделю. Он снимает стрессовое состояние, укрепляет нервы. Указанная порция принимается за 3—4 раза в день.

СУДОРОГИ НОГ, РУК

1. Лимон.

Утром и вечером соком свежего лимона смазывать подошвы ног. Ничем не вытирать. Одевать носки и обувь только после того, как сок высохнет на подошвах. Курс лечения не более 2-х недель. Применяется при судорогах ног.

2. Пробка от вина.

Пробки от винных бутылок наизыывают на нитки. Одевают такое ожерелье из пробок на икры или стянутую судорогой мышцу. Судорога через некоторое время проходит. Иногда даже достаточно потереть некоторое время место, сведенное судорогой, и она прекращается. Н а р о д н о е с р е д с т в о .

3. Горчичное масло.

При сведении судорогой рук или ног надо натирать больные места горчичным маслом.

4. Сургуч, железо.

У кого случится судорога в руке, надо взять в эту руку палочку сургуча, и судорога через некоторое время проходит. Иногда помогает, если взять в руки кусок железа.

ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

1. Женьшень (корень). Настойка.

Принимать по 15—25 капель 2—3 раза в день. Курс лечения 3—6 месяцев в осенне-зимний сезон. Весной и летом пить нельзя.

2. Заманха высокая. Настойка.

Принимать по 30—40 капель 2 раза в день, утром и в обед за 30 минут до еды. Применяется в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при истощении, а также при физической и умственной усталости, при половом бессилии.

3. Левзея сафлоровидная (маралий корень). Настойка.

Принимать по 20—30 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как тонизирующее при утомлении, половой слабости, при умственном и физическом утомлении.

4. Аралия маньчжурская. Настойка.

Принимать по 30—40 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как стимулирующее центральную нервную систему, половой слабости, нервном истощении, депрессивных состояниях, остаточных явлениях после воспаления мозговых оболочек, контузий и сотрясений головного мозга.

5. Лимонник китайский. Настойка.

Принимать по 20—40 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Порошок по 0,5—1 г 2 раза в день. Принимать натощак или спустя 4 часа после еды. Применяется как тонизирующее и стимулирующее центральную нервную систему не только при переутомлении и понижении работоспособности практически здоровых людей, но также для лечения истерических и истено-депрессивных состояний у психически и

нервно больных. Противопоказано при неринном возбуждении, бессоннице, нарушении сердечной деятельности и повышенном кровяном давлении.

6. Родиола розовая (золотой корень). Настойка.

Принимать по 20—40 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется при упадке сил, переутомлении, общей слабости, болезни почек, печени (воспалительные процессы), одышке, диабете, туберкулезе, женских болезнях, улучшает аппетит и сон, снижает усталость, приводит в норму кровяное давление, снимет головные боли, действуя главным образом на нервную систему, удаляет неприятные ощущения в области сердца, активизирует работу щитовидной железы, импотенция, наружно при ранах, ушибах, ревматизме, радикулите, экземе. Противопоказано при резко выраженных симптомах повышенной нервной возбудимости и истощения корневых клеток, лихорадочных состояниях, гипертонических кризах.

7. Пантокрин. Настойка.

Принимать по 15—20 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как сильное тонизирующее средство при умственном и физическом переутомлении, импотенции, как общеукрепляющее, при подагре, нервных расстройствах и др.

8. Элеутерокок. Настойка.

Принимать по 15—20 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как стимулирующее центральную нервную систему и весь организм, уменьшает уровень сахара в крови, увеличивает работоспособность, при импотенции. Все перечисленные препараты принимать 2—3 недели, а затем сделать перерыв 1 месяц, потом курс повторить. Длительное время принимать не желательно. Людям с повышенным давлением не принимать. Тонизирующие средства желательно принимать в холодное время года.

ТРАХЕОБРОНХИТ

1. Донник (трава) — 5 частей, тимьян, или богородская трава — 10 частей, фенкель, или укроп (семена) — 10 частей, мята (трава) — 10 частей, подорожник (листья, семена) — 15 частей, алтей, или мальва (корни, листья, цветы) — 15 частей, солодка, или лахрица (хорень) — 15 частей, мать-и-мачеха (листья, цветы) — 20 частей.

Смешать все травы. Затем 4 стол. ложки смеси залить 800 мл крутого кипятка, плотно закрыть крышкой, укутать и настаивать один час. Процедив и подогрев до 40 градусов С, пить по одному стакану с медом. За ночь выпить не менее двух стаканов.

ТРОМБОФЛЕБИТ, ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН

1. Сушенница топяная.

В ведро всыпать 200 г сухой травы, залить кипятком и настоять час, тщательно укутав. Потом опустить в ведро (настой должен быть теплым) ноги и держать примерно полчаса, подливая кипятка.

2. Полынь.

Смешать горсть толченой свежей полыни с мацони или простоквашей. Смесь нанести на марлю и приложить там, где вены наиболее сильно расширены. Ноги положить на подушечку и прикрыть пленкой или целлофаном. Снять марлю с кашицей через 30 мин.

3. Каланхоэ.

Наполнить половину поллитровой бутылки резаными листьями каланхоэ и налить доверху водки или 70° спирта. Поставить в темное место и периодически встывать. Через неделю настойка готова. Натирать вечером ноги настойкой, начиная от стопы и двигаясь к коленям и выше. Боли в ногах проходят сразу, но для излечения, исчезновения сетки вен необходимо повторять процедуру 4 месяца подряд.

4. Хмель.

1 ст. ложку шишек хмеля размельчить, залить 200 мл кипятка и нагревать на водяной бане 15 мин. Принимать по стакану 3 раза в день перед едой. На участке ног с расширенными венами прикладывать марлю, смоченную отваром хмеля.

5. Орешник.

1 стол. ложку на 200 мл кипятка заварить как чай. Пить отвар по полстакана 4 раза в день. Этот отвар помогает также при расширении мелких капилляров, вен. Свежие листья орешника собрать в июне, высушить в тени.

6. Каштан конский.

30 г цветков или плодов каштана конского (вынутых) раздробить и настаивать на 300 мл водки в темноте в течение недели, периодически взбалтывая. Затем, отцедив, принимать по 30 капель 3 раза в день перед едой. Существуют готовые аптечные настойки из каштана конского — эскузан, эсфалазид и эсцин. Их назначают внутрь по 10—20 капель 3 раза в день до еды.

Эти препараты применяют для лечения тромбозов, при родях и после операций, при варикозном расширении вен, особенно у беременных и рожениц.

ТРОФИЧЕСКАЯ ЯЗВА

1. Квасцы жженные.

В 100 г теплой горячей воды (кипяченой) высыпать квасцы жженные в порошок (на кончике ножа). Хорошо размешать. Промывать тампоном, смоченным в растворе квасцов, гноящиеся раны, трофические язвы и другие открытые раны. Квасцы осушают рану, стягивают ее, останавливают кровь и излечивают. Применять в основном для промывания ран.

2. Мумиё.

5—10 г мумиё хорошо размешать в 100 г жидкого натурального пчелиного меда. Марлевый тампон пропитать этим составом и наложить на язву или рану и перебинтовать. Менять повязку раз в сутки.

3. Смола-живица деревьев хвойных пород.

На язву или рану налить жидкой смолы-живицы, перебинтовать. Менять раз в 2—3 суток. Промыть после живицы рану спиртом и снова наложить живицу. Если смола-живица сухая, то ее растворить в 90°

спирте. Делается это так: смолу перебрать, сложить в стеклянную баночку или пузырь с широким горлом. Залить 90° спиртом так, чтобы спирт покрывал живицу на 1 см. Через несколько дней смола растворится. Ее намазывать на рану или тампоном.

4. Медунца (травя).

Свежие растертые или измельченные листья прикладывают к гнойным ранам, язвам, порезам или обмывают раны крепким настоем травы. Менять повязку дважды в день.

5. Народное симпатическое средство.

Промыть ваткой, смоченной в спирте, язву или рану. Взять свежесрезанный пшеничный колос, концом колоса водить по язве или ране крест-накрест 3 раза, затем колосок выбросить. Делать так трижды в день: утром, в обед и вечером. Делать в течение 3 дней. На это уйдет 9 колосков. Рана вскоре затянется и зарастет.

6. Бальзам для лечения ран. Смолу-живицу хвойных пород перетапливают пополам с коровьим маслом. Полученным бальзамом смазывают долго незаживающие раны.

7. Березовая зола.

1 кг березовой золы просеять и залить 10 литрами хрутого кипятка. Настоять, укутав, пока не станет легонько теплым. Больную ногу или руку опустить в этот щелок на 30 минут. Если же рана или язва неудобна для ванн, то делать компрессы. Марлю сложить в 6—8 раз, намочить в щелоке и накладывать компресс на больное место на 2 часа. Делать 2 раза в день. Через 2—3 недели пройдет любая незаживающая рана. Щелок вытянет весь гной и очистит рану. После золы рану промыть настойкой календулы (ноготки). 40 капель настойки на стакан холодной кипяченой воды. Промывать этим составом регулярно раны после компресса. Затем перевязать больное место и часа через 2—3 снова компресс.

8. Бальзам для ран.

100 г можжевельного дегтя, 2 яичных желтка стереть с 1 столовой ложкой розового масла. Затем к ним добавить по 1 чайной ложке очищенного скипидара, все время помешивая. Скипидара добавить 100 мл. Вливать понемножку и размешивать, а то яйцо свернется. Когда желтки, масло и скипидар стерты, то к ним добавить 100 г можжевельного дегтя. Хорошо размешать. Чайной ложечкой наливать этот бальзам на раны. Затем сделать повязку. Это прекрасное антисептическое и ранозаживляющее средство.

ТУБЕРКУЛЕЗ

1. Мед пчелный липовый.

100 г свиного нутряного сала. Масло сливочное несоленое — 100 г. Алоэ, сок (или агавы) — 150 г. Какао в порошке — 50 г.

Алоэ перед срезанием не поливать 2 недели. Растопить в эмалированной кастрюле: свиное сало, масло, мед. Когда все расплавится (кипеть не давать), кастрюлю снять и добавить туда остальные компоненты. Хорошо размешать. Хранить в стеклянной банке в холодильнике. Принимать по столовой ложке состава, растворив в стакане горячего молока. Пить утром и вечером. Принимать длительное время. Применяется при туберкулезе легких и упорном бронхите.

2. Смола-живица (сосны, кедра, пикты, ели). Очистить от примесей. Если смола густая, настоять на спирте 96°. Смолу кладут в баночку, заливают спиртом так, чтобы он на 1 см покрывал смолу-живицу. Через несколько дней смола растворится. 1 часть смолы на 2 части свиного нутряного сала — все это вместе перетопить. Снять с огня, когда остынет до 60°, не выше, добавить меда (лучше липового, если его нет, то любого). На 1 часть смолы и сала надо 1 часть меда (по весу). Все хорошо перемешать. К полученному составу добавить по весу 1/10 часть кости жженой белой животной и размешать. Принимать по чайной ложке на прием 3 раза в день. Курс от 3 до 6 месяцев. Считается хорошим средством при туберкулезе, бронхите, плевритах.

3. 1 стакан спирта (70°), 1 стакан меда, 1 ст. ложка березовых почек. Настоять в течение 9 дней в темной бутылке. Каждый день взбалтывать бутылку.

Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.

4. Мед липовый — 1 кг 200 г. Лист алоэ мелко порезанный — 1 стакан. Оливковое масло — 100 г. Березовые почки — 25 г. Липовый цвет — 10 г. Вода — 2 стакана.

Способ приготовления. Мед растопить в эмалированной кастрюле, не давая кипеть. Добавить к меду алоэ и дать покипеть 5—10 минут на малом огне. Отдельно от этого в 2 стаканак воды варить березовые почки и цвет липы. Кипятить 3 минуты. Настоять, укутав, 15—20 минут, процедить, отжать. Когда мед остынет, влить в него, отжав, почек и липы. Хорошо размешать. Смесь разлить в темные бутылки, добавить в каждую бутылку поровну оливкового масла. Перед употреблением взбалтывать. Принимать по одной столовой ложке три раза в день. Применяется при туберкулезе и болезнях легких.

5. Хороший рецепт при туберкулезе, малокровии, упадке сил и истощении (см. рецепт № 2 в рецептуре "Малокровие").

6. Настоять на 0,5 л 70° спирта 4 стебля алоэ и настаивать, по крайней мере, 4 дня. Пить 3 раза в день по 40 капель.

7. Взять стебли и листья пустырника и корни цикория обыкновенного. Эти две травы заварить и пить как чай 3 раза в день по рюмке. Через 9 недель — полное излечение. Легкие зарубцуются и очистятся от гноя.

8. Лимон — 10, яиц — 6, липового меда — 280 г, коньяку — 3/4 стакана.

Способ приготовления: 6 яиц, целых и свежих, кладут в банку (яйца должны быть непременно с белой, а не с желтой скорлупой). Лимоны выжимают и их соком заливают яйца. Банку ставят в прохладном, сухом и темном, но не колодном месте. Банку покрыть марлей и обернуть темной бумагой. Держать до растворения яичной скорлупы, что обычно берет от 5 до 6 дней. По истечении этого срока надо подогреть мед до состояния текучести, остудить и добавить его в общую смесь. Затем влить коньяк.

Перелить лекарство в темную бутыл, хранить в прохладном и темном месте. Принимать 3 раза в день по 1 ст. ложке сразу после еды.

При болезни легких советуют есть как можно больше фруктов и жиров.

П р и м е ч а н и е: 2—3 недели спустя после изготовления смесь портится. Ее надо выбросить и приготовить новую.

9. Взять 10 яиц (с белой, а не коричневой скорлупой). Яйца должны быть очень свежими. Взять 10 лимонов, тоже свежих и, по возможности,

спелых. Обмыть яйца и лимоны. Яйца положить в стеклянную банку с широким горлом. Затем туда же положить изрезанные на кусочки лимоны, но без зерен. Поставить в теплое место и накрыть марлей. По истечении 7 дней (смотря по температуре места настойки), когда яйца превратятся в массу, влить и настойку бутылку коньяка. Если сверху образуется плесень, то ее надо снимать до вливания коньяка, и после, до тех пор, пока плесень не будет больше проявляться. Мешать периодически деревянной ложкой. Должно бродить 3 недели в теплом месте. Когда абсолютно не будет появляться плесень, настойка размешивается и вливается в бутылки и закупоривается.

Десертная ложка перед едой 3 раза в день. Желательно бутылки иметь с широким горлом для того, чтобы иметь возможность выбросить плесень, если она будет появляться вновь. Желательно иметь бутылки темного стекла.

10. Это лекарство составляется из следующих веществ:

Липового меда — 1,2 кг, мелко нарубленного алоэ (следует помнить, что алоэ — сильное средство и больным со слабым сердцем его давать не следует) — 1 стакан; прованское масло — 200 г, березовые почки — 150 г, липовый цвет — 50 г, вода — 2 стакана.

Способ приготовления: растопить мед в кастрюле, потом добавить к нему алоэ, и смесь хорошо проварить. Отдельно от этого, в 2 стаканах воды заварить березовые почки и липовый цвет, кипятить их 1—2 минуты. Когда мед остынет, то, выжав из березовых почек и липового цвета сок, влить его и мед. Смесь разлить в 2 бутылки, добавив в каждую поровну прованского масла. Перед употреблением взбалтывать. Принимать по столовой ложке 3 раза в день.

11. Ловят медведох, сушат их и затем толкут в ступке, каменной чашке или просто растирают и мелкий порошок. Полученный таким образом порошок смешивают с каким-нибудь сладким сиропом. Определенной дозировки нет. Все делается по личному усмотрению каждого. Приблизительно берут 3 столовые ложки на прием, запивая их теплой водой. 2—3 раза ежедневно и течение 2—3 дней.

Обычно через 2—3 дня у больного появляется сильный аппетит, и он начинает быстро поправляться. Это — испытанный китайский метод.

УКУСЫ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ

1. Череда трехраздельная.

Народная медицина рекомендует растертую свежую траву **накладывать** на раны при укусах ядовитых змей.

УМСТВЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ УТОМЛЕНИЕ

1. Рапонтикум сафлоровидный.

В официальной медицине получал признание препарат экстракт лезвев жидкий, приготовленный на 70%-ном спирте в соотношении 1:1. Назначают его по 20—30 капель 2—3 раза в день до еды при умственном

и физическом утомлении в качестве стимулирующего средства, повышающего работоспособность. Препарат следует хранить в прохладном, защищенном от света месте.

Профессоры С. Я. Соколов и И. П. Замотаев о препарате левзеи сообщают, что в условиях клиники уже на 10—20 день у людей, страдающих расстройством нервной системы, импотенцией, а также при физическом и психическом переутомлении отмечалось улучшение общего состояния, нормализовался сон и аппетит, повышалась работоспособность. У некоторых больных повышалась половая потенция, уменьшались депрессивные явления. Важно, что даже при длительном применении препаратов левзеи не было отмечено никаких противопоказаний.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ

1. Мята перечная (листья) — 2 части. Вакта трехлистная (листья) — 2 части. Валериана (корень) — 1 часть. Хмель (шишки) — 1 часть.

2 столовые ложки смеси на 2 стакана кипятка. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день, утром и на ночь. Принимать при повышенной нервной раздражительности и бессоннице.

2. Валериана, корни — 2 части. Ромашка аптечная — 3 части. Тмин, плоды — 5 частей.

Готовить и употреблять как в рецепте №1.

3. Пустырник (трава) — 15 г. Сушеница (трава) — 15 г. Боярышник (цветы) — 15 г. Ромашка аптечная — 5 г.

1 столовую ложку смеси на стакан кипятка. Настоять, укутав, 8 часов, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день, через час после еды. Применяется при нервных расстройствах, сердечной слабости в сочетании с удушьем и головокружением.

4. Боярышник, настойка. Валериана, настойка.

Смешать обе настойки в равных количествах. Принимать по 30 капель на воде перед сном. Применяется как успокаивающее средство, при нервных расстройствах, при бессоннице, как укрепляющее сердечное.

УШИБЫ, КРОВОПОДТЕКИ, ОПУХОЛИ, ССАДИНЫ

1. Полынь горькая (трава). Прекрасное средство.

Свежую траву истолочь до сока и прикладывать к пораженным местам. При сильном ушибе наложить толстым слоем. Не допускать высыхания, чаще менять или смачивать сверху водой. Зимой применять мазь (1 часть сока полыни, сгущенного на воздухе, на 4 части основы, т. е. коровьего масла, или свиного жира, или вазелина). Можно консервированным соком. Сок консервируется водкой или 60% спиртом. Можно запарить свежую траву кипятком и когда остынет, делать в виде колодной примочки, но это не так эффективно.

2. Лук огородный.

Свежий сок его или натертая кашица лука в виде компресса. Прекрасное средство при ушибе, особенно колена.

3. Арника. Настойка.

Внутрь 30—40 капель. Наружно как примочка. Если ушиб с поражениями и ссадинами, то употребляется неразведенная настойка, если же без поражений, а только с кровоподтеками и опухолью, то настойку развести 1:10. Арника ценна при ушибах груди, как успокаивающее и болеутоляющее средство.

4. Зверобой.

Внутрь в виде отвара. 20 г зверобоя на 400 г кипятка. Томить до половины объема на малом огне. Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день. Для наружного применения делается мазь так же как из сока полыни (см. выше).

5. Подорожник (травя).

Ценен и свежем виде как противовоспалительное и болеутоляющее средство. Прикладывать размятые или целые листья к ушибленным местам, хотя бы и с поражениями. Сок может заменить свежие листья. Продается в аптеке. Можно настойкой или мазью из нее (1:4). Могут отчасти заменить свежие листья или сок.

6. Чемерница Лобеля.

Свежие корни отваривают в воде. Теплым отваром натирают больные места. Хорошо лечит вывихи, ушибы, опухоли. Вывихи без правки становятся на свое место, опухоль спадает. Этим же отваром лечат отеки (путем растирания).

7. Бодяга.

Прекрасное средство. На 1 столовую ложку воды 2 столовые ложки бодяги в порошок. Это тесто наложить на ушиб и перевязать. Целебное действие начнется как только начнет испаряться вода и бодяга станет полусухой. Можно разводить бодягу подсолнечным маслом в соотношении 1:1. Менять 2 раза в день.

8. Делать примочки и компрессы из свинцовой воды. Продается в аптеке.

9. Взять 1/2 литра 6% уксуса, 2 головки чеснока и мелко нарезать, затем настоять 1 сутки. Готовой смесью растирать больные места.

ЦИСТИТ

1. Сбор N 1.

Лист березы — 10 г. Лист толокнянки — 10 г. Кукурузные рыльца — 10 г. Корень солодки — 10 г. Корневища пырея — 10 г.

1 столовую ложку смеси настаивать 6 часов в 1 стакане холодной воды, кипятить 15 минут, процедить. Выпить в течение дня или в несколько приемов.

2. Сбор N 2.

Трава хвоща полевого — 15 г. Корневища лапчатника — 15 г. Листья подорожника — 20 г.

1 столовую ложку смеси залить 2 стаканами кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Выпивать вечером, за один прием 1 стакан теплого настоя.

3. Красный кирпич расколоть пополам. Обе половинки нагреть на огне, чтобы они хорошо прогрелись и положить обе половинки в пустое ведро. Края ведра обложить тряпкой или любой материей. Снять трусы и сесть на это ведро. Нижнюю часть туловища укутать пледом, пальто и сидеть на

этом ведре до тех пор, пока от кирпича будет исходить тепло. После этого одеть теплос белье и лечь в постель. От 2—3 процедур цистит проходит. Этот народный рецепт особенно хорош для женщин.

4. Хвощ полевой.

2 столовые ложки с верхом хвоща полевого залить одним литром воды. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 20 минут, процедить. Траву хвоща полевого сложить в холщевый мешочек и в тепло-горячем виде прикладывать на низ живота при цистите. Отвар принимают внутрь по 1 стакану 2—3 раза в день. При болезненном мочеиспускании пьют горячий чай из смеси травы и цветков ромашки поровну. Прием 3 стакана в день. При спазмах мочевого пузыря пьют глотками, но часто, горячий навар из цветков васильков и травы хвоща, смешанных поровну. В то же время массируют область мочевого пузыря, а потом кладут на низ живота подушечку, наполненную горячим распаренным хвощем.

5. Осина.

20 г почек, коры или листьев на 1 стакан кипятка. Кипятить 7—10 минут, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 2 столовых ложки 3 раза в день. Почки осины настоять на водке или 70° спирте в соотношении 1:10. Принимать по 25—30 капель 3 раза в день. Отвар и настойка применяются при остром хроническом цистите и слабости мочевого пузыря.

6. Брусника.

Одну горсть листьев брусники заварить в трех стаканах воды. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 4 часа, процедить. Всю эту дозу выпить в течение дня в три приема. Применяется как мочегонное средство.

ШПОРА ПЯТОЧНАЯ

1. Сирень обыкновенная.

Настойку цветов используют при ревматизме, отложении солей в суставах, при пяточных шпорах (высушенные цветки залить 40-градусным спиртом в отношении 1:10, настоять 8—10 дней в плотно закрытой посуде. Принимать по 30 капель 2—3 раза в день и одновременно натирать или делать компрессы из этой же настойки на больные участки).

ЭКЗЕМА

1. Мазь из листьев лопуха (составная). Сушеные листья лопуха — 20 г. Цветы ромашки — 20 г. Корень копытня — 20 г. Травы кипрея (Иван-чай) — 20 г.

Все высушить, размельчить и смешать. Смесь варят в 4-х стаканах воды, затем добавляют столовую ложку коровьего масла и два стакана крепкого отвара сенной трухи, вновь варят до густоты тягучей клейкой массы (лучше варить в водяной бане), процедить и отжать. Смешать поровну с глицерином. Мазь дает блестящие результаты при экземах. Хорошо пить отвар корня лопуха 15 г на 200 г кипятка. Кипятить 10 минут на малом огне. Укутать теплее. Настоять 2 часа. Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день перед едой.

2. От экземы пить цветы крапивы — яснотки (крапива, которая не

колется, имеет белый цвет зевиков). Заварить 1 столовую ложку цветков на стакан воды (кипятка). Настоять, укутав, на 1,5—2 часа теплее. Пить за 30—40 минут до еды по одному стакану. Хорошо помогает при экземе, больных почках, кровотечениях. Цветки пьют при болезнях дыхательных путей, при диспепсии. Отвар травы употребляют от золотухи при фурункулезе и других заболеваниях кожи.

3. Отварить 6 яиц (варить 12 минут). Аккуратно вытащить желтки. Насадить желток на спицу или длинную проволоку. Держать над огнем желток, пока с него потечет белая жидкость. Будет капать небольшими каплями. Собрать эти капли в чистую баночку. Мазать этим прозрачным раствором больные места. Раньше так делали в народе и помогало.

4. Ягода земляники.

Наружно кашицей из толченых ягод земляники лечат экзему. Делают компрессы на пораженные места.

5. Ягода черники.

Свежесорванные ягоды в растертом виде применяют в компрессах и примочках для лечения мокнущей экземы, для лечения ожогов и других кожных заболеваний.

6. Свежий капустный лист привязать к пораженным местам. Держать 2—3 дня, пока не полегчает. Потом лист снять. Делать несколько раз. Помогает. Деревенский рецепт.

7. Пырей (корень).

Собирать в мае. Делать отвар 20 г корней на стакан кипятка. Принимать стакан в течение дня, пить его 3 раза перед едой. Наружно из отвара делать примочки.

8. Осина (древесина).

Золу от древесины смешать с вазелином пополам или 1:4 для мази. Мазать пораженные места.

9. Мазь (жидкость) лесовая.

Продукт термической обработки (сухой перегонки) определенных древесных пород (лещины, ольхи, можно липы). Применяется наружно при экземе, нейродермите и других кожных заболеваниях. Аптечный препарат.

10. Медный купорос разводится до нежной голубизны. Протирать (промыть им больные пораженные места). Как высохнет, смазать жиром или вазелином. За 3—4 раза отходит. Был случай, когда помогло человеку, у которого на ногах кожа висела и отходила хлопьями. Вначале он промыл крепким раствором (отваром) луковой шелухи. Потом этим раствором и жиром, помогло.

11. Березовые почки, настойка.

Наружно настойку применяют при пролежнях, вяло протекающих грануляциях, в виде горячих ванн при лечении острых и хронических экзем.

12. Тысячелистник.

Экзема быстро излечится, если крепким настоем тысячелистника парить больные места и принимать настой этого же растения внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день.

13. Одну столовую ложку вершка (верх с отстоявшегося натурального молока) плюс свежее яйцо, плюс 100 грамм дегтя березового. Все хорошо

смешать. Намазать состав на тряпочку и наложить на пораженное экземой место, перевязать. Менять ежедневно. Делать процедуры до исчезновения пятен. Можно делать с можжевельным дегтем. Этот рецепт хорошо при мокнущей экземе.

14. Девясил высокий.

Отвар девясила высокого (10 г на 100 мл воды) применяют и в дерматологии по 1 столовой ложке 3 раза в день при лечении экземы, чесотке, плоского лишая. Отваром корней смазывают также пораженные участки кожи при демодекозе и чесотке.

ЭКЗЕМА АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ

1.* Шалфей — 10 г, подорожник (листв.) — 10 г, тысячелистник — 15 г, полынь — 5 г, крапива (листв.) — 10 г, зверобой — 15 г, хвощ — 15 г, кукурузные рыльца — 10 г, можжевельник (ягоды) — 10 г.

3 стол. ложки смеси заварить 500 мл кипятка, настоять. Принимать по 150—200 мл с сахаром за полчаса до еды.

2. Крапива (листв.) — 10 г, душица (трав.) — 10 г, череда (трав.) — 10 г, фиалка трехцветная (трав.) — 10 г, ромашка (цветы) — 10 г, тимьян (трав.) — 10 г, хвощ (трав.) — 10 г, валериана (корень) — 15 г, солодка (корень) — 10 г.

1 стол. ложку смеси залить 200 мл кипятка, настоять 20 мин и выпить горячим. Настой хранению не подлежит.

3. Простая смесь, которую каждый может собрать летом и засушить на зиму:

череда — 10 г, земляника (листв.) — 100 г, ромашка (цветы) — 100 г.

Пить эту смесь постоянно вместо чая, заваривая 1 стол. ложку 200 мл кипятка.

Для примочек на кожу хорошо применять отвар коры дуба с тысячелистником и чередой. В кипящий отвар коры дуба (1 стакан толченой коры на 1 л воды) положить полстакана череды и полстакана тысячелистника. Настоять 15 мин и опустить туда руку, покрытую экземными высыпаниями. Лучше сделать ванну с этим отваром, увеличив количество травы. После ванны руки не вытирать, только промокнуть или дать отвару высохнуть на коже.

4. Дурнишник обыкновенный колючий.

Наиболее эффективный метод состоит в натирании пораженных мест сырыми листьями или отваром дурнишника.

Отвар готовится следующим образом: 2 ст. ложки травы на 400 мл кипятка, томить 15 мин.

Можно принимать отвар вовнутрь, 3 раза в день по стакану перед едой.

Также принимают внутрь свежий сок: по 15—20 капель взрослым; 2—10 капель детям.

5. Лопух.

а) перед едой постоянно принимать отвар корня лопуха из расчета 15 г на 200 мл кипятка. Принимать по одной стол. ложке 3 раза в день и по 2 стол. ложки на ночь.

* Выше упомянуты 3 рецепта профессора С. Я. Соколова, применяемые при нейродермите и экземе.

б) измельчить корень лопуха (1,5—2 стакана), прокипятить его и остудать. В теплый отвар опустить простыню, сложенную ачетверо, обернуть влажной простыней тело от подмышек до щиколоток и плотно укутать больного одеялом. Оставить так на 2 ч в постели; если больной уснет, снять простыню после пробуждения. Пропециуру повторять шесть вечеров подряд. Затем сделать перерыв на день и снова продолжать шесть дней. Делать такие влажные обертывания нужно, пока не очистится кожа и на теле не появится легкая сыпь, которая быстро исчезает.

6. Рецепт мази:

лопук (лист) — 20 г, ромашка (цветы) — 20 г, копытень (корень) — 20 г, кипрей (травa) — 20 г.

Смесь сварить в 4 стаканак воды, затем добавить 1 стол. ложку сливочного масла и 2 стакана крепкого отвара сенной труки, затем снова варить до получения тягучей клейкой массы (на водяной бане). Про-цедить, отжать, смешать пороану с глицерином. Смазывать пораженные места.

Нужно проделывать все процедуры одновременно.

Этот интересный способ лечения экзем корнем лопуха предлагает известный фитотерапевт А. П. Попова.

7. Вербена.

Можно заваривать чай из вербены — 15—20 г на стакан кипятка. В тяжелых случаях пправмают до 60 г в день. Пить в течение всего дня.

8. Череда — 4 ч, земляника (листья) — 4 ч, грецкий орск (листья) — 1 ч, крапива — 2 ч.

2 стол. ложки смеси залить стаканом кипятка и через 20 мин вынуть горячим. Эта смесь дает результаты через две недели. Необходимо принимать год, никогда не нарушая количества выпитого отвара — 3 стакана днем и на ночь. Этой же жидкостью смачивать экземы.

ЭНДАРТЕРИИТ

1. Багульник болотный.

2 столовые ложки измельченной травы багульника с 5 ложками подсолнечного масла настоять 12 часов а закрытом сосуде на горячей плите (изредка помешивая), процедить. Употреблять как наружное втирание при эндартерияте, ревматизме, подагре.

ЭПИЛЕПСИЯ

1. Девясил высокий.

Используют настой из расчета 2 чайные ложки на 1 стакан кипятка (а термосе). Принимают по 1/3 стакана 3 раза а день за 20-40 минут до еды.

Весьма эффективен девясил высокий при эпилепсии.

2. Полевой шалфей или буканца.

6 г букайцы заварить 0,5 л кипятка с сахаром. Настоять 15 минут. Пить как чай перед едой. Это дневная доза.

ЯЗВА ЖЕЛУДКА.

1. Сбор, применяемый пра язве желудка и 12-перстной кишки. Ромашка аптечная (цветы) — 10 г, фенкель (плоды) — 10 г, алтей (корень) — 10 г, пырей (корневище) — 10 г, солодка (корень) — 10 г.

2 чайные ложки смеси на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать на ночь по стакану настоя.

2. Сбор, применяемый при язве желудка и 12-перстной кишки. Листья кипрея — 20 г, липовый цвет — 20 г, ромашка аптечная (цветы) — 10 г, фенхель (плоды) — 10 г.

2 чайные ложки смеси на стакан кипятка. Настоять, укутав, 1,5-2 часа, процедить. Принимать от одного до 3 стаканов настоя в течение дня.

3. Язва желудка с болями. Раковые шейки (корни) — 1 часть, подорожник (лист) — 1 часть, хвощ полевой — 1 часть, зверобой — 1 часть, валериана (корень) — 1 часть, ромашка аптечная — 1 часть.

1 столовую ложку смеси на стакан кипятка. Парить 1 час. Принимать по 100 г 3 раза в день до еды.

4. Череда — 100 г. Чистотел — 100 г. Зверобой — 100 г. Подорожник — 100 г.

Все хорошо измельчить, смешать. 1 столовую ложку смеси на стакан кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за час до еды или через 1,5 часа после еды.

5. Солодка, корень — 10 г. Апельсиновые корки — 6 г. Вода — 100 г.

Парить на малом огне до половины первоначального объема. Добавить 60 г меда. Эту дозу принимать в течение дня в 3 приема. Курс лечения 1 месяц.

6. Очищенный картофель варить в эмалированной кастрюле, не соля. Потом отвар слить. Этот отвар принимают по 0,5-1 стакану 3 раза в день. Пить ежедневно свежий отвар, не допуская запаха и порчи.

7. Капуста белокочанная.

Пьют сок свежей капусты по 1/2 стакана 2-3 раза в день за час до еды в теплом виде.

8. Облепиха крушиновидная.

Для лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки принимают по 1 чайной ложке облепихового масла 3 раза в день перед едой в течение 3-4 недель. В первые 3-4 дня лечения усиливается изжога и появляется кислая отрыжка. Чтобы предотвратить эти неприятные ощущения, в облепиховое масло перед употреблением добавляют 1/4 стакана 2-процентного раствора соды и хорошо взбалтывают. При систематическом приеме внутри уменьшается или совсем исчезает боль, изжога, отрыжка. На кислотность желудочного сока масло существенно не влияет.

Кроме масла широко применяются свежие и консервированные плоды облепихи как ценное поливитаминное средство. Плоды облепихи моют, кладут в чистую эмалированную посуду, засыпают равным по весу количеством сахарного песка, хорошо размешивают. Затем смесь перекладывают в пол-литровые стеклянные банки, наполняя их на 4/5 объема, а сверху засыпают сахарным песком. Банки закрывают пергаментом и завязывают. В таком виде облепиха может храниться в прохладном темном месте в течение всей зимы, не потеряв своего вкуса и целбных свойств.

9. Календула (ноготки лекарственные).

Водный настой для приема внутрь готовят несколько иначе: 20 г цветков заливают 1 стаканом кипятка, выдерживают на водяной бане в

течение 15 мин, процеживают, доводят до 1 стакана и в теплом виде пьют по 1—2 столовые ложки 2—3 раза в день. Рекомендуются при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

10. Клевер.

Смесь клевера (со стеблем) и кипрея (со стеблем) в одинаковых пропорциях. Смесь заваривать, как чай, и пить в течение дня. Настой имеет противовоспалительный эффект, используется при лечении язвенной болезни желудка, гастритах и колитах.

11. Удалить шкуру с картофеля, отварить, слить воду, пить несоленый отвар по 1/2 стакана 3 раза в день.

ЯЧНИКОВ (ПРИДАТКОВ) ВОСПАЛЕНИЕ

1. Донник желтый (цветы)— 1 часть, золототысячник (травя)— 1 часть, мать-и-мачеха (цветы)— 1 часть. Все хорошо измельчить, смешать. 1 столовую ложку смеси на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1/3 стакана 6 раз в день, в течение 3—4 недель. При этом рекомендуется полное воздержание от половой жизни на период лечения.

2. Грушанка круглолистная.

а) 1—2 чайные ложки сухих листьев грушанки на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день.

б) Настойка.

50 г листьев и стеблей грушанки на 0,5 литра водки. Настоять 2 недели в темном месте. Принимать по 30—40 капель 3 раза в день. Препараты грушанки применяются при воспалительных процессах в придатках, воспалении предстательной железы, при бесплодии, непроходимости труб, при воспалительных заболеваниях матки, при хроническом воспалении мочевого пузыря и мочевых путей с наличием гноя в моче.

ЯЧМЕНЬ НА ГЛАЗАХ.

1. Пижма (цветы).

Страдающим от ячменя рекомендуется принимать по 5—6 сухих маленьких желтых цветочков пижмы за один раз, запивая водой. В течение дня принимать 4—5 раз таким образом. Пить пока не пройдет ячмень. Это простое средство навсегда избавляет человека от ячменя на глазах.

2. Календула (ноготки), (цветы).

10—15 г сухих цветов на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30—40 минут, процедить. Делать примочки и компрессы на больные глаза при ячменях. Настойка календулы: развести кипяченой водой 1:10. Делать примочки. Календула считается хорошим средством при гнойных воспалениях глаз.

3. Алоэ (столетник), цвет домашний.

1 средний лист (5 г) измельчить и настоять 6 часов в стакане холодной кипяченой воды, процедить. Делать примочки на больные глаза. Срезать лист, обмыть, отжать сок, развести водой 1:10. Делать примочки.

СБОРЫ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

В данном разделе приведены состав, способ приготовления и показания к применению сборов лекарственных растений, употребляемых в народной медицине. В этот перечень включены сборы, утвержденные Фармакологическим комитетом Министерства здравоохранения СССР, некоторые сборы, рекомендуемые болгарскими фитотерапевтами Иордановым Д., Николовым П., Бойчиновым А., а также сборы, предлагаемые Соколовым С. Я. и Замотаевым И. П. Общая масса измельченных растений составляет 100 г смеси.

Сборы должны готовиться из измельченного растительного сырья в массовых соотношениях, указанных в рецептуре. Лекарственные растения тщательно перемешивают и помещают в бумажные пакеты или стеклянные банки.

1) Настой из лекарственных растений или сборов готовят следующим образом: 10 г (1-2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды (на водяной бане) 15 мин., охлаждают 45 мин. при комнатной температуре, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

2) Отвар готовят следующим образом: 10 г (1-2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей воды, закрывают крышкой и нагревают в кипяченой воде (на водяной бане) 30 мин., охлаждают при комнатной температуре 10 мин., процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

3) Ингаляционные смеси.

Приготавливают на основе готовых отваров или настоев с последующим разведением их кипяченой водой до необходимой лечебной концентрации ингаляционной смеси в целом (обычно 1:2 и 1:3).

4) Растворы для примочек, спринцевания, местных ванночек готовят аналогичным способом, однако в случае необходимости получения более концентрированных водяных вытяжек исходные настои и отвары следует готовить из расчета 1:5 и 1:3 и применять их в нативном виде.

5) Ванна.

Для приготовления лечебных ванн настои и отвары используют из расчета 1-2 л на ванну.

Курс лечения при большинстве хронических заболеваний составляет 25—35 дней. Повторные курсы назначают после 10—15-дневного перерыва, но не более 2 курсов после основного курса лечения. В отдельных случаях во избежание снижения эффективности или для предупреждения привыкания рекомендуется при повторных курсах

лечения изменять состав сборов и назначать лекарственные растения, обладающие аналогичной терапевтической активностью.

Сборы лекарственных растений.

- 1) См. способ приготовления настоя.
- 2) См. способ приготовления отвара.
- 3) См. способ приготовления ингаляционных смесей.
- 4) См. способ приготовления растворов для примочек.

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

1. Алтей лекарственный (корень) — 20 г. Солодка голая (корень) — 20 г. Анис обыкновенный (плоды) — 20 г. Шалфей лекарственный (листья) — 20 г. Сосна обыкновенная (почки) — 20 г.

Принимать по 1/4 стакана настоя¹⁾ 3-4 раза в день при заболеваниях органов дыхания.

2. Алтей лекарственный (корень) — 40 г. Солодка голая (корень) — 40 г. Фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г.

Принимать по 1/4 стакана настоя через каждые 4 часа при заболеваниях органов дыхания.

3. Алтей лекарственный (корень) — 40 г. Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 40 г. Душица обыкновенная (травы) — 20 г.

Принимать в виде теплого настоя¹⁾ по 1/2 стакана 3-4 раза в день при заболеваниях органов дыхания.

4. Подорожник большой (листья) — 30 г. Солодка голая (корень) — 30 г. Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 40 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя¹⁾ через каждые 4 часа при заболеваниях органов дыхания.

5. Алтей лекарственный (корень) — 40 г. Солодка голая (корень) — 30 г. Девясил высокий (корень) — 30 г.

Принимать по 1/4 стакана настоя¹⁾ через каждые 3 часа при заболеваниях органов дыхания.

6. Анис обыкновенный (плоды) — 20 г. Алтей лекарственный (корень) — 40 г. Солодка голая (корень) — 40 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя¹⁾ через каждые 3 часа при заболеваниях органов дыхания.

7. Шалфей лекарственный (листья) — 20 г. Анис обыкновенный (плоды) — 20 г. Сосна обыкновенная (почки) — 20 г. Алтей лекарственный (корень) — 20 г. Солодка голая (корень) — 20 г.

Принимать по 1/3 стакана настоя¹⁾ 3-4 раза в день при заболеваниях органов дыхания.

8. Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 25 г. Анис обыкновенный (плоды) — 25 г. Алтей лекарственный (корень) — 25 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя 3 раза в день после еды при заболеваниях органов дыхания.

ПРИ ТРАХЕОБРОНХИТЕ, ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ, ОСТРОМ, СУХОМ БРОНХИТЕ И БРОНХОСПАЗМЕ.

1. Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 10 г, подорожник большой (листья) — 20 г, квощ полевой (трава) — 30 г, первоцвет весенний (цветки) — 40 г.

Принимать в теплом виде настоя¹⁾ или отвара²⁾ по 1/3—1/4 стакана при кашле, трахеобронхите, хроническом бронхите, остром сухом бронхите.

2. Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 20 г, подорожник большой (листья) — 30 г, солодка голая (корень) — 30 г, фиалка трехцветная (трава) — 20 г.

Принимать в виде теплого настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана перед едой 3 раза в день при кашле, трахеобронхите, хроническом бронхите, остром бронхите.

3. Багульник болотный (трава) — 10 г, мать-и-мачеха (листья) — 10 г, фиалка трехцветная (трава) — 10 г, подорожник большой (листья) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г. Первоцвет весенний (трава и корни) — 10 г, анис обыкновенный (плоды) — 10 г, алтей лекарственный (корни) — 20 г, солодка голая (корни) — 10 г.

Принимать по 1/3 стакана в виде настоя¹⁾ или отвара²⁾ 3 раза в день после еды при сухих бронхитах.

4. Алтей лекарственный (корень) — 40 г, солодка голая (корень) — 25 г, мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 20 г, фенкель обыкновенный (плоды) — 15 г.

Принимать в виде теплого настоя¹⁾ или отвара²⁾ по 1/3—1/4 стакана 3—5 раз в день при остром и хроническом бронхите, эмфиземе легких, пневмонии.

5. Донник лекарственный (трава) — 5 г, тимьян обыкновенный (трава) — 10 г, фенкель обыкновенный (плоды) — 10 г, мята перечная (листья) — 10 г, подорожник большой (листья) — 15 г, солодка голая (корень) — 15 г, мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 20 г.

Принимать в теплом виде отвара²⁾ или настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана в день при кашле, трахеобронхите, хроническом бронхите, остром сухом бронхите.

6. Девясил высокий (корни) — 10 г, анис обыкновенный (плоды) — 10 г, сосновые почки — 15 г, халендула (цветки) — 10 г, шалфей лекарственный (листья) — 10 г, мята перечная (трава) — 10 г, мать-и-мачеха (трава) — 10 г, фиалка трехцветная (трава) — 10 г, эвкалипт прутовидный (листья) — 15 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ или отвара²⁾ по 1/3—1/4 стакана 3 раза в день после еды при влажных бронхитах.

7. Шалфей лекарственный (трава) — 20 г, тимьян обыкновенный (трава) — 15 г, ромашка аптечная (цветки) — 15 г, синюха голубая (корни) — 15 г, анис обыкновенный (плоды) — 15 г, мать-и-мачеха (листья) — 10 г, халендула лекарственная (цветки) — 10 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана 3—4 раза в день после еды при бронхиолите.

8. Солодка голая (корни) — 15 г, синюха голубая (корни) — 15 г, ромашка аптечная (цветки) — 20 г, валериана лекарственная (корни) — 10 г, пустырник пятилопастный (травы) — 10 г, мята перечная (травы) — 20 г, зверобой продырявленный (травы) — 10 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана 3—5 раз в день после еды при бронхоспазме.

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ, КОКЛЮШЕ, ХРОНИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИИ

1. Анис обыкновенный (плоды) — 30 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 30 г, льняное семя — 20 г, тимьян обыкновенный (травы) — 20 г.

Применять в виде теплого настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана 3 раза в день при бронхиальной астме, коклюше, инфекционных заболеваниях бронхов.

2. Багульник болотный (травы) — 10 г, мать-и-мачеха (листья) — 10 г, фиалка трехцветная (травы) — 10 г, ромашка аптечная — 10 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, солодка гладкая (корни) — 10 г, девясил высокий (корень) — 10 г, анис обыкновенный (плоды) — 10 г, мята перечная (травы) — 10 г, подорожник большой (листья) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день после еды при бронхиальной астме, астмоидных бронхитах.

3. Солодка голая (корни) — 10 г, череда трехраздельная (травы) — 10 г, аралия маньчжурская (корни) — 10 г, хвощ полевой (травы) — 10 г, шиповник хоричный (плоды) — 10 г, бессмертник песчаный (цветки) — 10 г, девясил высокий (корни) — 10 г, ольха серая (соплодия) — 10 г, одуванчик лекарственный (корни) — 10 г, лопух большой (корни) — 10 г.

Применять в виде настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана 3 раза в день после еды в качестве десенсибилизирующего средства.

4. Тимьян обыкновенный (травы) — 20 г, мать-и-мачеха обыкновенная (травы) — 20 г, фиалка трехцветная (травы) — 20 г, девясил высокий (корень) — 20 г, анис обыкновенный (плоды) — 20 г.

Применять в виде теплого настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана 3 раза в день при бронхиальной астме, инфекционных заболеваниях бронхов.

5. Анис обыкновенный (плоды) — 20 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г, тимьян обыкновенный (травы) — 20 г, солодка голая (корень) — 20 г, сосна обыкновенная (почки) — 20 г.

Применять в виде теплого настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана 3 раза в день при бронхиальной астме, коклюше, инфекционных заболеваниях бронхов.

6. Алтей лекарственный (корни) — 50 г. Тимьян обыкновенный (травы) — 50 г.

Применять в виде настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана 3 раза в день при бронхиальной астме, коклюше, инфекционных заболеваниях бронхов.

7. Сосна обыкновенная (почки) — 40 г, подорожник большой (листья) — 30 г, мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 30 г.

Применять в виде теплого настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана 3 раза в день при бронхиальной астме, коклюше, инфекционных заболеваниях бронхов.

8. Девясил высокий (корни) — 10 г, анис обыкновенный (плоды) — 10 г, сосновые почки — 10 г, календула (цветки) — 10 г, шалфей лекарственный (листья) — 10 г, мать-и-мачеха (листья) — 10 г, зверобой продырявленный (травы) — 10 г, подорожник большой (листья) — 10 г, липа перечная (травы) — 10 г, эвкалипт прутовидный (листья) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя 3 раза в день после еды при хронической пневмонии, бронхоэктатической болезни.

ПРИ ЛАРИНГИТАХ, ТРАХЕИТАХ, АНГИНАХ, ТОНЗИЛИТАХ

1. Эвкалипт прутовидный (листья) — 20 г, календула (цветки) — 15 г, шалфей лекарственный (листья) — 15 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, девясил высокий (корни) — 10 г, солодка голая (корни) — 10 г, липа сердцевидная (цветки) — 10 г, багульник болотный (травы) — 10 г.

Для полоскания ротоглотки при ларингитах, трахеитах, ангинах, тонзилитах.

2. Эвкалипт прутовидный (листья) — 15 г, шалфей лекарственный (листья) — 20 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, липа перечная (травы) — 10 г, анис обыкновенный (почки) — 15 г, девясил высокий (корни) — 20 г, тимьян обыкновенный (травы) — 10 г.

Для приготовления ингаляционной смеси³⁾ при ларингитах, трахеитах, ангинах, тонзилитах.

ПРИ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Корень алтея — 20 г, мать-и-мачеха — 20 г, душица — 10 г. Столовую ложку смеси заваривают 2 стаканами крутого кипятка, настаивают 20 мин., затем процеживают через марлю и принимают в теплом виде по 1/2 стакана через каждые 3 часа.

2. Малина (плоды) — 20 г, душица (травы) — 10 г.

Две столовые ложки смеси заварить двумя стаканами кипящей воды, настаивать 30 мин., процедить через марлю и пить настой горячим по полстакана 3-4 раза в день как потогонное и отхаркивающее средство.

3. Малина (плоды) — 10 г, липа (цветы) — 10 г.

Две ст. ложки смеси заварить двумя стаканами кипящей воды, кипятить 5 мин., процедить через марлю. Пить отвар горячим по полстакана 3-4 раза в день как жаропонижающее и противовоспалительное средство при простуде и гриппе.

ОТХАРКИВАЮЩИЕ СБОРЫ

1. Мыльный корень (туркестанский) — 40 г, солодка (корень, измельченный) — 10 г.

Способ употребления: 1 чайную ложку сбора заварить в стакане кипятка, настаивать 30 минут, процедить и выпить в течение дня в 3-4 приема.

2. Багульник болотный (трава) — 20 г, тимьян обыкновенный (трава) — 20 г, мать-и-мачеха (листья) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, солодка голая (корни) — 20 г, алтей лекарственный (корни) — 20 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ или отвара²⁾ по 1/4—1/3 стакана 3—5 раз в день после еды в качестве противокашлевого средства.

3. Солодка голая (корень) — 40 г, липа сердцевидная (цветки) — 60 г.

Принимать в виде горячего настоя¹⁾ 2—3 раза в день по 1 стакану при простудных заболеваниях, а также как потогонное и противовоспалительное средство.

4. Истод сибирский (корни) — 15 г, мать-и-мачеха (листья) — 15 г, первоцвет весенний (трава) — 10 г, анис обыкновенный (плоды) — 15 г, мята перечная (трава) — 15 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, подорожник большой (листья) — 20 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ или отвара²⁾ 3—4 раза в день после еды в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства.

5. Первоцвет весенний (трава и корни) — 10 г, девясил высокий (корни) — 10 г, шалфей лекарственный (листья) — 10 г, сосновые почки — 10 г, мята перечная (трава) — 10 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, подорожник большой (листья) — 10 г, солодка голая (корень) — 10 г, зверобой продырявленный (трава) — 10 г, тимьян обыкновенный (трава) — 10 г.

Принимать по 1/3 стакана настоя¹⁾ 3—5 раз в день после еды при острых респираторных заболеваниях.

ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ПРИ ЛАРИНГИТЕ И АНГИНЕ

1. Фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, мята перечная (листья) — 30 г, ромашка лекарственная (цветки) — 30 г, шалфей лекарственный (листья) — 30 г.

Применять в виде теплого настоя¹⁾ по 1/2—1/3 стакана для полоскания при ларингите и ангине.

ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РТА И ГОРЛА

1. Дуб обыкновенный (кора) — 70 г, липа сердцевидная (цветки) — 30 г.

Применять в виде настоя¹⁾ для полоскания рта и горла при воспалительных процессах.

2. Липа сердцевидная (цветки) — 40 г, ромашка аптечная (цветки) — 60 г.

Применять в виде настоя¹⁾ для полоскания рта и горла при воспалительных процессах.

3. Дуб обыкновенный (кора) — 50 г, душица обыкновенная (трава) — 40 г, алтей лекарственный (корень) — 10 г.

Применять в виде настоя для полоскания рта и горла при воспалительных процессах.

4. Шалфей лекарственный (листья) — 25 г, зверобой продырявленный (трава) — 25 г, бузина черная (цветки) — 25 г, дуб обыкновенный (кора) — 25 г.

Применять в виде настоя¹⁾ для полоскания рта и горла при воспалительных процессах.

5. Шалфей лекарственный (листья) — 35 г, алтей лекарственный — 30 г, бузина черная (цветки) — 35 г.

Применять в виде настоя¹⁾ для полоскания горла как смягчительное средство.

6. Алтей лекарственный (корень) — 20 г, ромашка лекарственная (цветки) — 20 г, аир болотный (корень) — 10 г, донник лекарственный (трава) — 20 г, льняное семя — 30 г.

Применять в виде теплого настоя¹⁾ для полоскания рта и горла при воспалении слизистых оболочек как смягчительное средство.

ПОТОГОННЫЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ

1. Малина обыкновенная (ягоды) — 15 г, липа сердцевидная (цветки) — 15 г, череда трехраздельная (трава) — 15 г, душица обыкновенная (трава) — 15 г, первоцвет весенний (трава и корни) — 10 г, лопух большой (корни) — 20 г, бузина черная (цветки) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя 3—4 раза в день после еды в горячем виде в качестве жаропонижающего и потогонного средства.

2. а) Липа (соцветия) — 20 г, малина обыкновенная (плоды) — 20 г.

б) Малина обыкновенная (плоды) — 20 г, мать-и-мачеха (листья) — 20 г, душица обыкновенная (трава) — 10 г.

а) Ива (кора) — 20 г, мать-и-мачеха (листья) — 20 г, душица (трава) — 10 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 столовые ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 10 минут, процедить через марлю и пить отвар-настой горячим при ревматизме и гриппозных состояниях.

ГРУДНЫЕ СБОРЫ

1. Алтей (корень) — 20 г, мать-и-мачеха (листья) — 20 г, душица обыкновенная (трава) — 10 г.

2. Солодка (корень) — 30 г, подорожник — 30 г, мать-и-мачеха (листья) — 40 г.

Все травы смешать, мелко измельчить, взять 2 столовые ложки смеси, залить 500 мл крутого кипятка. Настаивать 20 мин., укутав, пить по полстакана 3 раза в день после еды и обязательно на ночь. Курс лечения 10-12 дней.

3. а) Сосна (почки) — 20 г, алтей (корень) — 20 г, анис (плоды) — 20 г, шалфей (листья) — 20 г, солодка (корень) — 20 г.

б) Алтей (корень) — 20 г, солодка (корень) — 20 г, фенхель (плоды) — 10 г.

Способ употребления: Столовую ложку сбора заварить в стакане горячей воды, настоять 20-30 минут, процедить и принимать по столовой ложке 3-6 раз в день.

4. Алтей (корень) — 20 г, солодка (корень) — 20 г, укроп (плоды) — 10 г.

Способ употребления: столовую ложку сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать по 1/4 стакана через 3 часа как отхаркивающее средство.

ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Валериана лекарственная (корень) — 25 г, пустырник пятилопастный (травы) — 25 г, тмин обыкновенный (плоды) — 25 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 25 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя 3 раза в день при нервном возбуждении и учащенном сердцебиении.

2. Аралыя маньчжурская (корни) — 15 г, левзея сафлоровидная (корни) — 15 г, боярышник кроваво-красный (плоды) — 15 г, шиповник коричный (плоды) — 15 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, череда трехраздельная (травы) — 10 г, рабина черноплодная (плоды) — 10 г, подорожник большой (листья) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя 3 раза в день в качестве тонизирующего и иммуностимулирующего средства.

3. Мята перечная (листья) — 30 г, пустырник пятилопастный (травы) — 30 г, валериана лекарственная (корень) — 20 г, хмель обыкновенный (шишки) — 20 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день при нервном возбуждении, раздражительности, бессоннице.

4. Родиола розовая (корни) — 20 г, заманиха высокая (корни) — 20 г, шиповник коричный (плоды) — 20 г, крапива двудомная (травы) — 20 г, боярышник кроваво-красный (плоды) — 15 г, зверобой продырявленный (травы) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ 2—3 раза в день в качестве тонизирующего и повышающего иммунорезистентность средства.

5. Валериана лекарственная (корень) — 30 г, мята перечная (листья) — 30 г, вахта трехлистная (листья) — 40 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя¹⁾ 2 раза в день при первом возбуждении и раздражительности.

6. Хвощ полевой (травы) — 20 г, горец птичий (травы) — 30 г, боярышник кроваво-красный (цветки) — 50 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день при учащенном сердцебиении, раздражительности, бессоннице.

7. Валериана лекарственная (корень) — 30 г, пустырник пятилопастный (листья) — 30 г, тысячелистник обыкновенный (травы) — 20 г, анис обыкновенный (плоды) — 20 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ по 1/3—1/4 стакана 2—3 раза в день при болях в сердце.

8. Бузина черная (цветки) — 25 г, ромашка аптечная (цветки) — 25 г, липа сердцевидная (цветки) — 25 г, мята перечная (травы) — 25 г.

Принимать в виде горячего настоя¹⁾ по 1 стакану 2—3 раза в день в качестве мочегонного и потогонного средства.

9. Шиповник коричный (плоды) — 45 г, брусника обыкновенная (плоды) — 15 г, крапива двудомная (листья) — 40 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день в качестве витаминного средства.

10. Шиповник корачный (плоды) — 30 г, смородина черная (плоды) — 10 г, крапива двудомная (листья) — 30 г, морковь посевная (корень) — 30 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день в качестве витаминного средства.

11. Мята перечная (листья) — 20 г, полынь горькая (травы) — 20 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г, липа сердцевидная (цветки) — 20 г, крушина ольховая (кора) — 20 г.

Принимать по 1 стакану настоя¹⁾ утром и вечером при климактерическом неврозе.

12. Лапчатка гусиная (травы) — 25 г, чистотел большой (травы) — 25 г, тысячелистник обыкновенный (травы) — 25 г, ромашка аптечная (цветки) — 25 г.

Принимать по 1/2-1/3 стакана настоя¹⁾ в день небольшими глотками при климактерическом неврозе.

13. Ландыш майский (цветки) — 10 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г, мята перечная (листья) — 30 г, валериана лекарственная (корень) — 40 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ в 3 приема в течение дня по 1/3-1/4 стакана при миокардите.

14. Валериана лекарственная (корень) — 20 г, ромашка аптечная (цветки) — 30 г, тмин обыкновенный (плоды) — 50 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя¹⁾ 2 раза в день при нервном возбуждении, раздражительности, бессоннице.

15. Ромашка аптечная (цветки) — 20 г, мята перечная (листья) — 20 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г, валериана лекарственная (корень) — 20 г, тмин обыкновенный (плоды) — 20 г.

Принимать в виде отвара²⁾ утром по 1-2 стакана, вечером по 1 стакану при бессоннице.

16. Тмин обыкновенный (плоды) — 20 г, барвинок малый (листья) — 10 г, валериана лекарственная (корень) — 20 г, боярышник кроваво-красный (цветки) — 20 г, омела белая (травы) — 30 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ в течение дня в несколько приемов при нейроциркулярной дистонии по гипертоническому типу.

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

1. Шиповник коричный (плоды) — 15 г, сушеница болотная (травы) — 10 г, береза повислая (листья) — 10 г, мята перечная (травы) — 10 г, морковь посевная (плоды) — 10 г, элутерококк колючий (корень) — 15 г, кассия остролистная (плоды и листья) — 10 г, почечный чай (травы) — 10 г, лопух большой (корни) — 10 г.

Принимать в виде настоя¹¹ по 1/3—1/2 стакана 3 раза в день при атеросклерозе.

2. Морская капуста — 10 г, боярышник кроваво-красный (плоды) — 15 г, рябина черноплодная (плоды) — 15 г, брусника обыкновенная (листья) — 10 г, череда трехраздельная (травы) — 10 г, пустырник обыкновенный (травы) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, кукурузные столбики с рыльцами — 10 г, крушина ломкая (кора) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя после еды 3 раза в день при атеросклерозе.

ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

1. Шлемник байкальский (корни) — 20 г, пустырник обыкновенный (травы) — 15 г, мята перечная (травы) — 10 г, сушеница болотная (травы) — 15 г, шиповник коричный (плоды) — 15 г, почечный чай (травы) — 15 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г.

Принимать в виде настоя¹¹ по 1/3—1/4 стакана 3 раза в день при гипертонической болезни I и II стадий.

2. Рябина черноплодная (плоды) — 15 г, морковь посевная (плоды) — 10 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, валериана лекарственная (корень) — 15 г, квощ полевой (травы) — 10 г, василек синий (цветки) — 10 г, боярышник кроваво-красный (плоды) — 15 г, шлемник байкальский (корни) — 15 г.

Принимать в виде настоя¹¹ по 1/4—1/3 стакана 3 раза в день при гипертонической болезни I и II стадий.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ

1. Мята перечная (листья) — 20 г, вахта трехлистная (листья) — 20 г, валериана (корень) — 10 г, хмель (шишки) — 10 г.

Способ употребления: 2 столовые ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать 2 раза в день утром и на ночь 1/2 стакана при состоянии нервного возбуждения и раздражительности.

2. Валериана (корень) — 10 г, мята (листья) — 20 г, трилистник (листья) — 20 г, хмель (шишки) — 10 г.

1 столовую ложку этой смеси заливают 2 стаканами кипящей воды, настаивают 30 минут, процеживают и принимают по 1/2 стакана 2 раза в день. Принимают как успокоительный чай.

ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ГАСТРИТАХ, КИШЕЧНЫХ КОЛИКАХ, ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ

1. Подорожник большой (листья) — 20 г, мята перечная (травы) — 10 г, зверобой продырявленный (травы) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, одуванчик

лекарственный (корень) — 10 г, шалфей лекарственный (трава) — 10 г, аир болотный (корень) — 10 г, вахта трехлистная (листья) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день за 30 минут до еды при хронических гипацидных и анацидных гастритах.

2. Ромашка аптечная (цветки) — 20 г, календула лекарственная (цветки) — 20 г, подорожник большой (листья) — 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 20 г, череда трехраздельная (трава) — 20 г.

Принимать по 1/2—1/3 стакана настоя¹⁾ 3—5 раз в день при острых гастритах наряду с промыванием желудка дезинфицирующими растворами.

3. Алтей лекарственный (корни) — 10 г, солодка голая (корни) — 10 г, ольха серая (соплодия) — 10 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 10 г, сушеница болотная (трава) — 10 г, девясил аысокий (корни) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, черника аптечная (цветки) — 10 г.

Принимать по 1/2-1/3 стакана настоя за 30 минут до еды 3 раза в день при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с нормо- и гиперсекрецией.

4. Подорожник большой (лист) — 10 г, полынь горькая (трава) — 10 г, мята персчаная (трава) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, зверобой продырявленный (трава) — 10 г, аир обыкновенный (корни) — 10 г. Шалфей лекарственный (трава) — 10 г, одуванчик лекарственный (корни) — 10 г, аралия маньчжурская (корни) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ за 30 минут до еды 3 раза в день при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с пониженной желудочной секрецией.

5. Алтей лекарственный (корень) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, солодка голая (корень) — 10 г, зверобой продырявленный (трава) — 10 г, бессмертник песчаный (цветки) — 10 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 10 г, дуб обыкновенный (кора) — 10 г, пустырник пятилопастный (трава) — 10 г, сушеница болотная (трава) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день за 30 минут до еды при хронических гастритах с нормо- или гиперсекрецией.

6. Чистотел большой (трава) — 10 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 30 г, ромашка аптечная (цветки) — 30 г, зверобой продырявленный (трава) — 30 г.

Принимать по 2/3 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день за 30 минут до еды при повышенной кислотности желудочного сока.

7. Аир болотный (корневище) — 20 г, вахта трехлистная (листья) — 20 г, золототысячник малый (трава) — 20 г, кожура апельсина — 20 г, полынь горькая (трава) — 20 г.

Принимать по 1/2—1/3 стакана отвара²⁾ 3 раза в день при атрофическом гастрите.

8. Валериана лекарственная (корень) — 5 г, аир болотный (корневище) — 10 г, вахта трехлистная (листья) — 10 г, золототысячник малый (трава) — 10 г, тмин обыкновенный (плоды) — 10 г, анис обыкновенный (плоды) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, мята персчаная (листья) — 15 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 20 г.

Принимают внутрь по 1/3—1/2 стакана отвара²⁾ на один прием в горячем виде за 1/2 часа до еды при гастритах, язвенной болезни.

9. Липа сердцевидная (цветки) — 10 г, льняное семя — 20 г, солодка голая (корень) — 20 г, аир болотный (корневище) — 20 г, мята перечная (листья) — 10 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г.

Принимают по 2/3—3/4 стакана отвара²⁾ 3 раза в день за 30 минут до еды при повышенной кислотности желудочного сока.

10. Фенхель обыкновенный (плоды) — 25 г, алтей лекарственный (корни) — 25 г, ромашка аптечная (цветки) — 25 г, солодка голая (корень) — 25 г.

Принимать по 1/2—2/3 стакана отвара²⁾ 3 раза в день за 30 минут до еды при хроническом гастрите.

11. Чистотел большой (трава) — 10 г, алтей лекарственный (корень) — 30 г, солодка голая (корень) — 30 г, окопник лекарственный (корень) — 30 г.

Принимать по 2/3—3/4 стакана отвара²⁾ 3 раза в день до еды при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

12. Вахта трехлистная (листья) — 20 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г, мята перечная (трава) — 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 20 г, золототысячник малый (трава) — 20 г.

Принимать по 1/2 стакана отвара²⁾ за 30 минут до еды при гиперацидных состояниях.

13. Фенхель обыкновенный (плоды) — 30 г, ромашка аптечная (цветки) — 30 г, липа сердцевидная (цветки) — 40 г.

Принимать по 1/2—2/3 стакана настоя¹⁾ 2—3 раза в день до еды при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

14. Золототысячник малый (трава) — 20 г, мята перечная (листья) — 80 г.

Принимать по 1/2—2/3 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день за 30 минут до еды при гастрите.

15. Аир обыкновенный (плоды) — 20 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г, тмин обыкновенный (плоды) — 20 г, мята перечная (листья) — 40 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ глотками за 30 мин до еды 3 раза в день при спазмах желудка и метеоризме.

16. Кровохлебка лекарственная (корни) — 10 г, черемуха обыкновенная (плоды) — 10 г, ольха серая (соплодия) — 10 г, мята перечная (трава) — 10 г, тмин обыкновенный (плоды) — 10 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, солодка голая (корни) — 10 г, горец змеинный (корневище) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, зверобой продырявленный (трава) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день за 10 мин. до еды при хронических энтеритах.

17. Ромашка аптечная (цветки) — 10 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, тмин обыкновенный (плоды) — 10 г, ольха серая (соплодия) — 10 г, мята перечная (трава) — 10 г, алтей лекарственный (корень) — 10 г, зверобой продырявленный (трава) — 10 г, подорожник большой (лист) — 10 г, бессмертник песчаный (цветки) — 10 г, кассия остролистная (листья и плоды) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день до еды при хронических спастических колитах.

18. Сушеница болотная (трава) — 10 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, зверобой продырявленный (трава) — 10 г, ольха серая (соплодия) — 10 г, мята перечная (трава) — 10 г, подорожник большой (лист) — 10 г, алтей лекарственный (корень) — 10 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 10 г, тмин обыкновенный (плоды) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день до еды при хронических неспецифических язвенных колитах.

19. Фенхель обыкновенный (плоды) — 15 г, аир болотный (корневища) — 15 г, валериана лекарственная (корень) — 20 г, мята перечная (листья) — 20 г, ромашка аптечная (цветки) — 30 г.

Принимать в виде теплого настоя¹⁾ по 1/2—3/4 стакана 3 раза в день после еды при метеоризме и спазмах кишечника.

20. Можжевельник обыкновенный (плоды) — 10 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г, тмин обыкновенный (плоды) — 20 г, ромашка аптечная (цветки) — 25 г, мята перечная (листья) — 25 г.

Принимать в виде теплого настоя¹⁾ по 1/2—3/4 стакана 2 раза в день после еды утром и вечером при спастических состояниях кишечника.

21. Валериана лекарственная (корень) — 10 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, мята перечная (листья) — 20 г, ромашка аптечная (цветки) — 60 г.

Принимать по 1/2—3/4 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день после еды при спастических состояниях кишечника и чувства тяжести в области желудка.

22. Анис обыкновенный (плоды) — 10 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, мята перечная (листья) — 20 г, ромашка аптечная (цветки) — 30 г, крушина ольховидная (кора) — 30 г.

Принимать по 1/2—3/4 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день после еды при кишечных коликах.

23. Полынь горькая (трава) — 20 г, хвощ полевой (трава) — 30 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 30 г, лапчатка прямостоячая (корневища) — 20 г.

Принимать по 1/2—2/3 стакана отвара²⁾ 3 раза в день при метеоризме и склонности к поносам.

ЖЕЛУДОЧНЫЕ СБОРЫ

1. Крушина (кора) — 20 г, крапива перечная (листья) — 20 г, крапива (листья) — 30 г, аир (корневища) — 10 г, валериана (корень) — 10 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 столовые ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настоять 20 минут, процедить через марлю и принимать по 1/2 стакана утром и вечером.

2. Крушина (кора) — 20 г, анис (плоды) — 20 г, тысячелистник (трава) — 10 г, горчичник (семя) — 20 г, солодховый корень — 30 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 чайные ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать по 1/2 стакана утром и вечером.

3. Черника (ягоды) — 20 г, лапчатка (корневища) — 10 г, бес-

смертник (цветы) — 10 г, шалфей (листья) — 30 г, тмин (плоды) — 10 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 столовые ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 мин, процедить по охлаждению через марлю и принимать 3 раза в день по 1/2 стакана за 15—20 мин до еды.

4. а) Черемуха (плоды) — 30 г, черника (плоды) — 20 г,

б) ольха (шишки) — 20 г, змеевик (корневище) — 10 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: столовую ложку сбора заварить стаканом горячей воды, кипятить 10 минут, остудить, процедить и пить по 1/2 стакана 3—4 раза в день.

СБОРЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИШЕЧНИКА

1. Аир болотный (корневище) — 10 г, крушина ольховидная (кора) — 30 г, мята перечная (листья) — 20 г, крапива двудомная (листья) — 20 г, одуванчик лекарственный (корень) 10 г, валериана лекарственная (корень) — 10 г.

Принимать по 1/2 стакана отвара²⁾ 2 раза в день утром и вечером как средство, регулирующее деятельность кишечника.

2. Крушина ольховидная (кора) — 30 г, мята перечная (листья) — 20 г, крапива двудомная (листья) — 30 г, аир болотный (корневище) — 10 г, валериана лекарственная (корень) — 10 г.

Принимать по 1/2 стакана отвара²⁾ 2 раза в день утром и вечером как желудочное средство, регулирующее деятельность кишечника.

3. Крушина ольховидная (кора) — 20 г, анис обыкновенный (плоды) — 20 г, тысячелистник обыкновенный (травы) — 10 г, горчица сарептская (семена) — 20 г, солодка голая (корень) — 30 г.

Принимать по 1/2 стакана отвара²⁾ 2 раза в день утром и вечером как средство, регулирующее деятельность кишечника.

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ ПРИ ЗАПОРАХ

1. а) Крушина ольховидная (кора) — 30 г, тысячелистник обыкновенный (травы) — 10 г, крапива двудомная (листья) — 20 г,

б) сенна (листья) — 30 г, крушина (кора) — 20 г, жостер (плоды) — 20 г, анис (плоды) — 30 г, солодка (корень) — 30 г,

в) крушина (кора) — 40 г, солодка (корень) — 5 г, кориандр (плоды) — 5 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: столовую ложку сбора заваривать в стакане кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать по 1/2—3/4 стакана на ночь, при запорах.

2. Бузина черная (цветки) — 50 г, жостер слабительный (плоды) — 50 г.

Принимать по 1 стакану отвара²⁾ 2 раза в день после еды утром и вечером при запорах.

3. Крушина ольховидная (кора) — 50 г, бузина черная (цветки) — 20 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г, анис обыкновенный (плоды) — 10 г.

Принимать по 1 стакану настоя¹⁾ после еды при запорак.

4. Крушина ольковидная (кора) — 60 г, анис обыкновенный (плоды) — 10 г, фенкель обыкновенный (плоды) — 10 г, солодка голая (корень) — 20 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ 2 раза в день после еды при запорак.

5. Крушина ольховидная (кора) — 15 г, солодка голая (корень) — 15 г, фенкель обыкновенный (плоды) — 15 г, алтей лекарственный (корень) — 25 г, льняное семя (истолчено) — 30 г.

Принимать по 1/2—2/3 стакана настоя¹⁾ 1 раз в день после еды вечером при запорак, связанный с атонией кишечника.

ПРИ ПОНОСАХ

1. Щавель конский (корень) — 50 г, горец змеинный (корневище) — 50 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день при поносах.

2. Черемука обыкновенная (плоды) — 60 г, черника обыкновенная (плоды) — 40 г.

Принимать по 1/4—1/2 стакана отвара²⁾ 3—4 раза в день при поносах.

3. Оля серая (соплодия) — 70 г, горец змеинный (корневище) — 30 г.

Принимать по 1/4—1/2 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день при поносах.

4. Лапчатка (корневище) — 10 г, змеевик (корневище) — 40 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 чайные ложки заваривать в стакане кипятка, настаивать 30 минут, процедить и выпить в течение дня в 3—4 приема.

5. Змеевик (корневище) — 30 г, кровохлебка (корневище) — 30 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 чайные ложки заварить в стакане кипятка, настаивать 30 минут, процедить и выпить в течение дня в 3—4 приема.

6. Конский щавель (корень) — 25 г, змеевик (корневище) — 25 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 чайные ложки заварить в стакане кипятка, настаивать 30 минут, процедить и выпить в течение дня в 3—4 приема.

7. Черника обыкновенная (плоды) — 25 г, лапчатка прямостоячая (корневище) — 12,5 г, бессмертник песчаный (цветки) — 12,5 г, шалфей лекарственный (листья) — 37,5 г, тимьян обыкновенный (плоды) — 12,5 г.

Принимать по 1/2 стакана отвара²⁾ 3—4 раза в день за 15 мин до еды при поносах.

8. Лапчатка прямостоячая (корневище) — 20 г, горец змеинный (корневище) — 80 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день при поносах.

9. Горец змеинный (корневище) — 50 г, кровохлебка лекарственная (корневище) — 50 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день при поносах.

10. Черемука (плоды) — 30 г, черника (ягоды) — 20 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 столовые ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать, остудив, 3 раза в день по 1/4—1/2 стакана.

11. Ольха серая (шишки) — 40 г, змеевик (корневище) — 20 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 чайные ложки сбора заварить в стакане кипятка как чай, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать в течение дня 3—4 раза.

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

1. Календула лекарственная (цветки) — 20 г, крапива двудомная (трава) — 10 г, стальник полевой (корень) — 15 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 20 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, хвощ полевой (трава) — 10 г, береза повислая (листья) — 15 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день как мочегонное и противовоспалительное средство при хронических воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

2. Хвощ полевой (трава) — 30 г, лапчатка прямостоячая (корневище) — 30 г, подорожник большой (листья) — 40 г.

Принимать по 2/3—3/4 стакана настоя¹⁾ на ночь в теплом виде при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

3. Бузина черная (цветки) — 25 г, зверобой продырявленный (трава) — 25 г, ромашка аптечная (цветки) — 25 г, липа сердцевидная (цветки) — 25 г.

Принимать по 1—2 стакана настоя¹⁾ в теплом виде на ночь при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

4. Береза повислая (листья) — 15 г, брусника обыкновенная (листья) — 15 г, почечный чай (трава) — 10 г, солодка голая (корень) — 15 г, зверобой продырявленный (трава) — 15 г, ромашка аптечная (цветки) — 15 г, календула лекарственная (цветки) — 15 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.

5. Шиповник коричный (плоды) — 25 г, стальник полевой (корень) — 25 г, адонис весенний (трава) — 25 г, можжевельник обыкновенный (плоды) — 25 г.

Принимать по 1/2—1/3 стакана настоя¹⁾ в теплом виде 3 раза в день в качестве диуретического и противовоспалительного средства.

ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

1. Можжевельник обыкновенный (плоды) — 60 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 20 г, солодка голая (корень) — 20 г.

Принимать по 1/2—1/4 стакана отвара²⁾ 3 раза в день как мочегонное средство. Противопоказан при беременности и острых воспалительных процессах в почках и мочевыводящих путях.

2. Стальник полевой (корень) — 25 г, петрушка огородная (корень) — 25 г, солодка голая (корень) — 25 г, можжевельник обыкновенный (плоды) — 25 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана отвара²⁾ 3 раза в день как мочегонное средство. Противопоказан при беременности и острых воспалительных процессах в почках и мочевыводящих путях.

3. Фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, бузина черная (цветки) — 10 г, тмин обыкновенный (плоды) — 10 г, адонис весенний (трава) — 10 г, петрушка огородная (плоды) — 30 г, можжевельник обыкновенный (плоды) — 30 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день как мочегонное средство. Противопоказан при беременности и острых воспалительных процессах в почках и мочевыводящих путях.

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ И ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

1. Почечный чай (трава) — 15 г, подорожник большой (листья) — 15 г, хвощ полевой (трава) — 10 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 10 г, календула лекарственная (цветки) — 20 г, череда трехраздельная (трава) — 15 г, шиповник хoryчный (плоды) 15 г.

Принимать по 1/4—1/3 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день при хроническом гломерулонефрите.

2. Почечный чай (трава) — 15 г, подорожник большой (листья) — 15 г, хвощ полевой (трава) — 10 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 15 г, крапива двудомная (листья) — 15 г, календула лекарственная (цветки) — 15 г, череда трехраздельная (трава) — 15 г.

Принимать по 1/4—1/3 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день при гематурической форме хронического гломерулонефрита.

3. Почечный чай (трава) — 20 г, толокнянка обыкновенная (листья) — 10 г, хвощ полевой (трава) — 10 г, солодка голая (корень) — 15 г, календула лекарственная (цветки) — 15 г, ромашка аптечная (цветки) — 15 г, подорожник большой (листья) — 15 г.

Принимать по 1/4—1/3 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день при хроническом пиелонефрите.

4. Льняное семя — 40 г, стальник полевой (корень) — 30 г, береза повислая (листья) — 30 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ в несколько приемов в течение дня при пиелонефрите.

5. Земляника лесная (листья) — 10 г, крапива двудомная (листья) — 20 г, береза повислая (листья) — 20 г, льняное семя — 50 г.

Принимать по 1—2 стакана настоя¹⁾ в теплом виде в несколько приемов в течение дня при пиелонефрите.

ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

1. Анис обыкновенный (плоды) — 10 г, петрушка огородная (трава) — 20 г, пастушья сумка (трава) — 10 г, можжевельник обыкновенный

(плоды) — 15 г, толокнянка обыкновенная (листья) — 15 г, стальник полевой (корень) — 15 г, одуванчик лекарственный (корень) — 15 г.

Принимать по 1/2—1/3 стакана отвара²⁾ в теплом виде 2—3 раза в день при мочекаменной болезни.

2. Шиповник коричный (плоды) — 20 г, можжевельник обыкновенный (плоды) — 20 г, береза повислая (листья) — 20 г, марена красильная (корень) — 40 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ глотками 3 раза в день как мочегонное средство при мочекаменной болезни.

3. Марена красильная (корень) — 20 г, стальник полевой (травы) — 15 г, береза повислая (листья) — 10 г, почечный чай (травы) — 15 г, хвощ полевой (травы) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 15 г, укроп огородный (семена) — 15 г.

Принимать по 1/2—2/3 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день при мочекаменной болезни.

4. Крапива двудомная (листья) — 20 г, аир болотный (корневище) — 15 г, мята перечная (листья) — 10 г, хвощ полевой (травы) — 15 г, бузина черная (цветки) — 10 г, можжевельник обыкновенный (плоды) — 15 г, шиповник коричный (плоды) — 15 г.

Принимать по 1/2—1/3 стакана отвара²⁾ в теплом виде 2—3 раза в день при мочекаменной болезни.

5. Марена красильная (корень) — 30 г, стальник полевой (корень) — 20 г, льняное семя — 50 г.

Принимать по 1 стакану настоя¹⁾ в теплом виде на ночь при мочекаменной болезни.

6. Береза повислая (листья) — 20 г, стальник полевой (корень) — 20 г, можжевельник обыкновенный (плоды) — 20 г, чистотел большой (травы) — 20 г, лапчатка прямостоячая (травы) — 20 г.

Принимать по 1 стакану настоя¹⁾ в теплом виде на ночь при камнях в мочевом пузыре и в мочеточнике.

ПРИ ГЕПАТИТАХ И ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ

1. Фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, тмин обыкновенный (плоды) — 10 г, крушина ольховидная (кора) — 20 г, мята перечная (листья) — 20 г, тысячелистник обыкновенный (травы) — 20 г, золототысячник малый (травы) — 20 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день за 30 мин до еды в качестве средства, регулирующего стул при гепатитах.

2. Крушина ольховидная (кора) — 20 г, вахта трехлистная (листья) — 15 г, горечавка желтая (корни) — 15 г, чистотел большой (травы) — 15 г, одуванчик лекарственный (корни) — 20 г, мята перечная (листья) — 15 г.

Принимать по 1/2—3/4 стакана отвара²⁾ 3 раза в день за 30 мин до еды для поддержания регулярного стула при гепатитах.

3. Зверобой продырявленный (травы) — 10 г, пижма обыкновенная (цветки) — 10 г, тысячелистник обыкновенный (травы) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, лопух большой (корни) — 10 г, шиповник ко-

ричный (плоды) — 10 г, шалфей лекарственный (трава) — 10 г, девясил высокий (корень) — 10 г, горец птичий (трава) — 10 г, череда трек-раздельная (трава) — 10 г.

Принимать в виде настоя или отвара²⁾ по 1/3—1/2 стакана за 30 мин до еды 3 раза в день при хронических гепатитах и циррозах печени.

ПРИ ХОЛЕЦИСТИТЕ, ХОЛАНГИТЕ

1. Зверобой продырявленный (трава) — 25 г, одуванчик лекарственный (корни) — 15 г, тмин песчаный (цветки) — 15 г, вахта трехлистная (трава) — 15 г, ромашка аптечная (цветки) — 15 г, золототысячник малый (трава) — 15 г.

Принимать по 1 стакану настоя¹⁾ 2 раза в день за 30 мин. до еды при холецистите, холангите.

2. Барбарис обыкновенный (плоды) — 20 г, береза повислая (листья) — 20 г, можжевельник обыкновенный (плоды) — 20 г, полынь горькая (трава) — 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 20 г.

Принимать по 1 стакану настоя¹⁾ 2—3 раза в день за 30 мин. до еды при холецистите, холангите.

3. Бессмертник песчаный (цветки) — 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 20 г, полынь горькая (трава) — 20 г, фенкель обыкновенный (плоды) — 20 г, мята перечная (листья) — 20 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя¹⁾ 4 раза в день за 15 мин. до еды при гепатите, холецистите.

4. Мята перечная (листья) — 20 г, полынь обыкновенная (трава) — 20 г, валериана лекарственная (корни) — 20 г, зверобой продырявленный (трава) — 30 г, хмель обыкновенный (шишки) — 10 г.

Принимать по 1—2 стакана настоя¹⁾ 2—3 раза в день за 30 мин. до еды при холецистите, холангите.

ПРИ ГЕПАТОПАТИЯХ, ХОЛЕЦИСТОПАТИЯХ

1. Адонис весенний (трава) — 20 г, хвощ полевой (трава) — 30 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 30 г, чистотел большой (трава) — 20 г.

Принимать по 1/2 стакана отвара²⁾ 2 раза в день за 30 мин. до еды при гепатопатиях с нарушением кровообращения и отеками.

2. Вахта трехлистная (листья) — 20 г, горечавка желтая (корни) — 20 г, одуванчик лекарственный (корни) — 30 г, мята перечная (листья) — 30 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана отвара²⁾ 3 раза в день за 30 мин до еды при холецистопатиях.

ПРИ ЦИСТИТЕ

1. Береза повислая (листья) — 25 г, толокнянка обыкновенная (листья) — 25 г, кукурузные столбики с рыльцами — 25 г, солодка голая (корень) — 25 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день при цистите, бактериурии.

ПРИ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

1. Бессмертник песчаный (цветки) — 10 г, кукурузные столбики с рыльцами — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, одуванчик лекарственный (корни) — 10 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, полынь горькая (трава) — 10 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, пижма обыкновенная (цветки) — 10 г, мята перечная (трава) — 10 г, чистотел большой (трава) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ за 30 мин. до еды 3 раза в день при желчекаменной болезни и заболеваниях желчевыводящих путей.

ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СБОРЫ

2. Бессмертник (цветы) — 40 г, трилистник (листья) — 30 г, мята перечная (листья) — 20 г, кориандр (плоды) — 10 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 столовые ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 10 минут, процедить через марлю и принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды при желтухе и воспалении желчных путей.

3. Бессмертник песчаный (цветы) — 40 г, вахта трехлистная (листья) — 30 г, мята перечная (листья) — 20 г, кориандр (плоды) — 20 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 столовые ложки сбора заварить двумя стаканами кипятка, настоять 20 минут и пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 20—30 минут до еды.

4. Мята перечная (листья) — 10 г, полынь горькая (трава) — 10 г, бессмертник песчаный (цветки) — 20 г, крушина ольховидная (кора) — 10 г, одуванчик лекарственный (корни) — 10 г, марена красильная (корни) — 40 г.

Принимать по 1/2—3/4 стакана отвара²⁾ за 30 мин. до еды 3 раза в день как желчегонное средство при желчекаменной болезни.

5. Крушина ольховидная (кора) — 10 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 10 г, бессмертник песчаный (цветки) — 20 г, мята перечная (листья) — 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 20 г, полынь горькая (трава) — 20 г.

Принимать по 1 стакану отвара²⁾ 2—3 раза в день за 30 минут до еды при желчекаменной болезни.

6. Тмин обыкновенный (плоды) — 20 г, крушина ольховидная (кора) — 20 г, дягиль лекарственный (корни) — 20 г, мята перечная (листья) — 20 г, шалфей лекарственный (листья) — 20 г.

Принимать по 1/2—1/3 стакана отвара²⁾ 3 раза в день за 30 минут до еды при желчекаменной болезни.

7. Чистотел большой (трава) — 10 г, одуванчик лекарственный (корни)

— 20 г, горец птичий (трава) — 15 г, кукурузные рыльца — 15 г, зверобой продырявленный (трава) — 20 г, фиалка трехцветная (трава) — 10 г, анис обыкновенный (плоды) — 10 г.

Принимать по 1/4—1/3 стакана отвара²⁾ 3 раза в день за 30 минут до еды при желчекаменной болезни.

8. Бессмертник песчаный (цветки) — 30 г, ревень тангутский (корни) — 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 50 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ 1 раз в сутки на ночь по 2/3—3/4 стакана при желчекаменной болезни.

ЖЕЛЧЕГОННОЕ ПРИ ЖЕЛТУХЕ

1. Бессмертник песчаный (цветки) — 40 г, вахта трехлистная (листья) — 30 г, мята перечная (листья) — 20 г, кориандр посевной (плоды) — 10 г.

Принимать по 1/2—1/3 стакана отвара²⁾ 3 раза в день за 30 минут до еды в качестве желчегонного средства при желтухе.

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

1. Лопух большой (корни) — 10 г, полынь горькая (трава) — 10 г, девясил высокий (корни) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, зверобой продырявленный (трава) — 10 г, сушеница болотная (трава) — 10 г, хвощ полсвой (трава) — 10 г, череда трехраздельная (трава) — 10 г, шалфей лекарственный (трава) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ за 30 мин. до еды 3 раза в день при хроническом панкреатите.

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

1. Листья подорожника большого — 20 г, листья черники — 20 г, листья крапивы двудомной — 20 г, листья одуванчика лекарственного — 20 г.

Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, кипятить 2—3 минуты, настоять 10—15 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана за 20 минут до еды 3—4 раза в день.

2. Листья одуванчика лекарственного — 20 г, листья цикория обыкновенного — 20 г, крапива двудомная — 20 г, трава галеги лекарственной — 20 г, листья ореха грецкого — 20 г.

Столовую ложку сбора залить 2 стаканами воды (400 мл), кипятить 2—3 минуты, настоять 5—10 минут, процедить. Принимать по 3 столовые ложки 3 раза в день за 15—20 минут до еды.

3. Трава галеги лекарственной — 25 г, стручки фасоли — 25 г, листья черники — 25 г, корень одуванчика — 25 г, листья крапивы — 25 г.

Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, настоять 30 минут, принимать 3—4 раза в день по 1 стакану настоя перед едой.

4. Листья брусники — 20 г, листья черники — 20 г, трава галеги лекарственной — 20 г, кора крушины — 10 г, листья березы — 10 г.

Кору крушины измельчить и кипятить 20 минут, а остальные части сбора залить 300 мл кипятка, кипятить 3 минуты, затем смешать, принимать по 1/3 стакана 2—3 раза в день перед едой.

5. Листья черники — 20 г, листья брусники — 20 г, листья одуванчика лекарственного — 20 г, трава галеги лекарственной — 25 г, крапива двудомная — 20 г.

Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, прокипятить 5 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2—3 раза в день за 20 мин. до еды.

6. Листья земляники — 15 г, листья цикория обыкновенного — 20 г, трава горца птичьего — 10 г, листья одуванчика — 15 г.

Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, кипятить 3—5 минут, настоять в течение часа, процедить. Принимать по 1/3 стакана в день до еды.

7. Заманиха высокая (корни) — 10 г, хвощ полевой (травы) — 10 г, шиповник коричный (плоды) — 10 г, череда трехраздельная (травы) — 10 г, девясил высокий (корни) — 10 г, черника обыкновенная (листья) — 20 г, зверобой продырявленный (травы) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, мята перечная (травы) — 10 г.

Принимать по 1/3 стакана настоя¹⁾ до еды 3 раза в день при сахарном диабете.

8. Листья одуванчика — 20 г, листья ежевики — 10 г, листья мяты перечной — 5 г, листья смородины черной — 15 г.

Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, кипятить 5 минут, настоять в течение часа, процедить. Принимать по 2—3 столовые ложки 3 раза в день перед едой.

9. Кукурузные рыльца — 10 г, цветки бессмертника — 5 г, листья черники — 5 г, измельченные плоды шиповника — 10 г.

Столовую ложку сбора залить 300 г кипятка, кипятить 3—5 минут, настоять 1 час, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды.

10. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте лекарственных растений разработан сбор лекарственных трав под названием "афразепиен", который разрешен к применению в нашей стране с 1986 г. Сбор состоит из семи лекарственных растений.

Побеги черники — 20 г, створки фасоли — 20 г, корни аралии маньчжурской — 10 г, хвощ полевой — 15 г, плоды шиповника — 15 г, трава зверобоя — 10 г, цветки ромашки — 10 г.

Сбор влияет всесторонне на организм, способствуя снижению сахара крови, улучшению гликогеннообразовательной функции печени, а также оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное действие. Афразепиен готовится в виде водного настоя. Согласно инструкции 10 г сбора помещают в эмалированную посуду и заливают 2 стаканами горячей воды (400 мл), затем нагревают на водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре в течение 45—50 минут, процеживают.

Принимают настой по 1/3 стакана 2—3 раза в день за 30 минут до еды

в течение 20—30 дней. Через 10—15 дней курс можно повторить. В течение года можно проводить 3—4 курса. Противопоказаний для применения афразепиена нет.

При постоянном применении лекарственных растений может развиваться привыкание организма, и тогда в некоторой степени активности фитопрепаратов снижается, поэтому рекомендуется делать интервалы между курсами 15—20 дней.

Если больной сахарным диабетом получает лечение только диетой и фитопрепаратами, необходимо тщательно контролировать состояние углеводного обмена, чтобы своевременно предупредить возможное его нарушение (декомпенсация сахарного диабета).

МОЧЕГОННЫЕ И ПОТОГОННЫЕ СБОРЫ

1. Брусника обыкновенная (листья) — 20 г, анис обыкновенный (плоды) — 20 г, мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 20 г, липа сердцевидная (цветки) — 20 г, малина обыкновенная (плоды) — 20 г.

Принимать в виде горячего отвара на ночь по 1/3—1/2 стакана в качестве мочегонного и потогонного средства.

2. Липа сердцевидная (цветки) — 50 г, малина обыкновенная (плоды) — 50 г.

Принимать в виде горячего отвара на ночь по 1 стакану в качестве мочегонного и потогонного средства.

3. Малина обыкновенная (плоды) — 40 г, мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 40 г, душица обыкновенная (травы) — 20 г.

Принимать в виде горячего настоя¹⁾ по 1 стакану на ночь в качестве мочегонного и потогонного средства.

4. Можжевельные ягоды — 20 г, дягиля корень — 20 г, василька цветы — 20 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я : столовую ложку сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 10 мин., процедить через марлю и принимать 3—4 раза в день по одной столовой ложке за 15—20 минут до еды.

5. Береза (листья) — 30 г, хвощ полевой (травы) — 30 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я : 2 столовые ложки сбора заварить двумя стаканами кипятка, остудить, процедить через марлю и принимать по назначению врача.

6. а) Толокнянка (листья) — 20 г, череда (травы) — 10 г, тысячелистник (травы) — 20 г, спорыш (травы) — 20 г;

б) брусника (листья) — 20 г, кукурузные рыльца — 20 г, береза (листья) — 20 г;

в) можжевельник (плоды) — 30 г, хвощ полевой (травы) — 30 г, березовые почки — 30 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я : столовую ложку сбора заварить стаканом кипятка, настоять 20—30 минут, процедить, принимать по 1/2 стакана 3—4 раза в день.

7. Толокнянка обыкновенная (листья) — 30 г, василек синий (цветки) — 10 г, солодка (корень) — 10 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: столовую ложку сбора заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, остудить, процедить через марлю и принимать 3—4 раза в день по одной столовой ложке за 15—20 минут до еды.

8. Толокнянка (листья) — 40 г, солодка (корень) — 10 г, можжевеловые ягоды — 10 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: столовую ложку сбора заварить в стакане кипящей воды, кипятить 10 минут, процедить через марлю и принимать 3—4 раза в день по одной столовой ложке за 15—20 минут до еды.

9. Можжевеловые ягоды — 20 г, хвоща полевого трава — 20 г, пырей корневища — 10 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: столовую ложку сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 10 мин., процедить через марлю и принимать 3—4 раза в день по одной столовой ложке за 15—20 минут до еды.

10. Береза повислая (листья) — 50 г, хвощ полевой (трава) — 50 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя¹⁾ 3—4 раза в день как мочегонное средство.

11. Можжевельник обыкновенный (плоды) — 40 г, дягиль лекарственный (корень) — 30 г, василек синий (цветки) — 30 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ по 1—2 столовых ложки 3—4 раза в день как мочегонное средство.

12. Василек синий (цветки) — 10 г, толокнянка обыкновенная (листья) — 20 г, петрушка огородная (плоды) — 10 г, береза повислая (почки) — 10 г, вахта трехлистная (листья) — 40 г, девясил высокий (корень) — 10 г.

Принимать по 1/2 стакана отвара²⁾ 3 раза в день за 15—20 минут до еды как мочегонное средство.

13. Толокнянка обыкновенная (листья) — 60 г, василек синий (цветки) — 20 г, солодка голая (корень) — 20 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ по 1—3 столовых ложки за 15—20 мин. до еды 3—4 раза в день как мочегонное средство.

14. Можжевельник обыкновенный (плоды) — 40 г, хвощ полевой (трава) — 40 г, береза повислая — 20 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ по 2—3 столовые ложки до еды 3—4 раза в день как мочегонное средство.

15. Береза повислая (листья) — 50 г, шиповник коричный (плоды) — 25 г, стальник полевой (корень) — 25 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день в качестве мочегонного средства при сердечно-сосудистых недостаточностях, асците.

16. Брусника обыкновенная (листья) — 20 г, толокнянка обыкновенная (листья) — 50 г, почечный чай (трава) — 30 г.

Принимать по 1/3—1/4 стакана отвара²⁾ 3—4 раза в день как мочегонное средство.

ВЕТРОГОННЫЕ СБОРЫ

1. Мята перечная (листья) — 20 г, фенхель (плоды) — 10 г, валериана (корень) — 20 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 чайные ложки сбора заварить в стакане кипятка, как чай. После охлаждения принимать утром и вечером по 1/2 стакана в теплом виде.

2. Ромашка (цветы) — 20 г, мята (листья) — 20 г, фенхель (плоды) — 10 г, тмин (плоды) — 10 г, валериана (корень) — 20 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 чайные ложки сбора заварить в стакане кипящей воды, как чай. После охлаждения принимать утром и вечером по одному стакану в теплом виде.

3. Ромашка (цветы) — 40 г, душица (травы) — 40 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 2 чайные ложки сбора заварить в стакане кипящей воды, кипятить 10 минут, процедить через марлю и принимать утром и вечером по одному стакану в теплом виде.

4. Ромашка лекарственная (цветки) — 50 г, тмин обыкновенный (плоды) — 25 г, душица обыкновенная (травы) — 25 г.

Принимать по 1/3 стакана настоя" несколько раз в день в качестве ветрогонного средства.

5. Мята перечная (листья) — 25 г, тмин обыкновенный (плоды) — 25 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 25 г, валериана лекарственная (корень) — 25 г.

Принимать по 1 стакану настоя" утром и вечером в качестве ветрогонного средства.

6. Ромашка аптечная (цветки) — 50 г, валериана лекарственная (корень) — 40 г, тмин обыкновенный (плоды) — 10 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя" утром и вечером в качестве ветрогонного средства.

ПРИ ГЕМОРРОЕ

1. Календула лекарственная (цветки) — 10 г, тысячелистник обыкновенный (травы) — 10 г, девясил высокий (корни) — 15 г, шалфей лекарственный (травы) — 10 г, крапива двудомная (травы) — 15 г, мята перечная (травы) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, пастушья сумка (травы) — 10 г, тополь черный (почки) — 10 г.

Принимать по 1/3 стакана настоя" 3 раза в день до еды при геморрое.

2. Александрийский лист — 20 г, тысячелистник (травы) — 20 г, крушина (кора) — 20 г, кориандр (плоды) — 20 г, солодка (корень) — 20 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: столовую ложку сбора заварить в стакане кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и, остудив, пить на ночь по 1/2 стакана.

3. Дуб обыкновенный (кора) — 30 г, льняное семя — 30 г, ромашка аптечная (цветки) — 40 г.

Принимать по 1/3—3/4 стакана настоя" 3 раза в день после еды при запорак, осложненных геморроем.

4. Кассия остролистная (листья) — 20 г, тысячелистник обыкновенный (травы) — 20 г, крушина ольховидная (кора) — 20 г, кориандр посевной (плоды) — 20 г, солодка голая (корень) — 20 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя" 1 раз в день на ночь в качестве противогеморроидального средства.

5. Зверобой продырявленный (трава) — 15 г, сушеница болотная (трава) — 10 г, стальник полевой (трава) — 15 г, горец почечуйный (трава) — 15 г, подорожник большой (листья) — 15 г, крушина ломкая (кора) — 10 г, хвощ полевой (трава) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г.

Принимать по 1/3 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день до еды при геморрое.

6. Дуб обыкновенный (кора) — 50 г, хвощ полевой (трава) — 30 г, стальник полевой (корень) — 20 г.

Принимать в виде отвара²⁾ для ванн и припарок при геморрое.

СЛАБИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

1. Крушина ольховидная (кора) — 60 г, донник лекарственный (трава) — 20 г, крапива двудомная (листья) — 20 г.

Принимать по 1/2—3/4 стакана настоя¹⁾ на ночь как слабительное средство.

2. Крушина ольховидная (кора) — 50 г, вахта трехлистная (листья) — 20 г, донник лекарственный (трава) — 20 г, тмин обыкновенный (плоды) — 10 г.

Принимать по 1/2—3/4 стакана настоя¹⁾ на ночь как слабительное средство.

3. Крушина ольховидная (кора) — 70 г, солодка голая (корень) — 10 г, кориандр посевной (плоды) — 10 г, тмин обыкновенный (плоды) — 10 г.

Принимать по 1/2—3/4 стакана настоя¹⁾ на ночь как слабительное средство.

4. Крушина ольховидная (кора) — 50 г, вахта трехлистная (листья) — 20 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 20 г, тмин обыкновенный (плоды) — 10 г.

Принимать по 1/2—3/4 стакана настоя¹⁾ на ночь как слабительное средство.

5. Крушина ольховидная (кора) — 50 г, тысячелистник обыкновенный (трава) — 15 г, крапива двудомная (листья) — 35 г.

Принимать по 1/2—3/4 стакана настоя¹⁾ на ночь как слабительное средство.

6. Кассия остролистная (листья) — 30 г, крушина ольховидная (кора) — 30 г, жостер слабительный (плоды) — 20 г, анис обыкновенный (плоды) — 10 г, солодка голая (корень) — 10 г.

Принимать по 1/2—3/4 стакана настоя¹⁾ на ночь как слабительное средство.

ПРИ ПОДАГРЕ

1. Лопух (корни) — 25 г, пырей (корневище) — 20 г, черсда (трава) — 20 г, фиалка трехцветная (трава) — 30 г, вероника лекарственная (трава) — 20 г.

Берут 40 г смеси на 1 л воды и кипятят на малом огне 15 минут (после

закипания). Принимают по 1 стакану 3 раза в день за 30 мин до еды. (Рекомендуют М.А. Носаль и Н.М. Носаль).

ПРИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Хвощ полевой (трава) — 30 г, ромашка аптечная (цветки) — 30 г, зверобой продырявленный (трава) — 40 г.

Принимать внутрь в виде отвара²⁾ по 1/3—1/4 стакана 3 раза в день или использовать для приготовления компрессов при лечении труднозаживающих ран.

2. Календула лекарственная (цветки) — 15 г, подорожник большой (лист) — 15 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, шалфей лекарственный (трава) — 15 г, зверобой продырявленный (трава) — 20 г, девясил высокий (корень) — 15 г, хвощ полевой (трава) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ или отвара 3 раза в день до еды при гнойничковых заболеваниях кожи.

3. Подорожник большой (лист) — 15 г, кориандр посевной (плоды) — 15 г, зверобой продырявленный (трава) — 20 г, череда трехраздельная (трава) — 20 г, сушеница болотная (трава) — 10 г, солодка голая (корень) — 20 г.

Принимать по 1/3 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день после еды при трофических язв на почве тромбофлебита.

4. Ромашка аптечная (цветки) — 35 г, донник лекарственный (трава) — 35 г, алтей лекарственный (листья) — 30 г.

Применять в виде кашеобразной массы, завернутой в ткань; в горячем виде прикладывать к больному месту для припарок в качестве смягчительного средства.

5. Лопух большой (корень) — 30 г, девясил высокий (корень) — 30 г, зверобой продырявленный (трава) — 40 г.

Принимать по 2—3 стакана отвара²⁾ в день для лечения обыкновенных угрей.

6. Крушина ольховидная (кора) — 20 г, береза повислая (листья) — 15 г, фиалка трехцветная (трава) — 15 г, бузина черная (цветки) — 15 г, фенхель обыкновенный (плоды) — 15 г, солодка голая (корень) — 20 г.

Принимать по 1/4—1/3 стакана отвара²⁾ 3 раза в день после еды при кожных сыпях, вызванных хроническими запорами.

7. Крушина ольховидная (трава) — 25 г, крапива двудомная (листья) — 25 г, береза повислая (листья) — 25 г, льняное семя — 25 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана отвара²⁾ 3 раза в день после еды при кожных сыпях, вызванных хроническими запорами.

8. Солодка голая (корень) — 20 г, фенхель (плоды) — 20 г, крушина ольховидная (кора) — 20 г, лопух большой (корень) — 20 г, одуванчик обыкновенный (корень) — 20 г.

Принимать в виде горячего настоя¹⁾ по 1/2—1/3 стакана за 30 мин. до еды 3 раза в день для повышения функции пищеварительных органов и почек при кожных заболеваниях.

9. Солодка голая (корень) — 10 г, лопух большой (корень) — 15 г, одуванчик обыкновенный (корень) — 15 г, череда трехраздельная (трава) — 30 г, марена красильная (корень) — 30 г.

Принимать по 1—2 стакана отвара²⁾ утром для лечения экссудативного диатеза.

10. Крушина ольховидная (кора) — 30 г, солодка голая (корень) — 30 г, фиалка трехцветная (травы) — 40 г.

Принимать по 2 стакана отвара²⁾ в день для лечения экссудативного диатеза.

11. Ромашка аптечная (цветки) — 50 г, донник лекарственный (травы) — 50 г.

Применять в виде кашицеобразной массы, завернутой в ткань; в горячем виде прикладывать к больному месту для припарок как смягчительное средство.

12. Дуб обыкновенный (кора) — 50 г, аир болотный (корневище) — 50 г.

Принимать в виде настоя¹⁾ при приготовлении компрессов и ванн.

13. Ромашка душистая (цветки) — 40 г, донник лекарственный (травы) — 40 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я : 3—5 столовых ложек смеси залить кипятком до образования кашицеобразной массы, завернуть ее в ткань и в горячем виде прикладывать к больному месту, для припарок как смягчительное средство.

ПРИ ЭКЗЕМЕ, ВИТИЛИГО, НЕЙРОДЕРМИТЕ И ПСОРИАЗЕ

1. Шалфей лекарственный (листья) — 10 г, подорожник большой (листья) — 10 г, крапива двудомная (листья) — 10 г, полынь горькая (травы) — 5 г, тысячелистник обыкновенный (травы) — 15 г, зверобой продырявленный (травы) — 15 г, хвощ полевой (травы) — 15 г, кукурузные столбики с рыльцами — 10 г, можжевельник обыкновенный (плоды) — 10 г.

Принимать по 1/4—1/3 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день до еды при экземе.

2. Крапива двудомная (листья) — 10 г, душица обыкновенная (травы) — 10 г, череда трехраздельная (травы) — 15 г, фиалка трехцветная (травы) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, тимьян ползучий (травы) — 10 г, хвощ полевой (травы) — 10 г, валериана лекарственная (корень) — 15 г, солодка голая (корень) — 10 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день до еды при нейродермите и экземе.

3. Зверобой продырявленный (травы) — 20 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, шалфей лекарственный (травы) — 20 г, душица обыкновенная (травы) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, подорожник большой (листья) — 15 г, крапива двудомная (листья) — 15 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ 3 раза в день до еды для лечения витилиго.

4. Череда трехраздельная (травы) — 15 г, бузина черная (цветки) — 10 г, зверобой продырявленный (травы) — 15 г, чистотел большой (травы) — 5 г, девясил высокий (корни) — 10 г, аир обыкновенный (корни) — 15 г,

кукурузные столбики с рыльцами — 10 г, брусника обыкновенная (листья) — 10 г, хвощ полевой (трава) — 10 г.

Принимать по 1/2 стакана настоя¹⁾ утром и вечером после еды при псориазе.

5. Цикорий (корень) — 20 г, одуванчик обыкновенный (корень) — 20 г, вахта трехлистная (листья) — 20 г, фенкель (плоды) — 20 г, крушина ольховидная (кора) — 20 г.

Принимать по 2—3 стакана отвара²⁾ в день для лечения экземы.

ПРИ ОБЛЫСЕНИИ

1. Лопух большой (корни) — 30 г, крапива двудомная (листья) — 70 г.

Применять в виде настоя¹⁾ для мытья головы при облысении.

2. Лопух большой (корни) — 15 г, зверобой продырявленный (трава) — 15 г, череда трехраздельная (трава) — 15 г, бессмертник песчаный (цветки) — 10 г, ромашка аптечная (цветки) — 10 г, кукурузные столбики с рыльцами — 10 г, пижма обыкновенная (цветки) — 10 г, аралия маньчжурская (корни) — 15 г.

Применять по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ за 30 мин до еды 3 раза в день для лечения облысения.

3. Подорожник большой (лист) — 15 г, лопух большой (корень) — 15 г, календула лекарственная (цветки) — 10 г, мята перечная (трава) — 10 г, зверобой продырявленный (трава) — 15 г, кукурузные столбики с рыльцами — 10 г, бессмертник песчаный (цветки) — 10 г, крапива двудомная (трава) — 15 г.

Принимать по 1/3—1/2 стакана настоя¹⁾ за 30 мин до еды 3 раза в день для лечения облысения.

ПОЛИВИТАМИННЫЕ СБОРЫ

1. Шиповник (плоды) — 40 г, черная смородина (плоды) — 40 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: одну столовую ложку сбора заварить двумя стаканами кипятка, настоять в течение часа, процедить и пить по 1/2 стакана 3—4 раза в день.

2. Шиповник (плоды) — 40 г, рябина (ягоды) — 40 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: одну столовую ложку сбора заварить двумя стаканами кипятка, кипятить 10 минут, настоять четыре часа, процедить и пить по 1/2 стакана 3 раза в день.

3. Брусника (плоды) — 20 г, крапива (листья) — 30 г, шиповник (плоды) — 30 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: измельчить, хорошо перемешать 4 чайные ложки сбора, заварить стаканом кипятка, настоять 3—4 часа, процедить и пить по стакану 2—3 раза в день.

4. а) Шиповник (плоды) — 50 г, калина (плоды) — 50 г;

б) шиповник (плоды) — 50 г, брусника (ягоды) — 50 г;

в) крапива (листья) — 30 г, рябина (плоды) — 70 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: 1 столовую ложку смеси на 1 стакан кипятка. Кипятить 10 минут. Настоять, укутав, 4 часа. Принимать по 1/2 стакана 2—3 раза в день.

5. Рябина (плоды) — 60 г, малина (плоды) — 10 г, смородина (листья) — 5 г.

Одну столовую ложку смеси заливают 0,5 л кипятка, кипятят 10 мин., настаивают 3—4 часа в плотно закрытой посуде, процеживают и пьют по полстакана 3 раза в день.

6. Шиповник (плоды) — 30 г, морковь (корень) — 30 г, крапива (листья) — 30 г, черная смородина (плоды) — 10 г.

Одну столовую ложку смеси заливают 0,5 л кипятка, кипятят 10 мин., настаивают 4 часа в плотно закрытой посуде, процеживают и пьют по полстакана 3 раза в день.

7. Шиповник (плоды) — 50 г, смородина (плоды) — 50 г.

Одну столовую ложку смеси заливают 0,5 л кипятка, кипятят 10 мин., настаивают 3—4 часа в плотно закрытой посуде, процеживают и пьют по полстакана 3 раза в день.

8. Шиповник (плоды) — 25 г, смородина (листья) — 25 г, малина (листья) — 25 г, брусника (листья) — 25 г.

Две столовые ложки заливают стаканом кипятка, кипятят 10 мин., настаивают 1—2 часа в плотно закрытой посуде, процеживают и пьют по полстакана 2—3 раза в день.

9. Шиповник (плоды) — 50 г, малина (плоды) — 50 г.

Одну столовую ложку смеси заливают стаканом кипятка, кипятят 10 мин., настаивают 3—4 часа, процеживают и пьют по 1/3 стакана 3 раза в день.

ГОРЬКИЕ (АППЕТИТНЫЕ) СБОРЫ

1. Вахта трехлистная (листья) — 35 г, золототысячник малый (трава) — 30 г, полынь горькая (трава) — 35 г.

Принимать по 1 столовой ложке настоя¹⁾ за 15—20 мин до еды для возбуждения аппетита.

2. Полынь (трава) — 20 г, аир (корневище) — 20 г, трилистник (листья) — 20 г, тмин (плоды) — 20 г.

Столовую ложку сбора заварить в стакане кипящей воды, кипятить 20 минут, процедить через марлю и принимать 3—4 раза в день за 20 минут до еды по 1 столовой ложке.

3. Полынь горькая (трава) — 25 г, вахта трехлистная (листья) — 25 г, золототысячник малый (трава) — 25 г, одуванчик лекарственный (корень) — 25 г.

Принимать по одной столовой ложке настоя¹⁾ за 15—20 мин. до еды для возбуждения аппетита.

4. Полынь горькая (трава) — 25 г, аир болотный (корневище) — 25 г, вахта трехлистная (листья) — 25 г, тмин обыкновенный (плоды) — 25 г.

Принимать по 1 столовой ложке настоя за 15—20 мин. до еды для возбуждения аппетита.

5. Полынь горькая (трава) — 50 г, вахта трехлистная (листья) — 50 г.

Принимать по 1 столовой ложке настоя¹⁾ за 15—20 мин. до еды для возбуждения аппетита.

6. а) Полынь (травы) — 20 г, тысячелистник (травы) — 20 г, одуванчик (корни) — 10 г,

б) полынь (травы) — 40 г, тысячелистник (травы) — 10 г.

С п о с о б у п о т р е б л е н и я: столовую ложку заварить в стакане кипящей воды, кипятить 20 минут, процедить через марлю и принимать 3—4 раза в день за 20 минут до еды по 1 столовой ложке.

Л Е Ч Е Н И Е

ГОРЯЧИМИ ВАННАМИ
С ПРИМЕСЬЮ ОТВАРА
РАЗЛИЧНЫХ ТРАВ

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВНОГО РЕВМАТИЗМА

Для полной ванны берут 1 кг трухи, для половинной — 1/2 кг, для сидячей — 1/4 кг, для ванны рук или ног — 4 полных горсти. Срок для ванны с водой в 37°C — 5—20 минут, смотря по состоянию больного. При лечении суставного ревматизма и некоторых других болезней многие целители рекомендуют принимать горячую ванну из сенной трухи продолжительностью в 20 минут, а чаще всего — 45 минут, а иногда и час. Если сердце не особенно сильное, надо принимать эти ванны через день, а при хорошем сердце — ежедневно. Для лечения суставного ревматизма требуется от 30 до 50 ванн.

Залив сенную труху холодной водой, доводят ее до кипения и кипятят полчаса. Обычно, для упрощения, труху перед кипячением помещают в холщовый мешок и в нем ее варят. Отвар ее прибавляют в ванну. Такого рода ванны очень благоприятно влияют при начинающемся отравлении крови, при замерзших членах и при золотушном состоянии.

При лечении ваннами с сенной трухой рекомендуется пить сок грейпфрута. Этот сок уничтожает жидкости в суставах и пазухах. Пить 1/2 стакана 3 раза в день.

Сенная труха богата разными эфирными маслами, благодаря чему производит раздражение кожи. Необыкновенно полезна при лечении обмена веществ, при выведении песка и камней, при подагровревматическом состоянии, при судорогах, при коликах желчного пузыря, желудка.

ДУБОВАЯ КОРА ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

Для полной ванны берут коры 1 кг, для половинной 1/2 кг, для сидячей и ножной 1/4 кг. Ванны из дубовой коры, благодаря содержанию дубильной кислоты, действуют жаропонижающе, содействуют рубцеванию ран. Ими пользуются при лечении поврежденной кожи от морозов, их применяют и при детской золотухе.

Кору эту сушат, измельчают и, промочив несколько часов в холодной воде, кипятят полчаса. Отвар процеживается и прибавляется к воде для ванны.

ХВОЩ ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

Хвощевой отвар превосходно действует на плохо заживающиеся раны: в таких случаях на рану накладывают смоченную в отваре тряпочку.

КОРНИ АИРА ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

Для полной ванны берут 1/4 кг айра, для половинной — 1/8 кг. Ванны с виром служат для лечения золотухи и рахитов у детей и невроза у взрослых.

Корни и зелень его заливают холодной водой и подвергают кипячению в течение 30 минут, после чего отвар прибавляют к ванне.

ВАННА ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ

Эффективным средством при камнях в почках является отвар овсяной соломы. (Можно заменить полевым хвощом). Солому варят 1/2 часа, из отвара готовят теплую ванну с температурой около 30°.

Такую ванну рекомендуют принимать не больше часа, чтобы теплая вода не очень расслабила больного, при выходе же из ванны хорошо все тело обмыть холодной водой. Ежедневно можно принимать три таких ванны, и в дополнение к этому больной обязательно должен принимать овсяный отвар внутрь, причем для его приготовления овес следует кипятить не более 1/2 часа. Нужно пить по две чашки этого отвара ежедневно. Более сильное воздействие оказывает отвар из овсяной соломы. Очень хорош отвар из полевого хвоща.

МУРАВЬИНАЯ ВАННА (ВОДЯНАЯ)

Положите в мешок содержимое одной муравьиной кучи и принесите его домой. Высыпьте из мешка все, что есть, и ведро и долейте его доверху крутым кипятком. Следует настоять содержимое ведра в течение нескольких часов, а затем вылить в горячую ванну с температурой от 30° до 37° по Цельсию. Для увеличения целебной силы ванны следует добавить в нее довольно значительное количество свежих березовых листьев. Березовые листья можно заменить свежими цветами ромашки.

ОТРУБИ ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

На целую ванну идет 1,5 кг, на половинную — 3/4 кг и для сидячей ванны и ножной — по 1/4 кг. Заливают отруби (их лучше помещать в мешок) холодной водой и варят очень недолго. Ими пользуются при воспаленных, зудящих и болезненных сыпях, при ожогах, ранениях и чрезмерной чувствительности кожи у истеричных женщин.

ЛИСТЬЯ ГРЕЦКОГО ОРЕХА ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

Берут свежие или высушенные листья, заливают холодной водой и кипятят 3/4 часа в плотно закрытой посуде. Для полной ванны их берут 1 кг, для половинной — 1/2 кг и для сидячей и ножной — по 1/4 кг. Ванны эти применяются главным образом в детской практике при лечении золотухи и при заболевании лимфатических узлов.

РОМАШКА ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

Ромашку заливают холодной водой и кипятят в хорошо закрытой посуде 10 минут. Для полной ванны — 1/2 кг, для половинной — 1/4 кг, для сидячей — 150 г и для ножной — 100 г. Эти ванны с большой пользой применяются при лечении кожных заболеваний, ран и нарывов. Ромашковые ванны успокаивают и устраняют судороги, их иногда применяют и при нервозности.

ЭКСТРАКТ ИЗ СОСНОВЫХ ИГЛ ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

Берут иглы, веточки и шишки, заливают холодной водой и кипятят полчаса, после чего хорошо закрывают и оставляют на 12 часов настаиваться. Хороший экстракт имеет хорицевый цвет. Требуется этого экстракта для полной ванны 1,5 кг, для половинной — 3/4 кг и для сидячей и ножной — по 1/4 кг.

Ванны с экстрактом из сосновых игл производят необыкновенный парализующий эффект на лиц с болезненной раздражительностью и парализующе укрепляют сердце и нервы. Поэтому эти ванны с большим успехом применяются при страданиях сердца и нервов, при воспалении нервов, нервных болях, нервной возбужденности, нервной бессоннице, параличе и подагре, мускульном и суставном ревматизме, ишиасе, опухолях и воспалениях суставов, при замерзших членах, нарывах, ожирении, при катарактах дыхательных путей, астме и болезни легких.

Ванны с сосновым экстрактом полезны также для укрепления сил больных, выздоравливающих после тяжелых болезней. Эти же ванны могут служить для лечебных вдыханий, если в ванну прибавить 20—30 капель настоящего масла из сосновых игл. Пары, насыщенные эфирным маслом, превосходно действуют на слизистые оболочки лица.

ВАЛЕРИАНА ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

Ванны с отваром валерианы служат для успокоения сердца, судорог и всей нервной системы: они понижают возбужденность спинного мозга и особенно рекомендуются при нервной бессоннице, нервном сердечном страдании, слабости сердца и нервов, при судорожных состояниях сердца, гортани, нервов, желудка, при коликах, астме и газах. Такие ванны уменьшают и регулируют число сердечных ударов и понижают артериальное давление крови. Для полной ванны требуется 1/2 кг валерианы.

СОЛЬ ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

Для полной ванны требуется 2 кг соли. Последнюю просто бросают в ванну для растворения. Такие ванны производят раздражение кожи, но-

буждают выделяться через кожу воду, мочу и углевод. Вызваннос соляными ваннами усиленное питание кожи кровью благотворно отзывается на глубже лежащих расстройствах обмена веществ, таких, как ревматические состояния и золотуха.

ТИМЬЯН ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

На полную ванну нужно 1 кг тимьяна. Ванны с тимьяном улучшают состояние всего организма.

ЛАВАНДОВЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ К ВАННАМ

Такие ванны имеют громадное значение не только при сердечных и нервных страданиях, но и при ревматизме, подагре, параличе, вывихах, благодаря ароматическому запаху и тому легкому раздражению, которое лавандовые ванны производят на кожу. Эти ванны оживляют и возбуждают кожные нервы и главные кровеносные сосуды. Для полной ванны нужно 1 кг лавандового цвета.

ВАННЫ С ПРИБАВЛЕНИЕМ ГОРЧИЦЫ

Прибавляют горчицу (сухую) только к частичным ваннам для рук или ног; берут ее 2—3 пригоршни (нужно брать только свежую), обливают горячей водой в 50°C, и хорошо растерев, чтобы не было комков, прибавляют к ванне. Выделяющееся при этом горчичное эфирное масло оказывает на кожу большее раздражение, чем всякие другие прибавления к ваннам. Пребывание в такой ванне ограничивается 5—10 минутами. Затем споласкивают тело теплой водой. Горчицу ни в коем случае нельзя кипятить, иначе она теряет свою силу и действие.

ЗАЛМАНОВСКИЕ ВАННЫ

Кроме знаменитых скипидарных ванн, Залмановым предложено множество других полезных ванн. Коротко о них.

1. Ванны из настоя листьев грецкого ореха.

Рекомендуются при мокнущих кожных заболеваниях: пемфигус, мокнущая экзема, зуд, крапивная лихорадка. С о с т а в: залить кипящей водой 400 г листьев грецкого ореха. Настоять в течение 1/4 часа, процедить. Вылить настой в ванну. Т 38,5°, 15 мин.

2. Ванны типа Рош-Позэ.

Назначают при сухости кожи, сухих дерматитах, икhtiозе и псориазе.

С о с т а в: смесь карбоната соды (35 г), карбоната магнезии (20 г), пербората магния (15 г). Т 38—39°, 15 мин.

3. Ванны с квасцами и содой.

Рекомендуются при варикозном расширении вен, при варикозных язвах. Состав: сода — 200 г, квасцы — 70 г. Т 38,5°, 15 мин.

4. Ручные ванны.

Рекомендуются при бронхальной астме, хроническом бронхите, синуситах, глухоме, воспалении радужной оболочки, для прерывания насморка, трахеита, гриппа.

Обя предплечья выше локтя погрузить в воду (Т 37°). Постепенно повышать температуру на 1° каждые две минуты, следовательно, от 38 до 43° — за 10 мин. Ванны (Т 43°) принимать 10 мин, затем отдыхать не менее 45 мин.

5. Ножные ванны (отягивающие кровь).

Против головокружений, хронической мигрени. Методика та же, что и ручных ванн.

6. Гипертермические ванны (обычно либо с листвою грецкого ореха или желтым скипидарным раствором).

Искусственное повышение температуры, вызванное гипертермическими ваннами, создает аккумуляцию "стерильного тепла", усиливает процессы сгорания в клетках и тканях, открывает капилляры. Улучшается регуляция проницаемости мембран, интенсифицируются жизненные процессы. Важно и то, что гипертермические ванны снабжают организм теплом без затрат организма.

Залманов исходит из того, что внешнее согревание частично заменяет внутреннее (возникающее в результате питания, снабжения кислородом, мышечной работы, кровообращения, секреции, умственной работы и приятных эмоций). Не случайно он считает, что в хорошо отапливаемых помещениях, оборудованных ваннами и горячей водой, можно уменьшить в рационе питания мясо, хлеб и жиры. Таковы и рекомендуемые нормы суточной калорийности, предложенные Институтом питания АМН СССР с учетом этого положения: они снижены для населения в городах по сравнению с сельской местностью.

7. Показания для применения гипертермических ванн (по Залманову).

Полиневрит. Иридоциклит. Полиомелит в предпаралитический период. Септицемия. Сальпингит. Отиты. Гонорейные артриты.

Противопоказания для применения гипертермических ванн. Повышенное спинномозговое давление. Отек мозга. Открытый туберкулез легких. Обширная пневмония. Миокардиты. Инфаркт миокарда. Коронариты. Гипертония. Острые флебиты. Цирроз печени.

Методика проведения гипертермической ванны.

Простая либо с листвою грецкого ореха, или с желтым скипидарным раствором. Сесть в ванну (Т 37°). Постепенно повышать температуру до 41—43° (за 12—15 мин.). Оставаться при достигнутой температуре 4—5 мин., затем выйти, завернуться в простыню и 2—3 шерстяных одеяла и 45 минут потеть, принимая горячее питье. Затем обсушиться и улечься в постель (хорошо укрывшись) не менее чем на 2 часа.

ПРОТИВО -
ПОКАЗАНИЯ

Авраи лекарственный.

Прием более высоких доз вызывает неудержимую упорную рвоту. Растение очень ядовитое, ввиду чего его не рекомендуют принимать.

Адонис весенний — ядовитое растение. Соблюдать дозировку.

Аир обыкновенный (корни) — При повышенной секреции желудка корни не принимать.

Алоэ (столетник). Применение препаратов алоэ вызывает прилив крови к органам малого таза. Противопоказаны при заболеваниях печени и желчного пузыря, при маточных кровотечениях, геморрое, цистите и беременности.

Аралия маньчжурская. Необходимо избегать применения препаратов из аралии при гипертонии, бессоннице, повышенной нервной возбудимости.

Арника горная — ядовитое растение. Соблюдать точно дозировку.

Багульник болотный — ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности, так как неправильная дозировка может вызвать воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

Барвинок малый — ядовитое растение. Соблюдать точно дозировку.

Бедраенец, анис обыкновенный — сырье может вызвать фотодерматит и контактный дерматит.

Белена черная — сильно ядовитое растение.

Береза бородавчатая. Ввиду раздражающего действия на почки, применение настоев, отвара и настойки березовых почек как мочегонного средства допустимо под контролем врача. Длительно не принимать.

Бессмертник (цмин песчаный) — повышает кровяное давление. При гипертонии длительно не применять.

Будра плющевидная. Внутреннее применение будры, как ядовитого растения, требует осторожности. Соблюдать точно дозировку.

Валериана, корни. Нельзя употреблять длительное время и в большом количестве. В таких случаях она действует угнетающе на органы пищеварения, вызывает головную боль, тошноту, возбужденное состояние и нарушает деятельность сердца.

Василек синий. Ввиду содержания в васильке синем сильно активных соединений с циановым компонентом, необходимо быть осторожным при применении сырья.

Василистник. Принимать только по назначению врача, растение ядовитое.

Вьюнок полевой (березка). При использовании больших количеств растения могут возникнуть жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, как рвота, понос, общее недомогание.

Горец перечный, горец почечуйный, горец птичий. Обладает сильным кровосвертывающим действием. Больным тромбофлебитом не принимать.

Гранат (плоды). Сок плодов пить обязательно разбавленным водой, так как в соке содержится много разных кислот, которые раздражают желудок и разъедают эмаль зубов. Осторожно применять кору граната, так как пе-

редозировка может вызвать головокружение, слабость, ухудшение зрения, судороги.

Грыжник гладкий. Необходимо помнить, что грыжник — ядовитое растение и при применении в более высоких дозах может вызвать отравление.

Девясил. Настой и отвар из девясила противопоказаны при беременности и болезни почек.

Донник лекарственный. При длительном употреблении и передозировке он вызывает головокружение, головные боли, тошноту, рвоту, сонливое состояние, иногда — поражение печени, кровоизлияния (под кожу, в мышцы, внутренние органы) — и даже паралич центральной нервной системы.

Дох красильный. При применении больших количеств дров может наступить отравление, подобное отравлению никотином. Это требует осторожности при использовании этого растения.

Дурман обыкновенный. Ядовитое растение. Внутрь не принимать.

Дурнишник обыкновенный. Ядовитое растение. Дозировку соблюдать точно.

Душица обыкновенная. При беременности не принимать, так как действует abortивно.

Дымянка лекарственная. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности.

Женьшень (корень) — применять только в колдовое время. Длительное применение женьшеня и применение его в больших дозах вызывает отрицательные явления: бессонницу, сердцебиение, головные боли, боли в сердце, снижение половой потенции и т.п.

Живохость — ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности.

Жостер слабительный. Проявления непереносимости — тошнота и рвота — связаны с тем, что жостер раздражает слизистую оболочку пищеварительного тракта.

Зверобой продырявленный. Растение ядовитое. Внутреннее применение требует большой осторожности. При длительном применении вызывает сужение кровеносных сосудов и повышает кровяное давление.

Земляника (ягода). Следует помнить, что у отдельных людей отмечается повышенная чувствительность к землянике, которая вызывает у них аллергическое заболевание, сопровождающееся упорной крапивницей. В этом случае употреблять землянику нельзя.

Золотая розга. Ядовитое растение. Точно соблюдать дозировку.

Калина обыкновенная. Из-за высокого содержания пуринов плоды калины противопоказаны при подагре и болезнях почек.

Кассия узколистная. Большие дозы препаратов семян вызывают колики в животе.

Кирказон обыкновенный. Растение ядовито, поэтому применять только под контролем врача. При беременности может стать причиной выкидыша.

Кислица обыкновенная. Ядовитое растение, точно соблюдать дозировку.

Копытень европейский. Применение его как сильно ядовитого растения требует большой осторожности.

Кошачья лапка двудомная (бессмертник). Сильное кровесвертывающее средство. Осторожно применять при тромбофлебитах. Нежелателен длительный прием при повышенном кровяном давлении.

Крапива. Крапиву без совета врача применять не рекомендуется. Препараты из этого растения противопоказаны людям с повышенной свертываемостью крови, больным гипертонической болезнью и атеросклерозом, а также не следует применять при кровотечениях, вызванных кистой, полипами и другими опухолями матки и ее придатков.

Красный стручковый перец жгучий. Внутреннее применение настойки может вызвать острые тяжелые желудочно-кишечные расстройства.

Крестовник обыкновенный. При передозировке ощущается сухость во рту, наступает сердцебиение, во всех видах растения пирозолидиновые алкалоиды обладают канцерогенным действием.

Противопоказания: глаукома, органические заболевания печени и почек.

Крестовник ромбический (плосколистный). В последнее время установлено, что большинство алкалоидов крестовника оказывают канцерогенное действие.

Крушина ломкая (кора). Ядовитое растение. Следует применять кору, выдержанную не менее года в сухом месте или подвергнутую нагреванию при 100°C в течение 1 часа. В противном случае употребление коры связано с опасностью отравления (тошнота, рвота).

Кубышка белая. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности.

Кубышка желтая. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности.

Кукурузные рыльца. Сильно свертывающее средство. При повышенной свертываемости крови не применять.

Купальница европейская. Ядовитое растение, особенно корни. Применение требует большой осторожности.

Ламинария. Нельзя принимать при болезни почек.

Ландыш майский. Ядовитое растение. Применение препаратов ландыша противопоказано при резких органических изменениях сердца и сосудов, остром миокарде, эндокардите и резко выраженном кардиосклерозе.

Левзея сафлоровидная (Маралий корень). Препарат применяют по указанию и под наблюдением врача. Противопоказаны людям с сильно повышенным кровяным давлением и заболеванием глазного дна.

Лимонник китайский. Применяется по назначению врача и под его контролем. Противопоказан при нервном возбуждении и перевозбуждении, бессоннице, повышенном кровяном давлении, сильных нарушениях сердечной деятельности.

Лук репчатый. Настойка лука противопоказана сердечным и печеночным больным и при болезнях почек.

Льнянка обыкновенная. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности и точной дозировки.

Льняное семя. Противопоказаниями являются холецистит и гепатит. А также длительное применение льняного семени не рекомендуется.

Любисток лекарственный. Может вызвать гиперемии тазовых органов, поэтому нельзя применять при беременности ввиду опасности наступления аборта.

Мак самосейка (дикий). Высокие дозы ядовиты.

Марена красильная, крапп. Она оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, повышает кислотность желудочного сока.

Противопоказания: острый и хронический гломерулонефрит, язвенная болезнь, гиперацидный гастрит (при повышенной кислотности).

Можжевельник обыкновенный. Можжевельник (ягоды) нельзя применять при остром воспалении почек. Внутреннее применение ягод требует точной дозировки и противопоказано при беременности.

Молочай любой разновидности. Внутреннее применение молочаев, как сильно ядовитых растений, требует большой осторожности.

Морковь посевная, огородная. Не применять внутрь корнеплоды, верхние части корнеплодов, находящиеся над поверхностью земли и имеющие зеленый цвет. Отрицательно влияет на деятельность сердца.

Морская капуста (ламинария). Не следует употреблять морскую капусту при туберкулезе легких, болезнях почек, фурункулезе, геморрагическом диатезе, крапивнице, при беременности, когда применение препаратов йода противопоказано.

Мыльнянка обыкновенная. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности.

Мята полевая и лесная. При приеме внутрь закрывает доступ к деторождению. К мяте садовой, культурной это не относится.

Наперстянка пурпуровая. Сильно ядовитое растение, хотя и ценное сердечное средство. Применение наперстянки требует большой осторожности и обязательного контроля врача.

Обвойник греческий. Пернплюцин сильно токсическое соединение, и применение его даже в незначительных дозах может вызвать токсические явления, поэтому необходимо быть осторожным при его применении. Использовать его для лечения можно только под непосредственным контролем врача.

Окопник лекарственный. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности и строгой дозировки.

Омела белая. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности.

Орех грецкий, орех фундук (лесной). При приеме внутрь ядер орехов грецкого и фундука и некоторых других орехов часто надо соблюдать дозировку, т. е. принимать в небольшом количестве, так как достаточно чуть избыточного приема и у человека вскоре начинаются головные боли в передней части головы. Это объясняется тем, что прием ядер орехов вызывает спазм сосудов головного мозга в передней части головы.

Очиток едкий. Ядовитое растение. Соблюдать точно дозировку. Сок свежей травы вызывает на коже воспаление и образование пузырей.

Папоротник мужской. Сильно ядовитое растение. Препараты папоротника противопоказаны при недостаточности сердца, при болезнях печени, почек, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при острых желудочно-кишечных заболеваниях, при беременности, резком истощении, малокровии и при активном туберкулезе.

Паслен сладко-горький, паслен черный. Ядовитые растения. Внутреннее применение требует осторожности.

Пастушья сумка. Препараты из пастушьей сумки противопоказаны людям с повышенной свертываемостью крови.

Переступень белый. Необходимо отметить, что растение переступень — ядовитое. Передозировка его может вызвать кровавый понос и нефрит.

Пижда обыкновенная. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности и точной дозировки.

Пенкульник обыкновенный. При приеме больших количеств растения могут возникнуть признаки интоксикации, выраженные сильной ломотой в мышцах. Признаки отравления могут начаться при употреблении в пищу мяса животных, чаще всего свиней или птиц, которых кормили семенами этого растения. Жалобы длятся от трех до десяти дней в зависимости от тяжести интоксикации, после чего спонтанно проходят.

Пион уклоняющийся. Сильно ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности и точной дозировки.

Плющ. Растение ядовитое! Может вызвать отравление. У более чувствительных людей при контакте с сырым возникает дерматит. Особенно токсичны плоды плюща.

Полынь горькая (серебристая). Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности и точной дозировки. Избегать длительного применения. Оно может вызвать судороги, галлюцинации и даже явления психических расстройств. Применение полыни горькой при беременности противопоказано. Нельзя применять при язвенной болезни.

Полынь цитварная. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности и обязательно врачебного контроля.

Почечный чай (ортосифон). При приеме внутрь увеличить потребление воды, так как чай почечный выводит из организма большое количество воды.

Прострел луговой (сон-трава). Сильно ядовитое растение. Внутреннее применение растения требует большой осторожности и точной дозировки.

Радиол розовая (золотой корень). Точно соблюдать дозировку. При передозировке могут возникнуть побочные реакции со стороны нервной системы в виде бессонницы, головных болей, сердцебиения, повышенной раздражительности. Лечиться под наблюдением врача. Прием лекарства противопоказан при резко выраженных симптомах нервных заболеваний, истощаемости корковых клеток головного мозга, гипертонии, атеросклерозе, а также при гипотонии, вызванной вегетативно-сосудистой дистонией.

Ревень. При приеме препаратов, содержащих ревень, моча, молоко и пот окрашиваются в желтый цвет. В щелочной среде — окраска красная. Следует избегать назначать больным подагрой и больным, страдающим почечно-каменной болезнью с оксалатными камнями. Ввиду того, что ревень может вызвать кровоизлияние из ректальных вен, не рекомендуется применение его при геморрое.

Редька посевная. Внутреннее применение редьки противопоказано для сердечных и печеночных больных, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, воспалениях желудочно-кишечного тракта.

Рододендрон золотистый. Ядовитое растение. При передозировке могут возникнуть отравления, признаками которого являются: сильное слюнотечение, позывы на рвоту, сильные боли по ходу пищеварительного тракта, состояние опьянения, угнетение сердечно-сосудистой системы дыхания, снижение артериального давления.

Препараты оказывают раздражающее действие на мочевыводящие пути. При заболеваниях почек противопоказаны.

Рута пахучая. Ядовитое растение, особенно свежее растение, и требует осторожности в дозировке.

Свекла обыкновенная. При приеме свежего сока свеклы происходит сильный спазм кровеносных сосудов. Поэтому свежесжатому соку дают отстояться 2—3 часа, чтобы улетучились вредные летучие фракции. После этого можно применять сок.

Сирень обыкновенная. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности.

Солодка голая. При продолжительном приеме солодки и особенно часто после применения карбенокселона, наблюдается повышение втериального давления, задержка жидкостей вплоть до появления отеков, нарушения в половой сфере — ослабление либидо, развитие гинекомвстии, ограничение или исчезновение оволосения и др.

Спорынья (маточные рожки). Сильно ядовитое растение. Применение спорыньи требует очень большой осторожности и обязательно врачебного контроля.

Татарник колючий, или обыкновенный. При повышении кровяном давлении не применять.

Термопсис ланцетный. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности. При кровохаркании прием внутрь противопоказан.

Толокнянка обыкновенная. Не применять долго! Некоторые вторы не рекомендуют использовать листья в форме отвара, так как это раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Тысячелистник. Ядовитое растение. Внутреннее применение всех видов тысячелистника, как ядовитых растений, требует осторожности. Длительное употребление растений и передозировка вызывает головокружение и кожные сыпи. Точно соблюдать дозировку.

Фиалка трехцветная, анютины глазки. Длительное применение препаратов из фиалки и передозировка могут вызвать рвоту, понос и зудящую сыпь.

Физалис обыкновенный, пузырная вишня, вишня полевая. Необходимо помнить, что растение содержит вещества с выраженной токсичностью. Потреблять плоды следует без пузырчатой чвшки, так как она содержит токсические вещества.

Хвощ полевой. Ядовитое растение, применение противопоказно при остром воспалении почек, опасно даже при небольшом раздражении. Внутреннее применение требует точной дозировки.

Хмель. Ядовитое растение. Требуется точной дозировки, следует остерегаться передозировки при приеме внутрь.

Хрен обыкновенный. Следует остерегаться приема хрена внутрь в больших количествах.

Чай китайский. Чрезмерное употребление чая может привести к повышению возбудимости. Крепкий чай противопоказан при сердечных заболеваниях, при язвенной болезни и неврозах.

Чемерица. Чемерица и все приготовляемые из нее препараты очень ядовиты. Наружное применение чемерицы также может вызвать тяжелые, вплоть до смертельных, отравления.

Черемуха обыкновенная. Рвстение ядовито. Внутреннее применение черемухи требует осторожности (особенно коры, плодов, листьев).

Черемша. Избегать применения черемши больным гастритами и язвой желудка.

Чернокорень лекарственный. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности, особенно в дозировке.

Чеснок нельзя употреблять больным падучей болезнью, полнокровным людям и беременным женщинам.

Чистец лесной. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности.

Чистотел большой. Все части растения, особенно корни, ядовиты. Внутреннее применение требует очень большой осторожности и точной дозировки. Применять только под наблюдением врача. Неумеренное и длительное применение вызывает тошноту, рвоту, понос, угнетение дыхательного центра.

Шиповник. После приема внутрь настоя шиповника обязательно сполоснуть рот теплой водой или содовой теплой водой. Кислоты, содержащиеся в настое, разъедают зубную эмаль.

Щавель кислый. Содержит пуриновые вещества и щавелевую кислоту. Не рекомендуется употреблять щавель при нарушенном солевом обмене (ревматизме, подагре) и связанных с ним заболеваниях, при воспалениях кишечника и туберкулезе.

Эфедра двухколосковая. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности при гипертонической болезни, атеросклерозе, тяжелых органических заболеваниях сердца и при бессоннице.

Ясень обыкновенный. Растение ядовитое. Внутреннее применение требует осторожности.

Ясенец. При соприкосновении с растением, особенно во время цветения, могут появиться тяжелые поражения кожи, подобные ожогам, которые болезненны и трудно заживают. Доказано, что может наступить отравление при ингаляции паров эфирного масла ясенца.

Ясменник душистый. Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности, при передозировке открывается рвота, головная боль, головокружение и даже наступает смерть.

ЯДОВИТЫЕ

РАСТЕНИЯ

Растительность Нечерноземья чрезвычайно богата по своему видовому составу. На ее обширной территории наряду с лекарственными растениями также встречаются и ядовитые, которые вызывают отравление у человека и животных.

Жертвами отравлений бывают чаще всего дети, внимание которых привлекают различные дикорастущие ягоды и корни ядовитых растений.

Большую помощь органам здравоохранения в заготовке лекарственного сырья оказывают пионеры и школьники, они обязательно должны собирать растения только под присмотром учителей или родителей.

При сборе лекарственных растений нужно быть очень внимательным и соблюдать меры предосторожности, поэтому сборщикам лекарственного сырья нужно знать внешний вид ядовитых растений, где они произрастают, уметь отличать их от сходных видов и при необходимости оказывать первую доврачебную помощь.

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ

Некоторые ядовитые растения синтезируют биологически активные соединения — алкалоиды — и в строго определенных дозах используются как лекарственные средства.

Таким растением является белена, которая используется для лечения больных с древних времен. Но в больших дозах белена может вызвать отравление.

Белена — травянистое растение семейства пасленовых высотой 30—60 см. Стебель прямой, опушенный мягкими железистыми волосками. Листья очередные, удлинненно-овальные, выемчатозубчатые. Прикорневые листья — черешковые. Цветки собраны на верхушках стеблей, крупные и имеют грязно-желтый с темно-фиолетовыми жилками венчик. Плод — коробочка с мелкими буровато-серыми семенами.

Растет белена на сорных местах, на огородах, садах, обочинах дорог. Дикорастущие растения для лечебных целей не заготавливаются. Во всех частях растения содержатся ядовитые алкалоиды группы атропина. В семенах также содержится горький гликозид, смолы, жирные масла. Именно семена, приятные на вкус и напоминающие семена мака, чаще всего вызывают отравления.

Первыми признаками отравления является расширение зрачков, головокружение, покраснение лица, чрезмерное возбуждение, сопровождающееся бредом и галлюцинациями.

ВЕХ ЯДОВИТЫЙ

Самое ядовитое растение, которое встречается в зоне Нечерноземья — вех ядовитый, или омег водяной, цихута.

Это многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных с гладким ветвистым стеблем высотой до 1,5 м. Листья дважды или трижды перистораздельные, с узколанцетными, остропильчатыми долями. Цветки белые, мелкие, собраны в сложный зонтик, корневище крупное, короткое, по виду напоминает брюкву или репу, но в отличие от них на разрезе корневища века ядовитого имеются перегородки, образующие полости. Корни сочные, толщиной до 4—5 мм. Корневища и корни имеют сладковатый вкус.

Растет вех ядовитый на влажных и сырых лугах, по берегам болотистых рек, канав, ручьев, окраинам болот и даже в воде.

Все части растения ядовиты. Ядовитые свойства сохраняются и в высушенном виде. Большую опасность для человека и животных представляют корневища, которые особенно токсичны весной. В них содержится ядовитое вещество цикутотоксин. Чаще всего отравления бывают весной во время половодья, когда крупные и сочные корневища легко добываются и вымываются водой из прибрежных местообитаний растений.

После попадания частей растения, в особенности корневища, в организм человека быстро развивается отравление со следующими признаками: сладковатый, затем горьковатый вкус во рту, боль в животе, слюнотечение, рвота, расстройство дыхания и кровообращения, бред, судороги. Может наступить смерть от остановки дыхания в результате паралича дыхательного центра.

ВОЛЧЬЕ ЛЫКО

Сильно ветвистый кустарник из семейства ягодковых. Ветви его прутьевидные, с серой корой, покрытой мелкими, бурыми пятнами. Листья очередные, продолговато-ланцетные, собраны на концах ветвей. Сверху листья синевато-зеленые, снизу — сизоватые. Цветки четырехлепестковые, розовые или белые, душистые, сидящие по бокам ветвей в пазухах листьев. Плод — ягода сочная, ярко-красная, иногда желтая; растут прямо на стебле.

Все части растения ядовиты. В них содержится ядовитое вещество — дафнин. Особенно ядовиты кора и сок растения, а также ягоды, привлекающие своей яркой окраской. К растению даже опасно прикасаться, ни в коем случае его нельзя трогать руками, так как при контакте с растением на коже человека возникает раздражение, воспаление, появляются пузыри и длительно незаживающие язвы. Отравление волчьим лыком также может возникнуть при употреблении ягод, чаще всего детьми, которые соблазняются их красивым внешним видом. При отравлении возникает слюнотечение, боли в желудке, рвота, головокружение и судороги.

ВОРОНИЙ ГЛАЗ

Многолетнее травянистое растение из семейства лилейных. Стебель прямостоячий, высотой 20—30 см и имеет четыре обратнояйцевидных листа, расположенных крест-накрест. Корневище ползучее, длинное, тонкое. Зеленовато-желтый цветок вырастает в верхней части стебля. Цветет в

мае—июне. Из цветка в июле—августе образуется плод — черно-синяя крупная ягода. По незнанию ее иногда принимают за чернику или голубику.

Растет на влажной почве, в смешанных и хвойных лесах, среди кустарников, в тенистых местах.

Все растение очень ядовито, особенно много яда в шаровидных ягодах.

При отравлении ягодами возникает тошнота, рвота, боли в животе.

ЧЕМЕРИЦА ЛОБЕЛЯ

Высокое травянистое многолетнее растение из семейства лилейных высотой до 2 м. Стебель толстый и прямой. Листья очередные, эллиптические, цельно-крайние и голые. Цветки зеленоватые, невзрачные, образуют на верхушке растения длинное соцветие — метелку. Цветет в июне—августе.

Во всех частях чемерицы содержатся ядовитые алкалоиды. Наибольшая токсичность чемерицы проявляется ранней весной в момент отрастания стебля и листьев.

Чемерица, произрастающая на пастбищах, опасна и для скота, у которого часто бывают отравления при поедании молодой и сочной зелени этого растения.

Чемерица раздражает слизистые оболочки носа, полости рта, горла, вызывает сильное чихание. При отравлении наблюдается жжение во рту, слюнотечение, рвота, боли в животе, понос, угнетение дыхания.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

Если отравление ядовитыми растениями все же произошло, то прежде всего необходимо срочно удалить яд из организма и замедлить его всасывание.

Прежде всего нужно вызвать рвоту, раздражая корень языка и дать пострадавшему внутрь большое количество (4—5 стаканов) теплой подсоленной воды. Также рекомендуется с целью окисления ядовитых продуктов раствор калия перманганата для промывания желудка.

Уменьшению всасывания ядов способствует прием взвеси активированного угля — карболена. Для этого несколько таблеток размельчают, смешивают с водой и дают выпить пострадавшему. Желательно сделать очистительную клизму. При прикосновении к ядовитому растению руками или телом следует пораженный участок обмыть несколько раз водой с мылом или раствором калия перманганата. Пострадавшего немедленно следует доставить в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.

БЕРЕГИТЕСЬ ЯДОВИТЫХ РАСТЕНИЙ!

КАЛЕНДАРЬ

СБОРА

ЛЕКАРСТВЕННЫХ

РАСТЕНИЙ

МАРТ

Береза — почки
Брусника — листья
Сосна — почки

АПРЕЛЬ

Береза — почки
Брусника — листья
Горец змеиный — корневища
Девясил высокий — корневища с корнями
Дуб — кора
Калина обыкновенная — кора
Крушина ольховидная — кора
Лапчатка прямостоячая — корневища
Папортник мужской — корневище
Сосна — почки
Толокнянка обыкновенная — листья
Тополь черный — почки

МАЙ

Адонис весенний — трава
Багульник болотный — облиственные ветви
Береза бородавчатая — листья, почки
Боярышник красный — цветы, плоды
Брусника — листья
Дягиль лекарственный — корни
Дуб — кора
Калина обыкновенная — кора
Копытень европейский — листья
Крапива двудомная — листья
Крушина ольховидная — кора
Крушина ломкая — кора
Ландыш майский — трава, листья, цветки
Лопух большой — корни
Мать-и-мачека — цветки, листья
Одуванчик лекарственный — трава, корни
Окопник лекарственный — корни
Папортник мужской — корневище
Пастушья сумка — трава
Первоцвет весенний — листья, цветки
Пион уклоняющийся — корни

Пихта сибирская — почки, хвоя
Плаун булавовидный — трава, споры
Подорожник обыкновенный — трава
Пырей ползучий — корневища
Смородина черная — листья
Сосна лесная — хвоя, почки
Толокнянка обыкновенная — листья
Тополь черный — почки
Фиалка трехцветная — трава
Хвощ полевой — трава
Хрен обыкновенный — корни
Черсмуха — цветки, плоды

ИЮНЬ

Адонис весенний — трава
Багульник болотный — облиственные ветви
Белена черная — листья
Береза бородавчатая — листья, почки
Боярышник красный — цветы, плоды
Василек синий — цветки
Вахта трехлистная — листья
Горец птичий — трава
Донник лекарственный — трава
Дягиль лекарственный — корни
Желтушник серый — трава
Земляника лесная — плоды, листья
Золототысячник малый — трава
Исландский лишайник — слоевище
Копытень европейский — листья
Крапива двудомная — листья
Ландыш майский — трава, листья, цветки
Липа сердцевидная — цветки
Лопух большой — корни
Мать-и-мачеха — цветки, листья
Одуванчик лекарственный — трава, корни
Окопник лекарственный — корни
Пастернак посевной — трава
Пастушья сумка — трава
Пион уклоняющийся — корни
Пихта сибирская — почки, хвоя
Плаун булавовидный — трава, споры
Подорожник большой — листья
Подорожник обыкновенный — трава
Полынь горькая — листья
Папоротник мужской — корневища
Пустырник пятилопастный — трава
Ромашка душистая — цветочные корзинки
Сосна лесная — хвоя, почки

Сушеница топяная — трава
Тимьян ползучий — трава
Тмин обыкновенный — трава
Фиалка трехцветная — трава
Хвощ полевой — трава
Хрен обыкновенный — корни
Череда трехраздельная — трава
Черемуха — цветки, плоды
Черника — листья
Чистотел большой — трава
Ятрышник — клубнекорни

ИЮЛЬ

Адонис весенний — трава
Аир болотный — трава
Багульник болотный — трава
Белена черная — листья, почки
Береза бородавчатая — листья, почки
Бессмертник песчаный — соцветия
Боярышник красный — цветки, плоды
Василек синий — цветки
Вахта трехлистная — листья
Голубика — плоды
Горец перечный — трава
Горец почечуйный — трава
Донник лекарственный — трава
Душица обыкновенная — трава
Дягиль лекарственный — корни
Желтушник серый — трава
Живокость сетчатоплодная — трава
Зверобой продырявленный — трава
Земляника лесная — плоды, листья
Золототысячник малый — трава
Исландский лишайник — слоевище
Календула лекарственная (ноготки) — соцветия
Калина обыкновенная — кора, плоды
Кипрей узколистный — трава
Копытень европейский — листья
Коровяк скипетровидный — венчики цветков
Крапива двудомная — листья
Липа сердцевидная — соцветия
Лопух большой — корни
Лук репчатый — луковица
Льнянка обыкновенная — трава
Малина обыкновенная — плоды, листья
Морковь посевная — семена, корнеплоды
Мать-и-мачеха — цветки, листья
Можжевельник — шишкоягоды

Мята полевая — трава
 Одуванчик лекарственный — трава, корни
 Окопник лекарственный — корни
 Пашпортник мужской — корневище
 Пастернак посевной — трава
 Пастушья сумка — трава
 Петрушка огородная — трава, корни
 Пижма обыкновенная — соцветия
 Пипон уклоняющийся — корни
 Пихта сибирская — почки, хвоя
 Пилун булабовидный — трава, споры
 Подорожник большой — листья
 Подорожник обыкновенный — трава
 Полынь горькая — трава, листья
 Полынь обыкновенная — трава
 Пустырник пятилопастный — трава
 Ромашка душистая — цветочные корзинки
 Мородина черная — плоды
 Рушеница топяная — трава
 Сосна лесная — хвоя, почки
 Сильван ползучий — трава
 Сили обыкновенный — плоды
 Силоньянка обыкновенная — листья
 Тысячелистник обыкновенный — трава
 Фиалка трехцветная — трава
 Хвощ полевой — трава
 Хрен обыкновенный — корни
 Черда трехраздельная — трава
 Чермуха обыкновенная — плоды
 Черника — плоды
 Чистотел большой — трава
 Шиповник коричный — цветки, плоды
 Ятрышник — клубнекорни

АВГУСТ

Адонис весенний — трава
 Аир болотный — корневища, трава
 Багульник болотный — трава
 Бессмертник несчанный — соцветия
 Боярышник красный — цветки, плоды
 Валериана лекарственная — корни, корневище
 Голубика — плоды
 Горец почечуйный — трава
 Донник лекарственный — трава
 Душица обыкновенная — трава
 Дягиль лекарственный — корни
 Желтушник серый — трава
 Золототысячник малый — трава

Исландский лишайник — слоевище
 Календула лекарственная (ноготки) — соцветия
 Калина обыкновенная — кора, плоды
 Кипрей узколистный — трава
 Коровяк скипетровидный — венчики цветов
 Крапива двудомная — листья
 Крестовник обыкновенный — трава, корни
 Лопух большой — корни
 Лук репчатый — луковица
 Малина обыкновенная — плоды
 Морковь посевная — семена, корнеплоды
 Мать-и-мачеха — цветки, листья
 Одуванчик лекарственный — трава, корни
 Окопник лекарственный — корни
 Папоротник мужской — корневище
 Пастушья сумка — трава
 Петрушка огородная — трава, корни
 Пижма обыкновенная — соцветия
 Пион уклоняющийся — корни
 Плаун булавовидный — споры, трава
 Подорожник большой — листья
 Полынь горькая — трава
 Ромашка душистая — цветочные корзинки
 Рябина обыкновенная — плоды
 Синюха голубая — корневища с корнями
 Сосна лесная — хвоя, почки
 Сушеница топяная — трава
 Тмин обыкновенный — плоды
 Толокнянка обыкновенная — листья
 Тысячелистник обыкновенный — трава
 Фиалка трехцветная — трава
 Хвощ полевой — трава
 Хмель обыкновенный — шишки
 Хрен обыкновенный — корни
 Черёда трехраздельная — трава
 Черемуха обыкновенная — плоды
 Черника — плоды
 Чеснок посевной — луковицы
 Чистотел большой — трава
 Шиповник коричный — плоды

СЕНТЯБРЬ

Валериана лекарственная — корневища с корнями
 Горец змеинный — корневища с корнями
 Дягиль лекарственный — корневища с корнями
 Календула лекарственная (ноготки) — соцветия
 Калина обыкновенная — плоды, кора
 Капуста

Клюква — плоды
 Крапива двудомная — листья
 Кровохлебка лекарственная — корни, корневище
 Крушина слабительная (жостер) — плоды
 Лапчатка прямостоячая — корневище
 Лопух большой — корни
 Лук репчатый — луковица
 Можжевельник обыкновенный — шишкоягоды
 Морковь посевная — семена, корнеплоды
 Одуванчик лекарственный — корни
 Ольха серая — шишки
 Нанортник мужской — корневища
 Пастушья сумка — трава
 Первоцвет весенний — корневища с корнями
 Петрушка огородная — трава, корни
 Пион уклоняющийся — корни
 Плавун булавовидный — споры
 Подорожник большой — листья
 Полынь горькая — трава
 Ромашка душистая — цветочные корзинки
 Рыбина обыкновенная — плоды
 Синюха голубая — корневища с корнями
 Гмин обыкновенный — трава
 Голубянка обыкновенная — листья
 Тысячелистник обыкновенный — трава
 Фиалка трехцветная — трава
 Ямнц полевой — трава
 Ямсл обыкновенный — шишки
 Ярен обыкновенный — корни
 Цикорий дикий — корни
 Шиповник коричный — плоды
 Щавель конский — корневища и корни

ОКТАБРЬ

Адериана лекарственная — корневища с корнями
 Ярец змеиный — корневища
 Ягиль лекарственный — корневища с корнями
 Ялина обыкновенная — плоды, кора
 Ялюква — плоды
 Якрохлебка лекарственная — корневища и корни
 Ялапчатка прямостоячая — корневища
 Яморковь посевная — семена, корнеплоды
 Яможжевельник обыкновенный — шишкоягоды
 Яодуванчик лекарственный — корни
 Яолонник лекарственный — корни
 Яольха серая — шишки
 Янанортник мужской — корневища
 Япервоцвет весенний — корневища с корнями

Пырей ползучий — корневища
Стальник полевой — корни
Толокнянка обыкновенная — листья
Цикорий дикий — корни
Шиповник коричный — плоды
Щавель конский — корневища и корни

НОЯБРЬ

Ольха — соплодия
Стальник полевой — корни

ВНИМАНИЕ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, ПОМНИ!

С каждым годом все меньше и меньше остается целебных растений на земле. В последнее время очень много издано популярных книг по лекарственным растениям. Огромная масса людей вышла в леса и на поля для сбора для себя, для аптек и на продажу. Это привело к тому, что исчезают очень ценные лекарственные растения. Поэтому самое главное при сборе растений помнить следующее:

- а) бери только те растения, которые ты твердо знаешь;
- б) бери только те части растений, которые необходимы для лечения;
- в) знай сроки, в которые можно собирать те или иные части растений;
- г) обязательно оставляй хорошие растения на участке для будущего размножения, чтобы не допустить исчезновения растений. Помни об эстетическом значении природы для человека. Помни о будущем поколении, которое придет на природу после тебя. Помни, что природа — живая среда;
- д) помни о правильной сушке тех или иных частей растений;
- е) никогда не собирай растения, цветы, корни в черте города или промышленного района, около дорог.

Правила определения растений, их сбора, транспортировки, сушки хранения можно прочесть в любой книге по лекарственным растениям. В настоящем кратком лечебнике даны лишь рецепты для помощи больному человеку. Обязательно при лечении надо узнать от врача диагноз заболевания и только после этого и по совету врача приступать к лечению растениями.

СПОСОБЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Отвары и настои готовят двумя способами: холодным и горячим.

При холодном способе сырье заливают необходимым количеством холодной кипяченой воды и настаивают 4—12 часов, фильтруют и используют.

При горячем способе нужное количество лекарственного сырья заливают водой комнатной температуры в фарфоровой, стеклянной или эмалированной посуде, посуду помещают в кипящую водяную баню и нагревают при частом помешивании отвары: 30 минут, настои — 15 минут; затем охлаждают, фильтруют через ткань, марлю, и лекарство готово к употреблению. Водяную баню можно заменить горячей печкой, но нужно следить за тем, чтобы лекарственная смесь не кипела.

Отвары и настои готовят на 1—2 дня употребления. Хранят их в темном прохладном месте, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Если отвар или настой на следующий день надо пить теплым, то его не подогревают, а разбавляют горячей водой.

Настойки в домашних условиях обычно готовят на 40—70% спирте. Измельченное сырье заливают водкой или спиртом в отношении 1:10, 2:10, 3:10 в стеклянной темной посуде, закрывают пробкой и выдерживают в темном месте от 3—21 суток при периодическом помешивании. Затем настойку фильтруют через марлю или вату и выливают в темную склянку. Срок хранения настоек 1—3 года.

Настойки (тонизирующие средства) принимают обычно в холодное время года (осень, зима, весна), так как они вызывают прилив крови к голове и сердцу, особенно в теплое время. Это делают в тех случаях, когда настойку (тонизирующую) принимают для профилактики. Но иногда в любое время года, например, после перенесенных тяжелых операций, при длительных, изнурительных заболеваниях, при работе, связанной с большими физическими нагрузками. Надо понимать, что любая, даже самая безвредная трава имеет не только обширные и хорошие показания при лечении болезней, но и противопоказания (они даны в конце раздела траволечения). Ингаляционные смеси готовят на основе отваров или на-

196

стоев с последующим разведением их кипяченой водой до необходимой лечебной концентрации ингаляционной смеси в целом (обычно 1:2 и 1:3). Растворы для примочек, спринцевания, местных ванночек готовят аналогичным способом, однако в случае необходимости получения более концентрированных водных вытяжек исходные настои и отвары следует готовить из расчета 1:5 и 1:3 и применять их в нативном виде.

Для приготовления лечебных ванн настои и отвары используют из расчета 1—2 л на ванну.

Курс лечения галеновыми препаратами при большинстве хронических заболеваний составляет 25—35 дней. Повторные курсы назначают после 10—15-дневного перерыва, но не более 2 курсов после основного курса лечения. В отдельных случаях во избежание снижения эффективности или для предупреждения привыкания рекомендуется при повторных курсах лечения изменять состав сборов и назначать лекарственные растения, обладающие аналогичной терапевтической активностью. Разовые дозы, количество суточных приемов галеновых средств не следует считать строго обязательными, так как при необходимости врач может их изменить в зависимости от течения болезни, индивидуальных особенностей больного, его возраста и пола.

Все рецепты в дозировке при приеме внутрь рассчитаны на взрослого человека. Поэтому детям от 1 до 3 лет дозировку необходимо уменьшить в 3—5 раз, детям от 3 до 7 лет — в 2—3 раза, детям от 7 до 14 лет — в 1,5—2 раза. В сборнике имеется также список противопоказаний трав, список времен года для сбора лечебных трав (календарь), важнейшие настойки, методы их приготовления и применения, а также ряд масел, необходимых для домашней аптеки.

Способы приготовления отваров, настоев и настоек указаны в рецептах.

В первую неделю лечения народными средствами и травами при приеме внутрь дозировку уменьшают вдвое по сравнению с указанной. Это делается для того, чтобы организм привык к данному лечению. Со второй недели, если организм хорошо переносит данный метод, переходят на полную дозировку. В первые дни при приеме внутрь сборов, настоев и настоек из лекарственных трав у некоторых больных происходит как бы небольшое, легкое обострение болезни. Как пишут наши известные специалисты-

травники, этого бояться не надо, так как происходит как бы перелом в организме в связи с действием лечебных препаратов. Но если лекарство явно не помогает, следует прекратить курс и применять другие методы и рецепты лечения.

Уважаемый читатель! Помни, что главное во время болезни своевременно обратиться к врачу и найти необходимый рецепт с его помощью для эффективного лечения.

Н А С Т О Й К И
В ДОМАШНЕЙ АПТЕКЕ
(ПРИГОТОВЛЕНИЕ
И УПОТРЕБЛЕНИЕ)

АИР БОЛОТНЫЙ

Настойка корневищ айра болотного готовится следующим образом: 20 г айра на 100 мл 40° спирта, настаивают 2 недели, процеживают, отжимают, фильтруют, сохраняют в темном прохладном месте в темной склянке.

Принимать по 15—30 капель 2—3 раза в день перед едой.

Применяется для лечения хронических гастритов, извращенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при ахилии, поносах. Реже применяется при холециститах, гепатитах, мочекаменной болезни.

АРАЛИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ

Берут 20 г корней аралии на 100 мл 70% спирта в темной склянке. Настаивать 2 недели, процедить, отжать, фильтровать и сохранять в темном прохладном месте.

Принимать по 30—40 капель 2—3 раза в день. Курс лечения 20—25 дней. Повторить, если необходимо, после 2-недельного перерыва.

Принимают при депрессиях, как тонизирующее средство, при астенических и астено-депрессивных состояниях, при неврастении, гепатите, при умственном и физическом переутомлении.

НАСТОЙКА ИЗ ЛИСТЬЕВ БАРБАРИСА

Берут 20 г листьев барбариса на 100 мл 40% спирта или водки. Настаивать 2 недели, отжать, отфильтровать. Принимать по 25—30 капель 3 раза в день в течение 2—3 недель. Хранить в темном прохладном месте и в темной склянке.

Рекомендуется для применения при заболзаниях печени и желчных путей, при гепатите, гепатохолцистите, желчнокаменной болезни. При дискинезиях желчного пузыря, обострениях хронических холециститов без повышения температуры.

Настойку барбариса применяют также в акушерско-гинекологической практике при атонических кровотечениях в послеродовом периоде и при субинволюции матки, при кровотечениях, связанных с воспалительными процессами и т.п.

БЕДРЕНЕЦ-КАМЕНОЛОМКА, КОРНИ, НАСТОЙКА

40 г корня на 100 мл 70% спирта или водки. Настоять 8 дней в темном шкафу, процедить, отжать.

Принимать по 30 капель 4—5 раз в день на столовую ложку воды.

Применяется это старинное народное средство от астмы, притом радикальное и проверенное. Употреблять лучше настойку, так как корень труднорастворим в воде.

НАСТОЙКА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧЕК

Берут 20 г березовых почек на 100 мл 70% спирта. Настаивать 3 недели. Отжать, фильтровать и хранить в темном сосуде и прохладном месте подальше от света.

Принимают 3 раза в день по 15—30 капель на ст. ложку воды.

Принимают при язве желудка, как желчегонное и мочегонное средство, при расстройствах и разных болях в желудке, при несварении желудка, при водянке (возникает от воспаления почек), при всяких иных видах почечных страданий, против мелких круглых глистов (острицы, аскариды), при болезнях кожи, экземе, невралгических болях, миеозитах, при болезнях мочевого пузыря, при ревматизме.

Принимают также при отеках сердечного происхождения, при болезни печени, при болезнях органов дыхания (ларингите, бронхите, трахеитах).

Наружно применяется для лечения ран (примочки, промывания), для втирания при ревматизме, при ссадинах, пролежнях, хронических гнойных ранах, трофических язвах, делают компрессы на суставы при артритах и ревматизме.

При холере можно приготовить настойку на водке. На 0,5 л водки добавить полбутылки березовых почек, настаивать в течение месяца. Употреблять по одной рюмке каждый час до прекращения рвоты.

БОЯРЫШНИК. НАСТОЙКА

10 г цветков с листьями настоять 10 дней в 100 мл водки или 70% спирте, профильтровать, сохранить в темной склянке.

Принимать по 20—30 капель с водой 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс продолжать 20—30 дней.

Применяется при функциональном расстройстве сердечной деятельности, при сердечной слабости, ангионеврозах, бессоннице у сердечных больных, при гипертиреозе с тахикардией, начальных формах гипертонической болезни, атеросклерозе. Понижает возбудимость центральной нервной системы, тонизирует сердечную мышцу, усиливает коронарное мозговое кровообращение, устраняет аритмию и тахикардию, снижает кровяное давление, одышку.

ВЬЮНОК ПОЛЕВОЙ

20 г растения залить 100 мл 70% спирта и выдержать две недели. Процедить и принимать по 15—30 капель 2—3 раза в день как мочегонное или слабительное средство.

ГРУШАНКА, НАСТОЙКА

Взять 50 г листьев и стеблей грушанки на 0,5 л водки. Настоять 2 недели в темном месте, отфильтровать, хранить в темной склянке.

Принимать по 30—40 капель 3 раза в день.

Применяется при воспалении придатков, воспалении предстательной железы, при бесплодии, непроходимости труб, при воспалительных заболеваниях матки, при хроническом воспалении мочевого пузыря и мочевых путей с наличием гноя в моче.

ДЯГИЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, ДУБНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Взять 30 г измельченного сырья из корня, залить 500 мл белого вина, настоять в течение суток при частом взбалтывании, затем процедить и принимать по половине рюмки для вина два раза в день.

Принимать как успокаивающее средство для лечения при истерии, судорогах а так же, как средство для лечения гипертонической болезни на начальных стадиях при ревматизме и желчных заболеваниях.

НАСТОЙКА ЖЕНЬШЕНЯ

1. Взять 10 г женьшеня на 100 мл 70% спирта и настаивать 2—3 недели, отжать, отфильтровать и хранить в темном месте в темной склянке.

Принимать по 15—25 капель 2—3 раза в день за 30 мин. до еды. Не рекомендуется принимать перед сном или поздно вечером.

Применяют в качестве тонизирующего и укрепляющего средства для лечения различных заболеваний центральной нервной системы, повышения уровня работоспособности и сопротивляемости организма к стрессовым ситуациям. Женьшень эффективен также при астенических и астенодепрессивных состояниях, при различных неарозах, бессоннице и импотенции, повышается общий тонус. Кроме того, улучшается функциональная деятельность сердечно-сосудистой системы, при атеросклерозе. В восточных странах применяют женьшень для продления жизни и молодости.

Прием его осенью и зимой наиболее эффективен.

2. Взять 50 г корня женьшеня, залить на 3 часа кипяченой сладкой и холодной водой, затем измельчить, опустить в бутылку с 500 мл водки (40%) и настаивать 20 дней в темном месте.

Принимать по 10 мл за 30 мин. до еды 1 раз в день. Курс — 30—40 дней.

ЗАМАНИХА, ЭХИНОПАНАКС ВЫСОКИЙ

Настойка готовится из корней растения на 70% спирте в соотношении 1:5. Принимать по 30—40 капель 2—3 раза в день перед едой. Курс — 30 суток.

Принимать как стимулятор при различных формах астении, при депрессивных состояниях и гипотонии, а также неврастении на фоне гипертонии с вяло протекающей шизофренией и сахарным диабетом. Исчезает утомляемость, раздражительность, улучшается сон, появляются бодрость и работоспособность.

ЗВЕРОВОЙ

Взять 20 г растения на 100 мл 70% спирта. Наставать 2 недели, процедить, отжать, отфильтровать и хранить в темной склянке в прохладном месте.

Принимают по 40—50 капель 3—4 раза в день. Для полоскания 30—40 капель в 1/2 стакана воды.

Применяют при заболеваниях ротоглотки, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, при дискинезиях желчных путей, гепатитах, застое желчи в желчном пузыре, холециститах, при начальных симптомах желчекаменной болезни, при гастритах. В ряде случаев назначают при нарушениях периферического кровообращения с явлениями застоя, при микроциркуляторных расстройствах. Применяют также при дискинезиях желчных путей, гепатитах, холециститах, гастритах, метеоризме, при снижении ультрафильтрационной способности почек, функциональной недостаточности почечных клубочков.

В стоматологии применяют как вяжущее и противовоспалительное средство, рекомендуются полоскать настоем полость рта для устранения дурного запаха, а также смазывать десны для их укреплении.

По 20 капель в стакане воды применяют для полоскания полости рта при гингивитах, стоматитах, фаренгите.

1% раствор на 70% спирте при инфицированных ранах, панарициях, абсцессах, карбункулах, фурункулах, трофических язвах и ожогах, повышает регенеративные свойства тканей.

НАСТОЙКА

ИЗ ТРАВЫ ЗЛОТОТЫСЯЧНИКА

Готовят в быту следующим образом: 20 г измельченной травы золототысячника заливают 100 мл 40% спирта или водкой, настаивают 7—14 дней, ежедневно несколько раз встряхивая, процеживают, принимают по 15—20 капель за 20—30 минут до еды.

Применяется как горечь для возбуждения аппетита, для повышения секреции пищеварительных желез и усиления желчеотделения, обладает противоглистными свойствами.

КАЛЕНДУЛА,

НАСТОЙКА

Взять 20 г календулы на 100 мл 70% спирта, настоять 2 недели. Процедить. Принимать по 20—30 капель 3 раза в день.

При приеме настойки отмечается исчезновение головных болей, улучшение сна и повышение работоспособности. Принимается при гипертонической болезни (курс 3 недели и более), желудочно-кишечных заболеваниях, язве, при рахите, рахе, бессоннице, аритмии сердца, при одышке, как желчегонное средство, для укрепления общего самочувствия.

Настойка календулы быстро ликвидирует воспалительные процессы и гнойные воспаления и выделения при ранениях и язвенных процессах и значительно ускоряет регенерацию тканей и заживление ран, а также при скарлатине.

Наружно применяется в качестве примочек и смазывания ран, язв, ожогов, прыщей, царапин, порезов. Дает хорошие результаты при болезнях полости рта, горла (полоскание), разбавить водой. При болезнях глаз (ячменях, блефаритах, конъюнктивитах) — примочки, промывания. Для этих целей настойку разбавляют водой 1:10.

Неплохие результаты дает применение настойки календулы и в гинекологической практике (при язвах, эрозии шейки матки и белях). Разбавить водой 1:10. Делать компрессы, спринцевания и т. д.

КАШТАН, ЦВЕТЫ ИЛИ ПЛОДЫ, НАСТОЙКА

Взять 50 г цветков или плодов каштана на 0,6 л 50% спирта. Настаивать 2 недели в теплом темном месте, взбалтывая ежедневно. Фильтровать, хранить в темном месте.

Принимать такую настойку по 30—40 капель 3—4 раза в день в течение 3—4 недель.

Препараты из конского каштана понижают свертываемость крови, укрепляют стенки капилляров и вен, предупреждают образование тромбов, в кровеносных сосудах и способствуют рассасыванию образовавшихся тромбов, тромбы постепенно размягчаются.

Препарат из плодов, цветов или коры применяется внутрь и наружно при геморрое, спазмах сосудов, нарушении секрета желчи, хронических расстройствах пищеварения, катарах бронхов, при подагре, ревматизме, ишиасе и для лечения тромбофлебита, при язвах голени и расширении вен. Экстракт рекомендуется применять и для ванн при миалгиях и невралгиях.

КЛЕВЕР КРАСНЫЙ (ЦВЕТУЩИЕ ОБЛИСТВЕННЫЕ ВЕРХУШКИ, СОБРАННЫЕ ВНАЧАЛЕ ЦВЕТЕНИЯ), НАСТОЙКА

Взять 40 г цветов настоять в 500 мл водки в течение 2-х недель. Процедить, отжать. Принимать по 20 г перед обедом или перед сном. Курс лечения 3 месяца с перерывом 10 дней. Через 6 месяцев курс можно повторить.

Применяется при атеросклерозе с нормальным артериальным давлением, сопровождающимся головными болями и шумом в ушах.

КОЛЮЧЕЛИСТНИК, НАСТОЙКА

Взять 10 г колючелистника (мелко нарезанный) на 100 мл 70% спирта, настаивать 7—10 дней, отжать, отфильтровать, хранить в темной склянке.

Принимают по 15—20 капель 2—3 раза в день.

Применяют при осците, сопровождающим цирроз печени, противовоспалительное средство при заболеваниях мочевыводящих путей.

КРАПИВА, НАСТОЙКА

Взять 200 г майской крапивы, залить 0,5 л водки или 70% спирта. Горло завязать марлей или тряпкой. Первые сутки держать на окне, а остальные 8 суток в темном шкафу. Процедить, отжать, фильтровать, хранить в темной склянке.

Принимать по чайной ложке натощак за 30 минут до еды и 1 ч. ложку на ночь перед сном. Выпить весь настой.

Человек делается бодрым, здоровым, сердце улучшает свою работу, улучшает состав крови, движения становятся легче, проходит склероз.

КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ, НАСТОЙКА

20 г корней кровохлебки на 100 мл 70% спирта настаивать 7—10 дней, фильтровать и хранить в темной склянке.

Принимают по 30—50 капель 3—4 раза в день.

Применяют при кровотечениях: кровохарканье у больных туберкулезом легких, обильные менструации, желудочные, геморроидальные, маточные кровотечения. Назначают также при энтероколитах, поносах, при анги-нах, стоматитах.

ЛЕВЗЕЯ САФЛОРОВИДНАЯ (МАРАЛИЙ КОРЕНЬ)

Из корневищ с корнями 1:1 на 70% спирте настаивают 2 недели, фильтруют, хранят в темном месте.

Принимают по 20—30 капель 2—3 раза в день за 20—30 мин. до еды, в ст. ложке воды. Курс 2—3 недели.

При физическом и психическом переутомлении, импотенции и хроническом алкоголизме, а также при раздражительности, плохом сне.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ

1. Плоды лимонника — 1:5 из спелых и высушенных на 70% спирте настаивать в течение 10 дней. Принимают по 20—30 капель 2 раза в день утром и в обед перед едой. Курс 20—25 дней.

2. Из растения лимонника — 1:3 на 70% спирте, настаивать 8—10 дней. Принимать натопок по 20—30 капель 3 раза в день после еды 2—3 раза в день в течение 20—25 дней. При астении и депрессивных синдромах, при психастении, травматической церебрастении, атеросклеротической неврастении, реактивной депрессии у атеросклеротиков. Очень хорошие результаты наблюдаются при астено-депрессивном синдроме, при гипотонии, при быстрой утомляемости, вялости, сонливости. При правильном применении препаратов побочных явлений не наблюдается.

ЛЮБИСТОК, КОРЕНЬ, НАСТОЙКА

В 250 мл водки положить корень любистока и 2 листа лавра благородного. Настоять 2 недели. Алкоголику дать выпить стакан такой настойки и этим можно вызвать отвращение к водке.

НАСТОЙКА ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ

10 г травы и корней пиона уклоняющегося на 100 мл 40% спирта.

Принимают внутрь по 30—40 капель 3 раза в день. Курс лечения 25—30 дней.

Назначают при неврастеническом состоянии, бессоннице. Повышает работоспособность, а также оказывает успокаивающее действие, обладает противосудорожным свойством.

ОСИНА, НАСТОЙКА

Почки осины настоять на водке или 70% спирте в соотношении 1:10 в течение недели.

Принимать по 25—30 капель 3 раза в день.

Применяется при остром хроническом цистите и слабости мочевого пузыря.

ПЕРЦОВАЯ НАСТОЙКА (НА КРАСНОМ ЖГУЧЕМ ПЕРЦЕ)

Берут 30 г красного жгучего перца на 200 мл водки или 70% спирта. Настоять 2 недели, процедить, отжать.

Принимать наружно как раздражающее средство для растирания при радикулитах, невралгиях, миозитах, ишиасе, промерзаниях, кашле, ревматизме, прострелах.

НАСТОЙКА ПОЛЫНИ

Готовят из высушенной мелко изрезанной травы растения на 70% спирте в соотношении сырья к извлекателю 1:5, настаивают 21 день в темном месте, процеживают.

Принимать по 20 г 1 раз в день. Принимать 2—3 раза не более.

Применяют при гастритах, протекающих с пониженной кислотностью. Рекомендуется также для повышения аппетита после перенесенных истощающих заболеваний.

ПОЧКИ БЕРЕЗЫ, НАСТОЙКА

Берут 10 г сухих почек на 100 мл водки или 70% спирта. Настоять две недели, процедить, отжать. Принимать внутрь от 15—20 капель до 1/2 ложки на воду до еды.

Применяется внутрь при несварении желудка, язве желудка, а также при водянке, возникшей от воспаления почек и при всяких иных видах почечных страданий, против мелких глистов (остриц и аскаридов), при болезнях кожи, при ревматизме, воспалении печени, при простуде, гриппе, геморрое, подагре, икоте и т. д.

При гриппе и простуде принимать в горячем виде. При холере принимать по одной рюмке каждый час до прекращения рвоты. Наружно настойку применяют для лечения ран, язв, прыщей, порезов, пролежней, при ревматизме, подагре, болях в суставах, люмбаго, в качестве натираний, компрессов, примочек. Настойка почек, разбавленная водой 1:10, применяется как втирание в кожу головы для укрепления волос.

ПРОСТРЕЛ ГАЛЛЕРА (СОН-ТРАВА)

В форме спиртовой настойки из свежего сырья 20 г на 100 мл 70% спирта настаивать, фильтровать, хранить в темном месте.

Принимают для успокоения больных истерией. При дисменорее и половом перевозбуждении, как и при повышенном тоне симпатической нервной системы. Прострел действует успокаивающе и обезболивающе.

ПУСТЫРНИК, НАСТОЙКА

Берут 20 г измельченных листьев на 100 мл 70% спирта. Настаивают 7—14 дней, фильтруют.

Принимают по 30—40 капель 3—4 раза в день.

Применяется при сердцебиениях, при неврозах, ранних стадиях гипертонии, при синдроме Меньера (уменьшается возбуждение, прекращается сердцебиение), при миокардиопатии (уменьшает одышку).

РОДИОЛА РОЗОВАЯ (ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ)

Взять 10 г корня измельченного на 100 мл 40% спирта. Настаивать 20 дней, фильтровать и сохранить в темной склянке.

Принимать по 5—10 капель 2—3 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения 10—20 дней.

В психиатрии назначают, начиная с 10 капель 2—3 раза в день, затем дозу постепенно увеличивают до 30—40 капель на прием. Курс лечения 1—2 месяца.

Не рекомендуется принимать на ночь или поздно вечером.

Также используют в качестве стимулирующего средства при астенических состояниях, повышенной утомляемости, неврастении, вегетативно-сосудистой дистонии. Его могут принимать и практически здоровые люди при пониженной работоспособности, импотенции.

Препарат имеет противопоказания, поэтому применяют его только по назначению врача.

РЯСКА МАЛЕНЬКАЯ, НАСТОЙКА

Взять чайную ложку свежей, хорошо вымытой травы на 50 мл водки. Настоять 7 дней, процедить отжать.

Принимать по 15—20 капель в 1/4 стакана воды 3 раза в день.

Применяется при витилиго, как десенсибилизирующее средство при аллергических заболеваниях, при крапивнице, ангионевротическом отеке (отек нервного происхождения).

САБЕЛЬНИК (ДЕКОП), НАСТОЙКА

Сухие стебли сабельника нарезать длиной 1—2 см. Насыпать в бутыл 1/3—1/2 и залить водкой или спиртом 70%. Настоять 21 день в темном месте.

Принимать от 1 ч. ложки до 1 ст. ложки 3 раза в день до еды на воде. В особо тяжелых случаях принимать по 1 небольшой рюмке 3 раза в день. Пить желательно в холодное время года. Этой же настойкой растирают больные суставы и делают компрессы. Считается, что для того, чтобы был результат от лечения, надо выпить 2 поллитровые бутылки этой настойки.

Применяется при ревматизме и полиартрите.

СИРЕНЬ, НАСТОЙКА

Взять 100 г свежих молодых листьев сирени, засыпать в бутыл, залить 1 литром водки. Настоять в темном шкафу 14 дней.

Принимать 1 ч. ложку до приступа, на другой день 1 ч. ложку во время приступа, на третий день 1 ч. ложку после приступа.

Малярия и лихорадка пройдет бесповоротно. При ревматизме, отложении солей в суставах можно принимать по 50 капель 3 раза в день.

Также принимать по 30 капель 3 раза в день до еды. Курс лечения 3 месяца. Этой же настойкой делать растирания и компрессы. Применяется при подагре, отложениях солей.

НАСТОЙКА СОФОРЫ

Свежие плоды (бобы) софоры залить 70% спиртом в соотношении 1:1 (весовое соотношение). Настоять 21 день в темном месте. Процедить, отжать. Применять, как указано выше. Сухие плоды настоять на водке в соотношении 1:2. Настаивать и употреблять так же. Настойку хранить в сухом, темном и прохладном месте.

Применяется внутрь от 10 капель 4—5 раз в день, до 1 ч ложки 2—3 раза в день. Применяется для профилактики внутренних кровотечений разного происхождения, в частности, в мозг и сердце, сетчатку глаз; при стенокардии, гипертонии, сахарном диабете, склеротическом перерождении стенок и кровеносных сосудов, при болезнях почек, геморрагических диатезах, язвенном заболевании желудка и 12-перстной кишки, при гастритах и язвенных колитах, поносах, болезнях печени, сыпном тифе, сепсисе, тромбофлебитах, геморрое, ревматизме, глистах, капиллярных кровоизлияниях токсического происхождения (отравления мышьяковыми препаратами, салицилатами) одновременно с витамином С, туберкулезе в ранней стадии, болезнях почек. Настойку применять при лечении ожогов I и II степени наружно, заживление наблюдается в течение 5—6 дней, при ожогах III степени наступает постепенное рубцевание хронических язв. Настойка оказывает болеутоляющее действие при ушибах, легких и средних ранениях, при фурункулезе и карбункулах, при туберкулезе кожи (красная волчанка), хронических сухих плевритах, с успехом применяется при чешуйчатом лишае, ячменях на веках глаз, грибковых заболеваниях, экземах, обморожении и т. д.

Смазывание кожи головы 5—10% водным раствором настойки софоры способствует прекращению выпадения волос.

Софора применяется для промывания гнойных полостей, орошения ран, наложения салфеток и тампонов, смоченных в настойке софоры, при трофических язвах, парапроктитах (воспаление клетчатки вокруг слепой кишки), при груднице (маститях) и т. д.

СТАЛЬНИК ПОЛЕВОЙ

Корни стальника 20 г на 100 мл 70% спирта, настаивать 7—10 дней, фильтровать и хранить в темной склянке, в прохладном, защищенном от света месте.

Принимают по 1 чайной ложке 2—3 раза в день перед едой.

Используют в качестве слабительного. Настойка оказывает нехотное гипотензивное и кардиотоническое действие, уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает тонус кишечника, принимается при геморрое, хроническом запоре, при трещинах сфинктера, снижает А/Д, боли, отек геморроидальных узлов, прекращает кровотечение. Используют

также в качестве мочегонного средства при мочекаменном диатезе, подагре, воспалительных заболеваниях почек и мочевого пузыря, при мочекаменной болезни.

СТЕРКУЛИЯ ПЛАТАНОЛИСТНАЯ

Настойка стеркулии готовится из листьев растений, измельченных, 20 г на 100 мл 70% спирта. Настаивают 2 недели, фильтруют и хранят в темной склянке.

Назначают внутрь по 20—30 капель 2—3 раза в день утром и днем.

Курс лечения 3—4 недели.

Применяют в качестве тонизирующего и возбуждающего средства, при астенических состояниях после хронических, истощающих заболеваний, при физическом или умственном переутомлении, а также при гипотонии. Вечером принимать не рекомендуется.

СТОЛЕТНИК, ЛИСТЬЯ, НАСТОЙКА

Нарезать и залить до половины листьями столетника 0,5 бутылки и засыпать сверху сахарным песком. Обвязать горло марлей. Настоять 3 дня, затем налить туда водки доверху, завязать марлей, снова настоять 3 дня. Процедить, отжать. Получится сладко-горький ликер.

Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды. Ребенку принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день до еды. Принимать до полного выздоровления.

Применяется при ангине, гландит и болезнях легких.

УКРОП, СЕМЕНА, НАСТОЙКА

Взять 50 г семян укропа, варить 15—20 минут на малом огне и 0,5 л вина "Кагор" или "Портвейн". Настоять, укутав, 1 час. Процедить отжать.

Принимать 50—60 г перед сном. Народное средство, безвредно.

Применяется при бессоннице, обеспечивает хороший сон.

ХМЕЛЬ, НАСТОЙКА

Взять 1 часть измельченных шишек хмеля на 4 весовых части водки или 50% спирта. Настоять 2 недели в темном месте, процедить, отжать.

Принимать по 5 капель настойки на 1 столовую ложку воды. Принимать 2 раза в день до еды. Второй раз пить на ночь. Применяется при бессоннице.

ЧЕСНОК, НАСТОЙКА

1/3 бутылки наполнить мелко нарезанным (или кашицей) чесноком. Залить водкой или 70% спиртом. Настоять 14 дней в темном месте, ежедневно взбалтывать.

Принимать по 5 капель 3 раза в день до еды на чайную ложку холодной воды.

Очищает кровеносную систему от всевозможных отложений, снимает повышенное давление, очищает желудок, благотворно действует при спазмах сосудов головного мозга.

ШЛЕМНИК БАЙКАЛЬСКИЙ

Взять растения 20 г на 100 мл 70% спирта, настаивать в течение 10—15 дней, фильтровать и хранить в темной склянке. Хранят в защищенном от света месте.

Назначают 20—30 капель 2—3 раза в день перед едой.

Применяют при гипертонии I—II степени, при функциональных расстройствах нервной системы, при сердечно-сосудистых неарозах, улучшает сон, исчезают болевые ощущения в области сердца.

ЭВКАЛИПТ, НАСТОЙКА

Настойка эвкалипты обладает противовоспалительным, отхаркивающим, сильным антисептическим, обезболивающим действием. Применяется внутрь при различных кашлях, заболеваниях дыхательной системы, при малярии, острых желудочных, кишечных заболеваниях, при гриппе, простудных заболеваниях.

Применять настойку внутрь по 20—30 капель на 1/4 стакана кипяченой остуженной воды 3 раза в день. Наружно настойка применяется для полоскания и ингаляции при болезнях горла и дыхательных путей (ангина, ларингиты, насморк, трахеиты, катаральные и гнойные бронхиты, абсцессы легких). Настойку применяют для примочек и промывания при гнойных язвах, рожах, абсцессах, флегмонах, гнойных маститах и некоторых гнойничковых заболеваниях кожи. Для спринцеваний при эрозии и язвах шейки матки. Для этого 1 чайную ложку настойки разводят в 1 стакане кипяченой, чуть теплой воды. Настойка применяется для растирания при радикулите, при невралгии, ревматических болях.

Настойка эвкалипта продается в аптеках.

ЭВКОМИЯ, НАСТОЙКА

Размельчить 20 г коры эвкомии, настаивать на 30% спирте 100 мл. Настаивать 10 дней. Отфильтровать и хранить в темном прохладном месте в темной склянке.

Принимать по 15—30 капель 3 раза в день.

Применяется при подагре, болезнях печени и почек и для ускорения сращений переломов.

ЭЛЕУТЕРОКОКК

Готовят настой из высушенных измельченных корней на 40% спирте.

Взять 150—200 г корней, настаивать на 1 литре 40% спирта при частом взбалтывании в течение 2 недель.

Принимают по 1/2 чайной ложки 2—3 раза в сутки.

Улучшает общее состояние, снижает содержание холестерина при атеросклерозе с преимущественным поражением аорты и коронарных сосудов. Создает благоприятный фон при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ревмокардите. Повышает умственную работоспособность человека, уменьшает утомляемость при физической нагрузке, улучшает слух и зрение.

МАСЛА

В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ

БАГУЛЬНИКОВОЕ МАСЛО

На 100 г оливкового или подсолнечного масла берут 1 ст. ложку с верхом измельченного багульника. Настаивать 21 день в темном месте, ежедневно взбалтывая. Процедить, отжать. Закапывать по 2—3 капли в каждую ноздрю в первый раз. Потом закапывать по 1 капле 3—4 раза в день. Делать не более недели. Насморк проходит через несколько дней.

ЗВЕРОВОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ

1. 20 г цветков (свежих) заливают 200 мл оливкового масла и настаивают в течение 40 дней. По 1—2 чайной ложке за 30 мин. до еды, 2—3 раза в день.

Принимают при язвенной болезни и при стоматитах, пародонтозе, фарингитах, а также при заболеваниях желчных протоков и при почечно-каменной болезни, как болеутоляющее и глистогонное средство.

2. Зверобойное масло. Полстакана свежих цветов и листьев зверобоя (измельченных) настоять на стакане миндального, подсолнечного, оливкового или льняного масла в течение трех недель. Отжать, процедить. Хранить в прохладном месте.

Применяется зверобойное масло при ожогах (радикальное средство) даже если поражено 2/3 поверхности тела, на пораженные места делаются масляные компрессы при долго незаживающих ранках, язвах, нарывах, гнойниках, воспалениях, разрыхлениях слизистой оболочки рта, смазывают раны, полученные от укуса здоровой собаки или кошки, высыпаний на губах после простуды.

КАЛЕНДУЛА (МАСЛО)

1 г цветных корзинок на 100 мл оливкового масла. Настаивать на 20—25 дней.

Применяют при ранах и ушибах во избежание образования рубцов.

МАСЛО ЛИЛИИ

Берутся свежие лепестки цветка лилии, кладут в темную бутылку и заливают охлажденным кипящим растительным маслом и оставляют в темном месте 2 недели. Употребляется при ожогах.

МЕНТОЛОВОЕ МАСЛО

Ментоловое масло (аптечный препарат) 2% и 4%. Применяется при насморке по 2—3 капли в каждую ноздрю. Маслом смазать уголки крыльев носа при насморке. Детям до 3 лет не применять.

При головной боли простудного характера, при прострелах в голове, при мигренях смазать ментоловым маслом лоб, виски, темя, за ушами и сзади, под черепом (где ямка). При начинающемся насморке продсать то же самое. На ночь очень полезно смазывать дыхательные пути (нос) ментоловым маслом. Это прекрасная дезинфекция очень освежает и предохраняет от насморка.

Люди, не переносящие жары летом, могут смазывать открытые части тела (особенно лицо) ментоловым маслом, смешанным пополам с вазелином. Наносить тонким слоем.

ОБЛЕПИХОВЫЕ МАСЛА

Получение облепихового масла в домашних условиях:

а) из ягоды выжимают сок и отстаивают его в холодном месте. Масло при отстаивании всплывает на поверхность и его снимают. Полученное таким образом масло считается наиболее качественным.

б) оставшийся после выжимания сока жмых дополнительно измельчают, заливают растительным маслом, настаивают и отделяют обычным прессованием. Это масло более светлое и ценится оно гораздо ниже.

в) из ягоды выжимают сок, оставшийся жмых сушат, измельчают в кофемолке, заливают оливковым маслом, настаивают 2—3 недели, затем фильтруют и хранят в темном месте в темной склянке.

Облепиховое масло применяют при лучевых повреждениях кожи, раке пищевода.

Назначают по 1—1,5 чайной ложки 2—3 раза в день в течение всего курса лечения и затем еще 2—3 недели дополнительно после его окончания.

При лечении язвы желудка назначают по 1 чайной ложке 2—3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 1 месяц.

При лечении эрозий шейки матки применяют ватные тампоны, обильно смоченные маслом (5—10 мл на тампон). Тампоны меняют ежедневно, извлекают через 16—24 ч. При колитах курс лечения 10—15 процедур. При эрозии шейки матки 8—12 процедур. При необходимости можно повторять курс лечения через 1—1,5 месяца.

Облепиховое масло применяют также при ожогах, трофических язвах и заболеваниях кожи. Успешно применяют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при трещинах ануса, внутреннем геморрое.

Принимают также при гайморите, при хроническом тонзиллите, атеросклерозе.

ПИХТОВОЕ МАСЛО

Пихтовое масло получают из хвои и молодых побегов пихты. Этот ценнейший экстракт люди издавна используют как дезинфицирующее, косметическое и лечебное средство очень высокой биологической активности. Это экологически чистый продукт, поскольку пихта может расти только в условиях кристально чистого воздуха, свободного от загрязненности и ды-

ма промышленных зон. Такие места сохранились в районах Красноярского края, Хакасии, Тувы и других регионах Восточной Сибири, где ведется производство пихтового масла.

Ниже приводятся некоторые рецепты применения пихтового масла, подтвердившие свою эффективность при лечении многих заболеваний после длительной врачебной и народной практики.

Ангина.

Нанести чистое масло на гланды с помощью пипетки, ватного тампона или оросить их шприцем. Повторить от 2 до 5 раз в день с интервалом 4—6 часов. При хронической ангине, помимо смазывания гланд, закапать в нос 1—2 капли масла. При этом появится жжение, чихание, слезотечение, выделение мокроты из носа. Через 15—20 минут эти неприятные ощущения пройдут, но лечебный эффект будет выше.

Воспаление легких (пневмония), бронхит.

Сочетать втирание с ингаляцией. В домашних условиях добавить 3—4 капли масла в эмалированную кастрюлю с кипятком, вдыхать пар, накрыв голову. После ингаляции растереть маслом грудь и накрыться теплым одеялом. Для ингаляции можно также применять ингалятор Махольда.

Грипп, ОРЗ и другие простудные заболевания (особенно у детей).

Втирать масло в воротниковую зону спины, грудь, делать массаж стоп с маслом по рефлекторным зонам 4—5 раз в течение суток через 5—6 часов. После каждой процедуры обернуть больного компрессной бумагой, накрыть теплым одеялом, дать потогонный настой из сбора трав, надеть теплые носки. Можно закапать по 1 капле в каждую ноздрю.

Днатез у детей.

Смешать 1 часть пихтового масла и 3 части детского хрема или оливкового масла с добавлением витамина С. Можно приготовить мазь из 3 частей пихтового масла, 3 частей серной мази и 4 частей детского хрема. Смазывать пораженные участки кожи.

Кожные болезни.

Пихтовое масло зарекомендовало себя как прекрасное ранозаживляющее и противоожоговое средство. Во многих случаях достаточно пропитать маслом салфетку и наложить ее на рану или ожог. Однако при некоторых дефектах или заболеваниях кожи рекомендуются другие способы лечения.

Мокрая экзема.

Приготовить мазь на любой жировой основе в пропорции 3—4 части масла и 6—7 частей жира. Смазывать пораженные участки кожи 2 раза в сутки. Лечение от 8 до 12, иногда до 24 дней.

Обработка ран.

Порезы, царапины смазываются чистым маслом для предотвращения нагноения. Раны большой площади обрабатывать маслом нельзя.

Ожог третьей степени "А" и "Б".

Приготовить эмульсию из 3 частей масла и 7 частей спермацета для смазывания. В бытовых условиях можно приготовить мазь в той же пропорции на любой жировой основе. Смазывать 2—3 раза в сутки.

Парадонтоз, зубная боль и другие заболевания ротовой полости. Тампон из ваты или бинта смочить маслом и приложить к больному зубу или воспаленной десне на 10—20 минут. В случае зубной боли повторить через 1,5—2 часа; при парадонтозе требуются 15—20 аппликаций с повторением курса через 6 месяцев. При тяжелой форме парадонтоза допустимо проведение третьего курса, также через 6 месяцев. Не допускать ожога слизистой оболочки!

Переломы, ушибы. Втирание пихтового масла в область перелома или ушиба ускоряет процесс сращения кости и заживления. Внутрь принимать мумие-асиль по 0,5 г утром и на ночь. Периодичность втираний — 2 раза в день.

Радикулит, плексит, ишиас, миозит и другие заболевания периферической нервной системы. Втирать в область сильных болевых ощущений небольшое количество масла. Эффективность лечения повышается при втирании после принятия ванны или прогревания больных мест. Курс лечения 10—15 процедур. То же рекомендуется при болях в ногах, голеностопе, коленном суставе.

Ревматоидный полиартрит, артриты простудного характера.

Втирать чистое пихтовое масло в предварительно прогретые (компрессом из разогретой морской соли) суставы. После втирания компресс повторить.

Сильный кашель.

Чистое масло закапать из пипетки на корень языка по 3—5 капель утром и перед сном.

Чирии, фурункулы, карбункулы, панариции.

Приготовить смесь из 7 частей пихтового масла и 3 частей мази Вишневского. Нанести полученный состав на бинт и приложить к пораженному месту, прикрыть компрессной бумагой и завязать. Повязку менять 2—3 раза в сутки. В местах с грубой кожей можно делать повязки с компрессом из чистого пихтового масла, но при этом возможен слабый ожог.

Женщины найдут в пихтовом масле идеальное косметическое средство, которое в короткий срок поможет избавиться от морщин и дряблости кожи благодаря его омолаживающему воздействию на клетки организма. Это свойство пихтового масла особенно ощущается после приема горячей (38°C) ванны с добавлением в нее 3—5 капель: через 15—20 минут появляется чувство легкости, молодости, исчезает усталость, снимается стресс. Более длительное нахождение в пихтовой ванне помогает расслаблению мышц, быстрому засыпанию. Сон при этом становится спокойным и глубоким.

Такие процедуры благотворно влияют на центральную нервную систему, помогают избавиться от бессонницы и неврозов. При этом отмечается восстановление гетерогенной активности коры головного мозга.

Широкие возможности заключены в пихтовом масле как лечебном препарате. В народной медицине, например, оно с успехом применяется при лечении гинекологических и урологических заболеваний. Врачи, применяющие в своей практике пихтовое масло, рекомендуют его во многих других случаях. На сегодня единственным противопоказанием применения пихтового масла является обнаруженная недавно его эмбриотоксичность. Поэтому оно не рекомендуется женщинам в период беременности.

Распыление пихтового масла в помещениия способствует уничтожению болезнетворных микробов, устраняет неприятные запахи в туалетах, кухнях, оставляет тонкий аромат хвойного леса и жилых и ванн комнат. Это — незаменимый натуральный дезодорант, снижающий потоотделение.

Противопоказание: не рекомендуется людям с сердечным заболеванием и женщинам в период беременности.

ЧЕСНОЧНОЕ МАСЛО

Головку чеснока средних размеров очистить, растолочь и кашпцу. Сложить в стеклянную банку и залить стаканом нерафинированного подсолнечного масла. Поставить в холодильник вниз. На следующий день взять лимон, помыть, срезать шишку (от места, откуда растет), выдавить чайную ложку лимонного сока и слить в столовую ложку. Туда же добавить чайную ложку чесночного масла, размешать.

Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс от 1 до 3 месяцев, затем месяц перерыв и курс повторить.

Снимает спазмы сосудов головного мозга, сердечные спазмы, одышки, назначается при склерозе. Прекрасное сосудорасширяющее средство.

ПОЛЕЗНЫЕ

С О В Е Т Ы

СРЕДСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЫБНОЙ КОСТИ ИЗ ГОРЛА

Рыбью кость из горла удобно извлечь при помощи восковой свечи. Один конец свечи растапливается на огне и быстро (пока не застыл) прижимается к торчащему концу кости. Через полминуты воск застывает, кость в нем закрепляется и легко извлекается вместе со свечой.

КАК ИЗВЛЕЧЬ НАСЕКОМОЕ ИЛИ КАМЕШЕК ИЗ УХА

1. Наполнить ухо растительным маслом. Затем сравнительно слабой струей теплой воды спринцевать ухо, пока камешек не вылетит оттуда. Для извлечения насекомого надо наполнить ухо, капля за каплей, растительным маслом, и насекомое (живое или мертвое) покажется на поверхности. Конечно, больной должен лежать больным ухом кверху во время лечения. При повороте головы больного масло из уха выльется.

2. Вымочить лист табака в воде, выжать сок из табака в чашечку и при помощи пипетки, капля за каплей, наполнить ухо пациента. На поверхности табачного сока появится блоха. После извлечения блохи зуд прекратится.

МАЛЕНЬКАЯ ПОМОЩЬ ЭПИЛЕПТИКАМ

Когда начинается припадок эпилепсии, следует положить левую руку эпилептика на пол и наступить на мизинец левой руки; припадок обычно скоро кончается.

ОТ БОЛЕЗНЕННОГО ОЩУЩЕНИЯ ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕГО КУТЕЖА

После сильного опьянения на другой день часто наблюдается странная тяжесть головы, невероятно скверное ощущение в желудке и т. п. Налить 20 капель мятного спирта на стакан холодной воды и выпить сразу. Через 1—2 минуты — полное избавление от всех последствий вчерашнего кутежа.

ДЛЯ ОТРЕЗВЛЕНИЯ МЕРТВЕЦКИ ПЬЯНОГО

а) налить 5—6 капель нашатырного спирта на стакан холодной воды и выпить. Если кто-либо мертвецки пьян, то разжать ему рот и влить.

б) взять у лежащего на спине мертвецки пьяного голову так, чтобы ладони рук были наложены на уши. Быстро и сильно тереть оба уха. Прилив

кровя к голове приведет пьяного в полное сознание через 1 минуту, и он будет даже в состоянии сказать свой адрес.

АЛКОГОЛИЗМ

1. Золототысячник — 1 часть

Полынь горькая (травя) — 1 часть

Чабрец — 1 часть

Засыпать 15 г смеси на 200 мл кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день при алкоголизме.

2. Клоп лесной, зеленый (водится в малине).

Клоп издает резкий неприятный запах.

Поймать несколько клопов, настоять на водке. Дают пить человеку, страдающему алкоголизмом. Это вызывает у него отвращение к алкоголю. Больному об этом не говорить.

3. Любисток (корень)

В 250 г водки положить корень любистка и 2 листа лавра благородного. Настоять 2 недели. Алкоголику дать выпить стакан этой настойки и этим можно вызвать отвращение к водке.

4. Копытень (корни)

1 столовую ложку измельченных корней копытня на стакан воды. Кипятить 10—15 минут на малом огне. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. 1 столовую ложку отвара корней копытня влить в 1 стакан водки. Дают пить эту водку пьянице. Такая смесь водки с копытнем вызывает рвоту и якобы сильное отвращение к алкоголю. На некоторых пьяниц этот способ действует исплохо. Точно соблюдать дозировку, так как растение ядовито. О том, что в водке есть что-то подмешанное, пьяница не должен знать.

ОПЬЯНЕНИЕ

1. Мята (настойка)

20 капель настойки мяты на стакан холодной воды. Выпить все сразу. Быстро проходит опьянение, снижаются головные боли и тяжесть в голове.

2. Нашатырный спирт

5—6 капель нашатырного спирта на стакан холодной воды. Выпить за 1 прием. Применяется для отрезвления выпившего человека.

3. Чай

Перед тем, как идти в гости и для того, чтобы не захмелеть, надо выпить бокал хорошо заваренного с мятой зеленого или черного чая. После приезда домой или в гостях снова повторить чаепитие. Опьянение вскоре проходит.

4. Кофе черный

Перед ожидающимся застольем выпить чашечку хорошо заваренного черного кофе (по-турецки) с лимонным соком или ломтиком лимона. После застолья повторить такую же процедуру. Опьянение быстро проходит.

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ

Новейший рецепт профессора, доктора медицинских наук А. Т. Филатова.

1 ст. ложку листьев эвкалипта залить 0,5 литра кипятка, настоять 1 час, добавить 1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку глицерина. Принимать по 1/4 стакана 7 раз в день. Курс лечения — 30 дней.

ДУРНОЙ ЗАПАХ ИЗО РТА

1. Белая ольха

Приготовить отвар из 20 г листьев, мелко нарезанных, и 0,5 л воды, варить 20 мин., процедить и остудить, затем полоскать рот.

2. Мята

Столовую ложку листьев мяты на 0,5 л кипятка настоять в течение часа. Применять для полоскания рта.

3. Гвоздика

Иметь с собой гвоздику (сухую) и 1—3 раза в день класть в рот и оставлять между зубами и щекой.

4. Ромашка

Применять в виде свежеприготовленного чая — 2 ст. ложки ромашки (лекарственной), варить 5 мин. в 0,5 л воды.

НАРОДНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Для очищения организма лекари русской народной медицины зачастую советуют своим пациентам принимать полевой хвощ. Высушенный и мелко нарезанный полевой хвощ заваривается, и его пьют, как чай.

ЦЕННАЯ ДИЕТА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

1-ю неделю есть 3 раза в день вместо завтрака, обеда и ужина по 2 апельсина и 3 яйца, сваренных вкрутую (обязательно варить 12 минут). Во 2-ю, 3-ю и последующие недели есть ту же самую пищу и в той мере, но помимо этого можно есть неограниченное количество сырых овощей и сырых фруктов. Автор данного средства похудения много раз применял его с большим успехом. Он правильно замечает, что апельсины дадут все нужные витамины, а яйца — протейны и пр.

СРЕДСТВО ОТ ВРОСТАНИЯ НОГТЕЙ

Случается, что ноготь, в особенности на большом пальце ноги, врастает в мякоть и острыми краями причиняет сильную боль, и главным образом тогда, когда человек находится в движении. Следует взять кожаный напалок, что часто надевают поверх повязки пораненного пальца руки. Набить

напалок дополна коровьим маслом и ежедневно перед сном надевать его на палец ноги. Делать это 2—3 недели подряд. Ноготь размякнет, и боли прекратятся. После того, как боли прекратятся, следует при помощи перочинного ножа осторожно приподнять угол растающего ногтя, подкладывая под ноготь кусочки марли или промакательной бумаги. После поднятия растающего ногтя на значительное расстояние перевязать палец. Дикое мясо осядет вниз, больное место заживет, а боль прекратится. Для предупреждения повторения врастания ногтя следует носить обувь большего размера и более просторную, иногда приходится прорезать дыру над больным пальцем в чулке и ботинке и выставлять голый палец наружу на некоторое время.

ОТ МОЗОЛЕЙ

1. Вымочить луковую шелуху в уксусе в течение по меньшей мере 2 недели. Наложить на мозоль слой шелухи толщиной, по крайней мере, в 1,5 мм и завязать на всю ночь. Повторить несколько раз, и... мозоли исчезнут. Однако следует заметить, что целебная сила описываемого средства зависит в значительной мере от качества уксуса.

2. Это старинное народное и потому верное средство.

Надо перед сном распарить ноги в горячей воде, затем вытереть досуха и привязать к мозоли корку лимона с небольшим количеством лимонной мякоти на этой корке. Лучше всего срезать небольшую "горбушку" лимона, которую и привязать к мозоли.

Через 4—5 дней мозоль должна сойти полностью.

СРЕДСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА

В народном говоре средство это называется огуречной водой. Нарезав огурцы ломтиками, сложить их в бутылку и залить хорошей очищенной водкой или разбавленным антекарским спиртом. Выстаивать 2 недели на солнце. После этого огуречная вода готова. Ее употребляют неразбавленной, смачивая в ней полотенце и обтирая им лицо. Огуречная вода считается лучшим народным средством для смягчения кожи лица.

ДЛЯ ОМОЛАЖИВАНИЯ ЛИЦА

Настоять липовый цвет — 1 ст. ложку на стакан кипятка. Затем добавить 1 чайную ложку меда. Смазать лицо и шею на 15 мин. Процедуру повторить на следующий день.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Один сырой яичный желток, чайная ложка меда и 1 чайная ложка глицерина. Все это смешать и намазать на лицо часа на 2, а потом смыть. Лицо очень освежается и расправляются морщинки. Оставшуюся смесь мож-

но держать несколько дней в холодильнике. Маску можно повторять 2—3 раза в неделю. Для свежести и питания кожи лица очень хорошо намазывать на несколько минут разные фруктовые соки, соки овощей, молоко, сметану, сливочное масло — вообще надо давать коже питание. Через несколько минут смыть все с лица.

МАСКА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Взять липового цвета, листьев мяты перечной, цветков ромашки, лепестков шиповника или розы, в равных по объему частях. Измельченные растения залить кипятком в соотношении 1:2. После кипячения 1,5—2 мин. отвар остудить, в теплом виде, заложив между слоями марлевых или бинтовых отрезков, накладывать на чистое лицо. Оставить маску на лице 15—20 мин., затем обмыть лицо теплой водой.

МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Взять зверобой, листья щавеля, листья мать-и-мачехи, цветочные корзинки клементулы в равных по объему частях. Измельченные растения залить кипятком в соотношении 1:2. После кипячения 1,5—2 мин. отвар остужают, в теплом виде заложив между слоями марлевых или бинтовых отрезков, накладывают на чистое лицо. Держать маску на лице 15—20 мин., затем обмыть лицо теплой водой.

ВЕСНУШКИ

1. Одуванчик

Приготовить отвар — 2 столовые ложки одуванчика варить в 300 мл воды 15 мин., затем процедить и остудить. Этим отваром обмывать лицо.

2. Лук репчатый

Протирать лицо свежей луковицей ежедневно до исчезновения веснушек.

3. Огурец

Выжать сок молодого огурца, смазывать соком пигментные пятна 2—3 раза в день в течение нескольких недель.

4. Хрен

Приготовить кашку из корней хрена и накладывать на участки кожи с веснушками 1—2 раза в день.

5. Перушка, огурцы, лимон, лук

Для бесцветивания веснушек можно применять такие давно известные средства как свежий сок петрушки, сок свежих огурцов, лимонный сок, сок репчатого лука, 1% раствор столового уксуса, взбитый пополам с белком куриного яйца.

МОРЩИНЫ НА КОЖЕ ЛИЦА

1. Приготовить пасту из 50 г тертого миндаля, 12,5 г яичного желтка, 12,5 г глицерина, 10 мл спирта, 1 г тимола и 1,5 г камфоры, все смешать с водой и довести до пастообразной консистенции.

Пасту накладывать на морщины на 1—1,5 часа. После чего кожу вымыть и вытереть досуха.

2. Взять глубокий сосуд, поместить в него 30 г ромашки, 20 г мяты, 20 г салициловой кислоты (очень мелкой), 10 г розмарина и залить одним литром хорошего вина.

Выдерживать смесь 15 дней, процедить и жидкостью тщательно протирать кожу лица каждый вечер в течение 15 дней. Лечение можно повторить многократно после короткого перерыва.

3. Фруктовая смесь

Взять 0,5 г салициловой кислоты (очень мелкий порошок), сок огурца 50 г и 200 мл спирта 40° (или водки). Этой смесью обтирать лицо каждый вечер в течение 20—30 дней. При сухой коже спирт необходимо заменить вином, т. к. спирт может раздражать кожу. После проведения указанных процедур рекомендуется применять маски из лекарственных трав, особенно из зверобоя, ромашки и мать-и-мачехи. Календула также подходящее средство для масок. Также рекомендуется и лен в форме маски — по одной маске в неделю.

ОТ СОЛНЕЧНОГО ЗАГАРА И ОТ ДЕЙСТВИЯ СИЛЬНОГО ВЕТРА

Солнце и ветер могут сильно обезобразить лицо, если не применять какой-либо помады. Вот лучшее народное средство, которое совершенно безвредно для кожи.

Взять темного сырого желтка из свежего куриного яйца на ладонь и обильно смазать лицо. Когда желток затвердеет на лице, его следует смыть водой с мылом. Результат всегда великолепный.

ПРИ ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС

1. Травя (ветки) можжевельника

Указанную траву смешать поровну с листьями березы. Горсть смеси вскипятить в 3-х литрах воды 5 минут. Укутать на час потеплее. Этим отваром мыть голову и ополаскивать. Укрепляет волосы.

2. Лук

Взять небольшую головку лука, очистить ее, натереть на терке, кашицу завернуть в марлю, сложенную в несколько раз. Втирать в кожу головы. Через несколько часов промыть, сполоснуть голову. Желательно при этом остричься покороче. После нескольких процедур исчезает перхоть, пропадает зуд, волосы укрепляются, цвет восстанавливается, волосы становятся эластичными, мягкими.

3. Луковый сок

Втирать луковый сок с коньяком и крепким сгущенным отваром корней лопуха. На одну часть коньяка следует брать 4 части лукового сока и 6 частей отвара корней лопуха. Считается в народе хорошим средством.

4. Облепиха крушиновидная

Настой плодов и листьев употребляют внутрь и наружно как средство, укрепляющее волосы при облысении.

2 столовые ложки плодов и листьев заварить 2 стаканами кипятка, настоять 2—4 часа в плотно закрытой посуде, процедить. Пить по 150 мл 2 раза в день до еды утром и вечером. Втирать в кожу головы на ночь ежедневно.

5. Касторовое масло

Касторовое масло смешать поровну с 96-градусным спиртом. Втирать ватным тампоном в кожу головы. Через 3—4 часа промыть голову детским или ланолиновым мылом. Ополоснуть подкисленной водой. Подкисленная вода делается так: в воду для полоскания выжимается сок 1/2 лимона или 1—2 столовые ложки уксуса.

6. Корень лопуха

Смесь из 20 г лопуха на 200 мл воды варить на слабом огне до половины первоначального объема, так, чтобы отвар был сгущенным. Затем смешать его пополам со свиным или нутряным жиром путем подогревания, слить в горшок, закрыть крышкой, обмазать тестом и поставить в печь или духовку на несколько часов. После с остывшей загустевшей маесы слить воду, если она есть. Мазь является хорошим средством для ращения волос. Еще лучше смазывать кожу головы свежим соком лопуха. Выкопать корни, промыть быстро холодной водой. Очень быстро натереть на терке и отжать сок. Делают это быстро потому, что натертый корень очень быстро окисляется на воздухе и темнеет. Этот сок можно законсервировать спиртом. При втирании такого сока надо разбавлять его пополам с водой. Втирать 2—3 раза в неделю.

7. Береза белая

Отваром из листьев березы моют голову при выпадении волос.

8. Крапива двудомная

При усиленном салоотделении, перхоти, выпадении волос рекомендуется после мытья головы и подсушивания волос втереть в кожу головы настоем листьев крапивы: столовую ложку листьев заварить стаканом кипятка, настоять 1,5 часа, процедить. Применять 1 раз в неделю длительное время.

9. Крапива

100 г измельченных листьев залить 0,5 л воды и 0,5 л уксуса. Варить 30 минут. Когда остынет, отжать. Этим отваром мыть голову вечером перед сном без мыла.

10. Костянка

Все растение с корнем. Отваром растения с корнем моют голову при перхоти и для ращения волос.

11. Черноголовка обыкновенная

3 столовые ложки травы кипятить 10 минут в закрытом литровом сосуде. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. Употреблять для мытья головы при перхоти и для ванн и обмывания при воспалительных процессах. Отвар травы считается эффективным средством при перхоти головы.

12. Полынь черная

Отвар черной полыни, если им мыть лицо дважды в день, способствует росту волос (бороды) на лице.

13. Сбор № 1

Чабрец — 20 г

Кора ивы — 20 г

Кора дуба — 20 г

4 столовые ложки смеси кипятить 15 минут в одном литре воды. Остудить, процедить. Втирать в кожу головы при облысении.

14. Сбор № 2

Кора ивы — 20 г

Корень лопуха — 20 г

4 столовые ложки кипятить в одном литре воды. Остудить, процедить. Втирать в кожу головы при выпадении волос, при перхоти и зуде кожи.

15. Сбор № 3

Корневище аира — 20 г

Корень лопуха — 20 г

Цветки ноготков — 20 г

Шишки хмеля — 20 г

Смесь заварить в одном литре кипятка. Настоять 2 часа, процедить. Смачивать голову на ночь при выпадении волос.

16. Сбор № 4

Листья крапивы — 30 г

Листья мать-и-мачехи — 30 г

Корневища аира — 30 г

6 столовых ложек смеси кипятить 10 минут в одном литре воды. Укутать на один час потеплее. Когда остынет, процедить. Отваром мыть голову три раза в неделю при перхоти и выпадении волос.

17. Лимон или уксус

Ополаскивать волосы надо несколько раз теплой водой с добавлением натурального лимонного сока или столового уксуса: на один литр воды 2 чайные ложки лимонного сока или 2 столовые ложки уксуса.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС

1. Взбить свежее яйцо с небольшим количеством воды и прибавить щепотку буры. Этим мыть волосы.

2. Растопить 20 г хорошего туалетного мыла в 160 мл одеколona и прибавить 20 мл дистиллированной воды. Держать в плотно закрытой бутылке.

ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ПТОМАИНОМ

Чай из корицы — самое надежное средство лечения при отравлении птомаином.

Способ приготовления: кипятить в течение 5 минут несколько палочек корицы. Остудить в течение 3 минут, процедить и выпить от 2 до 3 чашек, пока чай еще горячий. После принятия больным этого средства советуем обратиться к врачу. Главным образом потому, что причин отравления существует очень много, и каждое отравление требует своего лечения. Однако чаще всего в житейском быту встречается отравление птомаином.

П р и м е ч а н и е. Обывателю трудно разобраться в разновидностях отравления и лучше обращаться к врачу, ибо очень рискованно ошибиться и принять не то средство. Отравление часто кончается смертью. Самым распространенным в России средством при отравлении металлическими

ядами (медью, свинцом, мышьяком и пр.) считается взбитый в пену белок сырого куриного яйца. Знакари всегда поддерживали рвоту при отравлении смесью молока с яичным белком, взбитым в пену. Эту смесь надо давать отравившемуся пить.

ОТ УКУСА ТАРАНТУЛА

Взять стеклянную литровую банку, налить туда 0,5 л оливкового масла и положить 3-х тарантулов (банка должна быть с навинчивающейся крышкой). В закрытой банке настаивать 3 недели. Этой настойкой следует обильно смазывать места, укушенные тарантулом. Смазывать укушенное место каждый час, пока краснота и опухоль не пройдут совершенно... Этот способ лечения всегда применялся пастухами больших овецких стад; они постоянно носили с собой бутылку описанной настойки. Лечение этим способом, обыкновенно, быстрое и верное.

Наилучший способ поймки тарантула следующий: сделать шарик из пчелиного воска, привязать его на нитку и опустить в норку тарантула. Тарантул сразу же обхватит восковой шарик и не сможет оторвать своих ног. Опушенный и растительное масло тарантул легко отстанет от воска.

ОТ УКУСА ЗМЕЙ

1. Сразу же после укуса следует сделать примитивный турникет из пояса, веревки и пр. и туго перевязать им руку или ногу выше указанного места. Не обращая никакого внимания на боль, прижечь укушенное место каленым железом. Затем лечить рану от ожогов. Снять турникет через 15 минут.

2. Укушенный змеей сам должен высосать из раны все, часто выплевывая высосанное изо рта. Это можно проделывать только в том случае, если у укушенного во рту нет раны.

3. Череда трехраздельная

Народная медицина рекомендует растертую свежую траву накладывать на раны при укусах ядовитых змей.

СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ РЕВМАТИЗМА И В ОСОБЕННОСТИ СУСТАВНОГО

Специалисты доказывают, что основная причина всякого ревматизма, по новейшим исследованиям ученых, — избыток мочевой кислоты в организме. Эту кислоту дают организму потребляемые в пищу мясо, дичь, рыба. При лечении ревматизма надо на долгий срок отказаться от мясной пищи и перейти на вегетарианское питание, главным образом, на сырые овощи и сырые фрукты. При лечении же суставного ревматизма следует забыть о мясной пище на всю жизнь.

Несколько слов о суставном ревматизме (артрите). Пропорция овощного сока для больных суставным ревматизмом: на 1 кг следует брать 285 г сока сельдерея и 715 г морковного сока.

Все виднейшие новейшие научные источники по лечению ревматизма неукоснительно рекомендуют начинать лечение с фундаментальной ЧИСТКИ организма и обязательно при этом соблюдать ПОСТ, вернее голодание, для того чтобы освободить организм, в особенности кишечник, от накопленных там ядовитых и грязных веществ, зачастую лежавших многие годы. После очистки и поста сама природа позаботится о постепенном выздоровлении. Эта чистка организма и голодание ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, ибо они необыкновенно сильно ускоряют процесс выздоровления. ЧИСТКА ОРГАНИЗМА И ПОСТ (голодание) всегда приносят чудесные результаты: температура падает, воспаление легких и сенная лихорадка постепенно проходят. Многие болезни поддаются почти немедленному излечению после чистки организма от ядовитых веществ и грязных залежей.

П р и м е ч а н и е. Лицам, страдающим аппендицитом, воспалением пищеводных путей или язвами в этой области, подобная чистка не рекомендуется, этим лицам следует переходить прямо к голоданию. Многие современные ученые не рекомендуют голодание более 6 дней. Лучше голодать не подолгу, но часто. Но многие другие рекомендуют длительное голодание.

Рекомендуется начинать ЧИСТКУ ОРГАНИЗМА И ГОЛОДАНИЕ следующим образом. Утром, сразу же после пробуждения, развести 1 ложку английской соли в 1/2 стакане крутого кипятка (лучше пользоваться при этом дистиллированной водой). Добавить туда сок от 2-х лимонов и долить стакан доверху колодной водой (лучше дистиллированной) и выпить. Через 30 минут взять 1/2 стакана морковного и сельдерейного сока или столько же сока цитрусовых фруктов (апельсин, лимон), разбавить полстаканом дистиллированной воды и выпить. В течение всего последующего дня следует повторять прием сока с дистиллированной водой каждые полчаса. В течение чистки не следует принимать какой бы то ни было пищи, хотя голод чувствуется сильно. Если чувство голода очень сильно, можно съесть 1 апельсин вечером. Иногда, в связи с чисткой и голоданием, будут чувствоваться головная боль, тошнота и слабость. Не следует обращать на это внимание и следует твердо помнить, что это явление временное, и оно скоро пройдет.

Голодание. После одних суток чистки организма следует переходить к голоданию или своеобразному посту. В течение времени от 1 до 5 дней следует принимать только овощные соки (схотью возможно больше их). Каждый вечер следует ставить клизму, чтобы избавиться от "отбросов", спущенных сверху вниз в результате чистки и потребления овощных соков во время поста.

1 день в неделю полного голодания рекомендуется всем, здоровым и больным, чтобы дать природе очистить организм от ядовитых веществ, могущих впоследствии послужить причиной возникновения той или иной болезни.

Для тех, кто не может подвергнуть себя процессу чистки по причинам, упомянутым выше, следует принять естественное слабительное вечером, накануне поста.

В промежутке между постами или голоданием следует питаться, главным образом, салатами и сырыми овощами и фруктами всех разновидностей, с чрезвычайно малым количеством такой пищи, как молоко, сыр, яй-

на, рыба и мясо. Пищевые продукты высококислотного характера, которые должны быть совершенно исключены из диеты, следующие: все продукты, содержащие белый сахар и белую муку; варенья, конфеты, огурцы, заготовленные с большой примесью уксуса, уксус; приправы, сдобренные перцем и пр.; алкогольные напитки; крепкий чай; кофе или какао; заготовленная на долгий срок пища; жареная и жирная пища.

Чистка организма по доктору Вокеру.

Накануне начала голодания, вечером, перед сном, следует выпить стакан слабительного из смеси английской и глауберовской соли. После приема слабительного (если больной не спит) надо принимать каждые полчаса стакан апельсинового сока с некоторой примесью лимонного сока в течение суток и ничего не есть. Перед приемом слабительного следует сделать клизму. Здесь надо пояснить характерные особенности клизмы д-ра Вокера. Резиновая трубка для клизмы должна быть толщиной в карандаш и нижний конец ее должен быть обильно смазан растительным маслом на протяжении 50 см. При этом д-р Вокер не советует употреблять вазелин или другой препарат, имеющий минеральное основание. Наполнить банку двумя литрами теплой воды и, неплохо — налить туда же сок от 2 или 3 лимонов, хотя последнее и не обязательно. Затем конец резиновой трубки (без наконечника) следует вставить и задний проход и постепенно всовывать трубку дальше и дальше, пока не будет всунуто 50 см. Если трубка встретит препятствие, то не надо ее толкать дальше. Клизму по д-ру Вокеру следует принимать на коленях и локтях, чтобы вода проникла глубже и промыла лучше. Затем следует голодание и диета, что уже описано выше.

Добавим, что при лечении тяжелой формы ревматизма всех видов, особенно суставного, диета играет важнейшую роль. Огромную роль играют еще солнечные ванны, а также русская или финская бани, непременно с паром и веником. Парить больные места надо как можно сильнее и дольше.

ДИАБЕТ

Различают 2 сорта диабета.

Несахарный диабет. Он выражается только в обильном и частом мочеиспускании, но количество сахара в моче нормально. Так как с мочой выходит очень много азота и фосфора, то такой больной быстро устает, у него наблюдается сухость рта и кожи, недостаток слюны. Причина, главным образом, на нервной почве. Болезнь усиливается при бессоннице, при тревоге, неприятностях. Надо укрепляющие средства: железо, бром, валериана. Хорошо во время приступов болезни, которая проявляет себя периодически, пить глицерин по столовой ложке в день, а для пополнения фосфора, необходимого мозгу, есть побольше рыбы, мяса, а также раков, мозга, молока, желтки.

Сахарный диабет. Имеет в моче большое содержание виноградного сахара и щавелевой кислоты, что ведет легко к образованию камней в почках.

Признаки болезни: частое мочеиспускание, неутолимая жажда, постоянная жажда и ощущение голода, слабость, ухудшение зрения, сердечная астма, вкус во рту железа, плохое заживление ран, кожный зуд. Сахар в крови и моче.

Раньше всего надо перестать потреблять сахар и все то, что содержит в себе сахар и крахмал: хлеб, рис, крупы, стручковые плоды, изюм. Надо есть побольше мяса во всех его видах, больше жиров и свежих фруктов, за исключением бананов, каштанов, черешень, слив и винограда, в которых много крахмала. Очень хорошо снятое молоко, творог, простокваша. Пряности необходимы, чтобы облегчить переваривание жиров.

Помогает такая диета, которой следует держаться коть раз в неделю: весь день потреблять только одни овощи в свежем виде, затем съесть 3—4 яйца и немного к ним свежего масла.

Вместо сахара в пищу употреблять сахарин, сластилин, споларин и т. д.

Народные средства

1. Пить сколько кочется настоем из листьев черники.
2. Пить по столовой ложке в день отвара корня ратания.
3. Как можно больше смеяться, т. к. смех улучшает состояние больного, понижая процент сахара в крови организма.

4. Принимать 3 раза в день по чайной ложке горчичного семени.

Диабет наследственная болезнь, особенно если болели им оба родителя.

П р и м е ч а н и е.

Несколько слов о том, какая гадость инсулин. При диабете и при приеме мерзопакостного инсулина, после приема его, следует хорошо поесть. Если больной диабетом забывает поесть немедленно, то впадает в обморочное состояние и может очень скоро умереть.

Если вы хотите прожить без инсулиновых мук адовых, то проверьте вашу мочу и кровь периодически. Как только вы заметите, что появилось небольшое количество сахара в моче или крови и это количество начинает увеличиваться, то попробуйте последовать советам и правилам сего лечебника, и особенно — лечению голодом.

БЕРЕЗОВЫЕ ПОЧКИ — ВЕЛИКОЕ ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО ОТ МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ

Лечебник-травник А. П. Попова пишет о березовых почках следующее: "Препараты березы применяют при кожных болезнях, остром ревматизме, воспалении печени и при родильной горячке, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Обычно в таких случаях берут 50 граммов почек березы, настаивают их в течение 10 дней на 500 граммах водки и дают пить настойку от 1/2 до 1 чайной ложки с водой 3 раза в день за 15—20 минут до еды.

Это средство вызывает у больного хороший аппетит, способствует заживлению язв желудка и 12-перстной кишки. При зубной боли прикладывают ватку с настойкой на больной зуб. При всех перечисленных болезнях (кроме зубной боли) эти препараты употребляют внутрь и наружно.

Настойку почек березы или отвар их, а также отвар листьев принимают как глистогонное средство при острицах и аскаридозе. В народе наружно применяют эту настойку и при пролежнях.

Примочки из отваров березовых листьев и почек или настойка из почек хорошо заживляют свежие раны, даже глубокне.

Отвар почек: 1 чайная ложка почек на 1/2 стакана кипятка, употребляют по 2 столовых ложки 3 раза в день. Настойка почек на спирту — 25 граммов почек на 100 граммов спирта, настаивать в течение 8 дней, принимать по 20 капель 3 раза в день. Настойка почек на водке: на бутылку водки взять 1/2 бутылки почек, настаивать в течение месяца, употреблять по 40 капель 3—4 раза в день (при холере — по 1 рюмке каждый час до прекращения рвоты).

Из березовых почек готовят спиртовую настойку. Берут 30 граммов и больше почек на 1 литр примерно 70° спирта. Эту настойку принимают 3 раза в день по 15—20 капель на ложку воды при язве желудка, при несварении желудка, при расстройствах и разных болях в желудке, а также при водянке, возникшей от воспаления почек, при всяких иных видах почечных страданий, против мелких круглых глистов (остриц и аскарид), при болезнях кожи, мочевого пузыря; наружно — для излечения ран (промыывания, примочки), для втирания (а также и внутрь) при ревматизме.

Вместо спиртовой настойки употребляют также отвар из березовых почек: от 5 до 10 граммов на 1 стакан воды и пьют по 3 стакана в день, а тех же случаях, что и капли.

Если нет почек, то с таким же успехом применяют отвар или напар молодых листьев: 10 граммов на 1 стакан воды. Считается, что все эти части (почки, листья, сок) имеют свойство благотворно влиять на обмен веществ, удалять из организма всякий вредный балласт и вредные вещества при различных болезнях. Отвар или напар из почек или листьев в такой же дозе дают женщинам во время менструаций для облегчения выхода крови, и в послеродовом периоде, начиная от 12-го дня после родоа, для облегчения и ускорения послеродовых очищений.

ЛЕЧЕНИЕ ВАЛЕРИАНОЙ

Давно замечено было в природе необыкновенное влечение кошек к валериане. Запах валерианы не только привлекает кошек, но и мышей и крыс. Организм животных чувствует целебную силу валерианы. Это является самым распространенным средством для лечения многих болезней.

Больная страдала стериокардиосклерозом, нарушением мозгового кровообращения, был инфаркт миокарда, митральный склероз. В последующие годы состояние ухудшилось — появились бессонница, сердечные боли и слабость. Стала перед сном нюхать валериану.

Это привело к неожиданным результатам. Больная стала лучше спать и окрепла, прекратились спазмы, помутнение хрусталика глаза не только прекратилось, но подавилась тенденция к выздоровлению.

Методика применения

Валериановые капли брать чистыми, на спирту, без примеси других сердечных капель. Нюхать можно перед сном. Каждый должен найти для себя

соответствующую дозу вдыхания. Один-два раза вдохнуть поочередно в каждую ноздрю. У некоторых на следующий день болит голова. Это значит — валерианка действует. Но доза была слишком велика, поэтому следует в первые дни лечения делать вдох неглубоким, затем постепенно увеличивать.

На людей с высоким давлением валериана долго не оказывает заметного действия, затем она начинает благотворно влиять на организм и снижать давление. Если в начале сон становится крепче — всего на несколько часов, то проснувшись, можно снова подкрепить его вдыханием валерианы. Ни в коем случае нельзя нюхать валериану, когда необходимо бодрствовать. В этом случае борьба со сном после вдыхания валерианы ведет к нервному расстройству.

По наблюдениям, уже первый месяц вдыхания валерианы укрепляет организм. В течение 2—3—4 месяцев человек буквально перерождается. Самочувствие значительно улучшается.

ЛЕЧЕНИЕ ПОДСОЛНЕЧНЫМ МАСЛОМ

Этим способом можно лечить такие болезни, как головные боли, фронтит, тромбофлебит, хронические заболевания желудка, кишечника, сердца, легких, печени, женских болезней, энцефалита, зубные боли и др.

Данный способ предупреждает начальную стадию злокачественной опухоли.

Способ лечения заключается в следующем:

Растительное масло (подсолнечное или арахисовое) в количестве не более столовой ложки сосредоточивается в передней части рта, затем масло сосется, как конфетка, глотать масло ни в коем случае нельзя.

Процедура лечения проводится легко, свободно, без напряжения 10—20 минут. Сначала масло делается густым, затем жидким, как вода и только после этого его следует выплюнуть в санузел, так как эта жидкость инфекционная, и сполоснуть рот. Эту процедуру лучше делать один раз утром натощак и вечером перед сном. Но для ускорения лечения можно делать и несколько раз в день.

В выплюнутой жидкости находится масса возбудителей болезней, в том числе злокачественных опухолей.

Следует иметь в виду, что при лечении этим способом могут быть обострения, особенно у людей с массой болезней. Когда начнут расслабляться очаги, человеку может показаться, что ему стало хуже. Бывает так, что в организме "сидит болячка", но она еще не ощущается и человек считает себя здоровым. После принятой процедуры самочувствие вдруг ухудшается, это означает, что начал рассасываться очаг, который в дальнейшем вызвал бы заболевание.

Вопрос о том, сколько раз можно принимать процедуру, лечащийся должен решать, исходя из своего здоровья.

Так, например, при обострении радикулита можно целый день принимать процедуры и вставать с постели здоровым через три дня.

Лечение проходит в момент сосания масла.

Этим способом можно лечиться от огромного количества болезней, не прибегая к лечению лекарствами. Этот способ является одновременно и профилактическим. Острое заболевание вылечивается очень быстро, в течение двух дней, лечение же устаревших, хронических — длительное время, иногда год.

Этим способом лечатся клетки, ткани, все органы человеческого организма, последний при этом выбрасывает из себя весь живой и мертвый баланс. Под живым балансом понимается микрофлора, которая поражает человеческий организм, сокращает жизнь. Мертвый баланс — это соли и другие ненужные организму вещества. Человек должен жить 140—150 лет, а живет только половину положенного века.

Применять этот способ лечения нужно до тех пор, пока не появится в организме бодрость, сила, спокойный сон.

После пробуждения у человека не должно ничего болеть, он должен чувствовать себя отдохнувшим. После сна не должно быть под глазами мешков, должен быть хороший аппетит, память.

ЛЕЧЕБНАЯ ЖИДКОСТЬ

Рецепт: ментол — 2,5 г

анестезин — 1,5 г

новокаин — 1,5 г

спирт — 100 г.

Как видно, в этом рецепте нет ничего вредного.

Предлагаемое средство уничтожит геморрой, для чего достаточно совершить влажным тайпоном туалет два раза в день. Больная, страдающая геморроем 15 лет, излечилась от него за три дня.

Не надо бояться кратковременного жжения.

Это лекарство снижает боли любого характера.

Например, при радикулите, отложении солей, ангине. Больные места смазывают жидкостью два раза в день.

Когда ломит, тянет руку или ногу, хорошо ватой, смоченной в растворе, протереть больное место. При бессоннице рекомендуется протереть лишь шею перед самым сном, то же лечение необходимо провести при головных болях.

Это средство незаменимо в пенсионном возрасте, когда ноги не совсем слушаются. Для этого ступни и подкостные ямки смазываются один раз в день.

Это лекарство даст неожиданные результаты снижения кровяного давления, если протирать им на ночь шею.

ИНДИЙСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЙОДОМ ГИПЕРТОНИИ

(смазывают йодом по схеме 2 раза в год — в марте и сентябре)

I этап: с 1 марта по 10 марта. Затем сделать перерыв 10 дней. С 21 марта по 30 марта.




Рис. Схема смазывання йодом

II этап: с 1 сентября по 10 сентября. Затем перерыв 10 дней. С 21 сентября по 30 сентября.

Ватку на спичке обмакнуть в йод и провести кольцо вокруг кисти левой руки вечером перед сном (на ночь) и так делать в течение 10 дней согласно нумерации чисел. Затем сделать перерыв 10 дней и повторить смазывание в том же порядке (в кружки взяты цифры после десятидневного перерыва). Пунктир: провести линию йодом со плеча до бедра (вперед не делать). В один день делать только одно смазывание, скажем, вокруг колена правой ноги (см. рис. 1).

МЕТОДИКА ОЧИСТКИ ПЕЧЕНИ*

Выведение камней из желчного пузыря и желчных протоков.

Накануне вечером съесть только салат, свеклу (свежую потереть), морковь (свежую потереть), капусту (свежую или квашеную), сок лимона.

В 9 часов сварить геркулесовую кашу на воде $1/2$ стакана и съесть (жидкую, добавить соль и сахар по вкусу).

Геркулес создает повышенное содержание слизи, чтобы камни лучше выходили.

В 12 час. выпить чай:

зверобой $1/5$ ч. л., мята 0,5 ч. л. + лимонный сок + мед. Все это на 200 г кипятка.

За 15 мин. до чая проглотить 2—3 табл. экстракта крушины или ревеня или листа сенны.

В 14 час. на область печени положить грелку на 6 часов.

В 15 час. выпить 2—3 табл. слабительного и пить горячий чай (см. выше). Таким образом дать прогреться печени как можно глубже.

В 18 час. подсушить в духовке черный хлеб тонкими сухариками, подсолить их. Выжать один лимон и развести пополам с водой. Сварить натуральный кофе (2 ч. л. на стакан воды).

Выпить 1 ампулу платифилина или 1 табл. ношпы + 1 табл. папаверина. Через 30 мин. выпить 150 г оливкового масла (кукурузного, хорошего подсолнечного), подогретого до 50°C . Запить разведенным лимонным соком (или соком грейпфрута), выпить чашку черного кофе и поесть сухарей. Лечь на левый бок, расслабиться. Максимально расслабить солнечное сплетение. Не должно быть никакого нервного напряжения и раздражения. После приема масла мускулатура желч. пузыря резко сократится и произойдет выброс его содержимого в 12-перстную кишку. Через час можно повторить процедуру, выпив еще 150 г масла. В 22—23 часа можно сделать клизму, а также на другой день. Можно обойтись и без нее. Постепенно будут выходить камни, песок, излишки желчи и слизи. Во время процедуры будут возникать признаки боли — у кого более слабые, у кого сильные — не надо их бояться, нужно перетерпеть.

За неделю до процедуры и в течение недели после нее следует принимать постную пищу.

* Методика разработана А. Заревым.

ЛУК И ЧЕСНОК

Универсальные приправы, издавна пользуются большой популярностью в народе. Тертým сырым луком растирают обмороженные места. Завернутую в марлю кашицу закладывают на 10—15 минут в ноздри носа при насморке. Печенýй лук способствует созреванию нарыва.

При кашле, бронхите и коклюше употребляют следующий рецепт: 0,5 кг размельченного лука, 50 г меда, 400 г сахара — варят в литре воды в течение трех часов. Принимают по 4—6 столовых ложек в день.

Свежим соком лука сводят бородавки, лечат раны, укрепляют волосы. 1—2 раза в неделю втирают 2—3 столовых ложки сока в корни волос, после чего завязывают голову платком на полтора-два часа.

Велики фитонцидные свойства лука и чеснока. Достаточно пожевать несколько минут зубок чеснока, чтобы полностью очистить полость рта от бактерий. Правда, многие остерегаются из-за достаточно неприятного для окружающих запаха.

КАПУСТА ВМЕСТО ПИРАМИДОНА

Далеко не каждая козýйка знает, что буквально под руками у нее на кухне имеется неплохо укомплектованная аптечка.

Прежде чем рассказать о целебных свойствах некоторых овощей и продуктов, известных медицине сотни и даже тысячи лет, надо сделать несколько замечаний. Средства эти вовсе не рассчитаны на лечение болезней, требующих немедленного обращения к врачу. Они нередко помогают вам и позволяют избегать сильно действующих лекарств, которые лучше приберечь для более серьезных случаев. Для приготовления описываемых здесь лекарств не нужно ни опыта, ни времени. Вреда они не могут причинить. Итак...

У вас заболела голова. Вы тянетесь за таблеткой цитрамона, пирамидона или фенацитина. Минутку... Попробуйте-ка другое средство. Возьмите листья свежей капусты и приложите их ко лбу и вискам. Точно так же рекомендуется поступать, чтобы унять боль при ожогах, ушибах, наружных воспалениях. Целебна и кислая капуста: если ее систематически жевать, то укрепляются слабые десны.

Широко известны противоязвенные свойства картофеля. Куда меньше знают, что содержащийся в нем крахмал, слизистые вещества и соли оказывают хорошее защитное действие на желудок. Сырые тертые клубни прикладывают к ожогам, к местам, обваренным кипятком. При ожоге картофеля можно заменить тертой и отжатой морковью. А сок моркови, богатый витаминами, врачи рекомендуют в первые дни заболевания инфарктом миокарда.

Легенда рассказывает, что Аполлон, который был родственником Эскулапа, а потому имел некоторое отношение к медицине, оценивал редьку на вес золота, брюкву — серебра, репу — свинца.

В народной медицине эти овощи до сих пор не упали в цене. Сок редьки, принимаемый по 1 столовой ложке 3 раза в день уменьшает кашель и устраняет хриплость. Он также хорошо помогает при заболевании желчной болезнью и против образования камней в печени, почках.

Соком редьки растирают при ревматизме и простудах.

Рена действует на организм слабее, чем редька. Ее сок, смешанный с медом, помогает при кашле, а вареный растертый корень прикладывают к больным местам при подагре.

ОТ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК, ЖЕЛУДКА И МАЛОКРОВИЯ ПОВСЕДНЕВНЫЙ НАПИТОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Сотни, а может быть, тысячи российских и сибирских знахарей всегда советовали своим односельчанам напиток из ШИПОВНИКА для здоровья и долголетия, а также в целях предохранения от болезни. Этот напиток очень богат витамином С.

2 чайные ложки (с верхом) сушеного шиповника положить в стакан кипятка. Следует заваривать шиповник как чай и пить 3 раза в день после еды.

Многие фитотерапевты говорят: "Если хотите быть здоровы, пейте настоящую шиповника", и рекомендуют шиповник как средство против малокровия, цинги и для лучшего обмена веществ.

Семена шиповника используют в медицине для получения целебного масла, применяемого в качестве наружного средства при лечении ссадин, трофических язв, пролежней, для заживления трещин сосков у кормящих матерей.

Из ягод шиповника можно делать настои. Для этого 20 г плодов помещают в закрытую эмалированную или стеклянную посуду, заливают 1 стаканом кипятка и кипятят 10 мин, а затем настаивают в течение суток. Полученную жидкость процеживают через марлю, сложенную в 2 слоя, и пьют по 1/4 или 1/2 стакана 2 раза в день. Детям дают по 1/8—1/4 стакана.

Если нужно ускорить приготовление настоя, плоды измельчают.

Чтобы увеличить срок годности настоя шиповника, его следует смешать с приготовленным сиропом или прокипятить с сахаром.

ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИДНАЯ

В официальной медицине в последние годы облепиха получает самое широкое распространение.

Облепиховое масло применяют при лечении ожогов, пролежней, при лучевых поражениях кожи, опльпятах, эндопервицитах, зрозиях шейки матки, язвенной болезни желудка, при хронических воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей (для ингаляции). Оно является составной частью препарата олазол, используемого в медицинской практике в качестве средства, способствующего заживлению ран при ожогах, лечению инфицированных ран, а также при экземе, трофических язвах, зудящих дерматитах.

Для лечения язвенной болезни желудка назначают 1 чайную ложку облепихового масла 2—3 раза в день за 30—40 мин. до еды.

Хранят масло в прохладном, защищенном от света месте.

Масло можно получить в домашних условиях. После выделения сока оставшуюся массу высушивают, измельчают на кофемолке и заливают подсолнечным маслом (1:1,5). Настаивают 3 недели при комнатной температуре, периодически помешивая. Затем верхнюю осветленную часть осторожно сливают. Подсолнечное масло экстрагирует (вытравливает) биологически активные вещества плодов облепихи.

Остатки плодов (жом) после выделения сока и получения масла используют для приготовления поливитаминного чая.

В традиционной медицине листья облепихи используют для лечения ревматизма и подагры; отвар плодов в виде примочек применяют при кожных заболеваниях. Отвар семян оказывает слабительное действие.

В косметике широко используется питательные маски на основе облепихового масла.

ЧИСТОТЕЛ

Полезен при наружных и внутренних болезнях. Употребляется сок, находящийся в корнях, стеблях и листьях.

Приготовление*

Все растение пропустить через мясорубку, выжать из массы сок через двойную марлю и залить в бутылочку с герметичной пробкой. Временами нужно выпускать газ из бутылки. После 5—7 дней, когда сок перебродит, его можно использовать.

Сок излечивает носоглотку, аденоиды, полипы, гланды, гайморит, десны, бородавки, мозоли, прыщи, нарывы, фурункулы, свищи, чесотку, экзему, грибок, лихорадку (па губах), раздражение кожи после бритья, ожоги, вызванные огнем, паром, горячим молоком, солнечными лучами, хим. веществами.

Излечивает гипертонию, астму, блоковые, лимфотоз, лейкоз, атеросклероз, пищевое отравление желудка, грипп, мягкие опухоли (фибромы), полипоз толстой кишки, геморрой, гастрит, зуб, подагру, ревматизм, язвы жел.-кишечного тракта, печень, желчный пузырь, почки и сердечную мышцу.

Лечение

Кожные болезни. Намазывают соком от здоровой ткани к больной, сужая круг, восстанавливая больные ткани.

Мастит. Соком смазывают трещины сосков, давая 2—3 мин. для проникновения сока внутрь больного места.

Носовые болезни: грипп, гайморит, полипы и пр. Закапать в ноздрю 2—3 капли сока, через 5 мин., когда пройдет покалывание, закапать во вторую ноздрю, лежа на спине. При попадании сока в глотку можно проглатывать.

* Рецепт составил Г. Ф. Ильин из Кисва.

Больные десны. Мазать соком пятикратно 2—3 раза в день или, набрав сок в рот, держать на деснах 20—25 мин., потом выплюнуть.

Подagra, ревматизм.

Мазать больное место и пить настой чистотела.

Грипп.

Полоскать пятикратно рот и носоглотку и пить 1/2 стакана настоя.

Женские болезни.

500 мл настоя спринцевать 2 раза в день (утром и вечером).

Кишечные заболевания.

Ставить клизму, задерживая ее внутри до 40 мин. (1 стакан заварки на 1 клизму).

Геморрой.

Пить настой и смазывать узлы снаружи.

Внутренние болезни: желудок, печень и т. п.

Пить настой заварки а течение 1—2 месяцев без перерыва.

Щитовидная железа.

1. Пить настой по 1/2 стакана а день за 10—15 мин. до еды в течение 2-х месяцев.

2. Полоскать рот и носоглотку заваркой.

3. После полоскания пускать по 2—3 пипетки сока в каждую ноздрю.

4. Обильно мазать соком зоб снаружи.

Экзема.

Мазать места обильно и пятикратно с перерывом 3—5 мин. до впитывания и пить настой заварки по 100 мл за 10—15 мин. до еды.

Тромбофлебит конечностей.

Мазать пятикратно с перерывом 3—5 мин. до апитывания и пить настой по 100 г за 5—10 мин. до еды.

Примечание:

Прв лечении чистотелом другие травы и лекарства не применяются.

Сушка чистотела

Вырыв куст чистотела в мае—июне при цветении, очистить от сухих листьев, корни обмыть, нарезать кусочками а 1/2 см, листья и стебли а 1 см. Сушить на сквозняке в темном месте. Сухую траву завернуть в бумагу и повесить в сухом месте.

Приготовление настоя

Свежую траву поместить в 500 г банку, заполнив 1/2 ее объема. Залить крутым кипятком, закрыть крышкой. (При настое из сухой травы — заполнить 1/4 часть банки). После остывания пить 3 раза в день по 100 мл за 10—15 мин. до еды. Цвет настоя — темный, акус горький.

Действие настоя.

Появляется нормальный аппетит, сон, нервная система успокаивается. После применения в течение 7 дней делать перерыв на 2 дня.

При применении настоя принимать тертую морковь — 1 столовую ложку.

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ

Лекарственные формы в виде отваров травы и брикетов, настоек и настоев применяют в качестве вяжущих и антисептических средств при кровотечениях, поносах: для смазывания десен и полоскания рта при профилактике и лечении гингивитов, стоматитов. Антибактериальный препарат новоиминин рекомендован при лечении абсцессов, флегмон, инфицированных ран, ожогов II и III степени, язв, пиодермии, мастита, ринитов, фарингита, гайморита. Содержащийся в препарате гиперфорин подавляет рост золотистого стафилококка. На основе катехинов зверобоя создан препарат нефлавит, обладающий Р-витаминной активностью и уменьшающий проницаемость капилляров.

Препараты зверобоя снимают спазмы кровеносных сосудов, оказывают вазопролептическое действие, улучшают венозное кровообращение и кровоснабжение некоторых внутренних органов, увеличивают диурез.

Горькое вещество, содержащееся в траве зверобоя, возбуждает секрецию желудка, улучшает аппетит.

Растение пользуется широкой популярностью и традиционной медициной. Издавна его применяли внутрь в качестве кровоостанавливающего и противовоспалительного средства, при лечении мастита, анемии, геморроя, желтухи, мигрени, гипертонии, кашля, желудочно-кишечных и легочных заболеваний, а также при заболеваниях печени, почек, дыхательных путей. Использовали траву зверобоя и в качестве наружного средства при лечении ран, язв, пролежней, аллергии, сыпи.

Для приготовления отвара 10 г (1,5 столовые ложки) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) крутого кипятка, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане в течение 30 мин. После этого охлаждают, процеживают, отжимают оставшееся сырье и добавляют кипяченой воды до получения 200 мл. Принимают внутрь при вышеуказанных заболеваниях по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды. Отвар можно хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Полезен и чай из зверобоя, постоянное применение которого способствует стимулированию желез внутренней секреции, регулирует работу желудочно-кишечного тракта, усиливает защитные функции организма.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ*

Исследовали влияние ЯК в сочетании с глюкозой на лечебный процесс у больных пожилого возраста от 65 до 80 лет (всего 18 человек).

Часть этих больных были амбулаторными, в некоторые находились на постоянном режиме по поводу аритмии и хронических сердечно-сосудистых заболеваний (коронарный атеросклероз и перенесенный инфаркт миокарда). Ранее больные лечились общепринятыми лекарствами.

ЯК назначали по 0,3—0,5 г внутрь в течение 20 дней. Участковые врачи иногда назначали некоторые обезболивающие средства, главным обра-

* Я. Ю. Шпирт. Москва.

зом, папаверин. После 20-дневного лечения все больные стали активными, могли передвигаться и даже совершать небольшие прогулки. Все они отмечали хорошее самочувствие, бодрость, исчезновение слабости, бессонницы и неприятных ощущений в области сердца, а также учащенных сердцебиений. Объективно отмечено было понижение пульса (от 102 до 68). Артериальное давление колебалось в пределах 140/90—125/75 мм рт. ст. За время наблюдения тоны сердца стали громче, яснее. Акцент тона на аорте оставался и сохранялся систолический шум. Со стороны легких и органов брюшной полости никаких изменений не отмечено.

Незначительные изменения — отеки, наблюдавшиеся ранее, исчезли без применения диуретических и сердечных средств. Дальнейшее наблюдение показало, что отмеченное улучшение сохранялось в течение 6—9 мес.

Следует отметить, что лечение ЯК проводилось у больных в стадии выздоровления после тяжелых сердечных заболеваний. Поэтому пока трудно сделать охончательный вывод об ее эффективности. Однако уже можно констатировать, что влвание ЯК легко переносится больными, не оказывает побочного действия и может быть применена в поликлинических условиях с благоприятным укрепляющим действием.

ЯК входит в состав некоторых продуктов питания человека. В заметных количествах ЯК содержится в незрелых ягодах крыжовника и винограда, соке сахарной свеклы и репы, в ревене и молоке.

В ячмене, подсолнуке содержание ЯК составляет около 5 мг на 100 г семян, в соке сакарного тростника — до 50 мг на 100 г сухого остатка; больше всего ЯК в люцерне (2).

(Из книги "Терапевтическое действие янтарной кислоты" под редакцией д-ра биологических наук проф. М. Н. Кондрашовой, гор. Пущино, Моск. обл.).

В газете "Труд" напечатана статья "На пути к долголетию" (за 26 января 1979 г.). Написал ее доктор Я. Ю. Шпирт, который лечил больных сердцем.

В этой статье указывается, что если янтарную кислоту принимать совместно с мумие, то можно прожить "сколько захочешь лет", и что ЯК обладает очень важным свойством: она сама находит в организме те участки, которые в ней нуждаются, обходя здоровые.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА*

Начинать применение следует с дозы 0,5 г соли ЯК ежедневно утром после еды. При субъективном ощущении бодрости и хорошего самочувствия днем, с улучшением ночного сна (его укорочения к утру, хотя и с ощущением свежести, служит сигналом передозировки) дозу можно снижать до 0,5—0,25 от исходной, при этом можно ввести второй прием днем и третий вечером за 2—3 часа до сна (хотя всегда нужно стремиться к минимальному приему препарата). Часто пациенты могут, следя за своим

* Из книги "Терапевтическое действие янтарной кислоты" — под редакцией д-ра биол. наук проф. М. Н. Кондрашевой.

эмоциональным состоянием, выбирать необходимый минимум препарата, обеспечивающий поддержание активированного состояния. Очень важным является введение дней пропуска приема препарата (примерно 2—3 дня приема, 1—2 дня перерыва). Такой режим позволяет надолго сохранить активированное состояние, в то время, как при стандартном приеме большой дозы ежедневно курс лечения не следует продолжать более 7—9 дней.

При отсутствии ощущаемых признаков активации дозу следует повышать, переходя на два приема по 0,5 г утром и днем ила даже по 0,7—1,5 г два раза в день. Такие случаи могут требовать сочетания ЯК с другими веществами.

После большой физической нагрузка эффективен однократный прием 3 г ЯК. Повышение дозы ЯК эффективно при простудных ринитах и миозитах (по 1 г 3—4 раза в день, несколько дней подряд).

При острой сердечной недостаточности весьма эффективно внутреннее введение ЯК. Доза: 30—40 мг на 1 кг веса вводится капельно на протяжении 40—60 мин под строгим контролем РН.

СРЕДСТВО ОТ ХРАПА

А. Соколова из Новосибирска делится собственным опытом: "В далекой юности (мне сейчас 60 лет) тоже очень страдала от храпа, но вылечилась от него легко и навсегда с помощью несложного физического упражнения. Состоит оно в следующем: рот закрыт, дыхание через нос. Напрячь заднюю стенку языка и с силой оттянуть язык к горлу. (Если при этом приложить пальцы под подбородок, то можно почувствовать, как напрягаются мышцы). Это упражнение повторять несколько раз в день, делая по 10—15 движений языком. Постепенно слабая небная занавеска окрепнет, и человек перестанет храпеть".

Целительную силу гимнастики подтверждает К. Панкус из Куйбышевской области. "После применения рекомендации журнала "Здоровье" № 5 за 1988 год (стр. 30) я почти избавился от храпа..." В упомянутой рекомендации врач Ю. Федоров предлагает делать такую гимнастику: произносить звук "и", напрягая при этом мышцы глотки, мягкого неба и шеи. Делать это упражнение надо утром и вечером, повторяя по 20—25 раз. Через месяц храп почти прекратился.

Как видите, похоже на рекомендацию А. Соколовой. Попробуйте! Вреда от этого, во всяком случае, не будет.

Т. Кошелева из Новосибирска пишет: "Храп — это глубокое неконтролируемое дыхание в ночное время. Многие слышали о методе доктора К. П. Бутейко. Заключается он в волевой ликвидации глубокого дыхания. Этим методом можно лечить и храп". И далее автор письма рассказывает, что в Новосибирске есть ученики доктора Бутейко, которые освоили эту методику и многим помогают.

Значит, есть средства, и дело за тем, чтобы было желание освоить и распространить опыт.

В. Дмитриев, профессор МФТИ, разработал свой метод борьбы с храпом: он использует магнитофон с максимальным усилением звука, кладет на подушку рядом с храпящим микрофон, и как только спящий начинает

крапеть, его край до того усиливается, что человек мгновенно просыпается. Конечно, этот метод напоминает известный анекдот о том, как врач от кашля прописал слабительное: больной после этого ужасно боялся кашлянуть и быстро вылечился. А если серьезно, считает В. Дмитриев, то промышленность могла бы выпустить несложный и недорогой прибор, основанный на этой методике.

Я. Боруков из Андижана, ассистент кафедры детских болезней мединститута, убежден в том, что храп во время сна появляется у людей, которые страдают даже минимальной сердечной недостаточностью и что это — повод для серьезного обследования и лечения.

Итак, некоторые пути борьбы с храпом все-таки выявились. А ведь существует еще и югославский препарат "боцослип", и созданные в Китае капли, и методика минских врачей, оперирующая колодом...

УКСУС

Все утверждения в моих публикациях относительно вредного влияния уксуса на организм касаются только белого дисциплированного уксуса и винного уксуса в которых разрушительств, в основном, является уксусная кислота.

Однако уксус, полученный из цельных яблок и неразбавленный, содержит в себе ЯБЛОЧНУЮ КИСЛОТУ, необходимую для пищеварительных процессов. Обычно употребляется два вида уксуса.

Белый, дисциплированный уксус быстро разрушает красные кровяные тельца, вызывая анемию. Он также нарушает пищеварительные процессы, замедляя их и препятствуя правильному усвоению пищи. Этот уксус является продуктом брожения кислоты и алкогольных жидкостей, таких, как вино и в солодовых растворах. Они известны как винный уксус и как солодовый уксус. Белый дисциплированный уксус широко используется у нас.

Уксус, изготовленный из яблок, содержит яблочную кислоту, представляющую натуральную органическую часть яблок, улучшающую обменные процессы.

Уксус, полученный в результате брожения вина, содержит в среднем от трех до девяти процентов уксусной кислоты и обычно немного винной кислоты. Известно, что уксусная кислота является одной из причин, вызывающих цирроз печени, язвенный колит и тому подобное.

Яблочный уксус содержит яблочную кислоту, представляющую собой строительную (конструктивную) кислоту, соединяющуюся со щелочными элементами и минеральными веществами в организме. Она образует энергию, отлагающуюся в организме в виде гликогена, для дальнейшего его использования (про запас). Присутствие яблочного уксуса в умеренных количествах исключительно полезен и для пожилых людей.

Яблочный уксус повышает свертываемость крови, восстанавливает нормальный менструальный цикл, оздоравливает кровеносные сосуды, а также способствует образованию красных кровяных шариков.

Наиболее ценным качеством этого уксуса является высокое содержание калия, необходимого для вырабатывания энергии, а также для спокойствия нервной системы.

Яблочный уксус должен быть изготовлен из целых яблок, включая и кожуру.

Нанесение на кожу яблочного уксуса помогает при многих заболеваниях, а также при выведении пятен на коже.

В Шотландии используют этот уксус при варикозе и расширении вен, смазывая все пораженные места по всей длине, утром и вечером, и одновременно выпивая ежедневно 2—3 стакана воды с добавлением 2 чайных ложек яблочного уксуса в каждый стакан.

При обновлении крови (каждые 28 дней), весьма эффективен также яблочный уксус хорошего качества.

О МОЛОКЕ

В случае необходимости употребления молока следует помнить, что кроме материнского, самым полезным является козье молоко, для всех возрастов.

Молоко ни в коем случае не подогревать выше 47°C, ибо при 54°C энзимы уничтожаются. По этой причине нельзя употреблять пастеризованное молоко.

Сырое козье молоко является самым чистым продуктом, тогда как коровье редко бывает чистым.

Доказано, что коровье молоко образует много слизи, в то время, как козье ее не образует.

Коза, вероятно, самое чистое домашнее животное. Ее органы выделения близки к идеальным, отсюда и причина ее дружелюбного нрава. Будучи чистым животным, коза не болеет туберкулезом, бруцеллезом и др. болезнями, от которых страдают коровы. Козье молоко содержит больше безбелкового азота, с более высоким содержанием ниацина и тиамина, чем любая другая пища.

Козье молоко исключительно эффективно при поносах у детей, что объясняется высоким содержанием ниацина.

ГРУДНАЯ ЖАБА И НЕКОТОРЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ*

Письмо умного человека, содержание которого должны запомнить миллионы людей.

Предисловие к письму. Среди сотен тысяч русских эмигрантов, несчастных страдальцев от грудной жабы и некоторых сердечных болезней, потребляющих нитроглицерин, нашелся один человек с "мозгой", показавший ошибочность пользования нитроглицерином и рекомендуящий старый, но вечно новый способ лечения препаратами из лечебных трав...

"Всю жизнь я был гимнастом, сохолом, спортсменом, и как таковой, обладал стопроцентным здоровьем. 3 года тому назад меня неожиданно атаковала грудная жаба, атаковала так, с такими нечеловеческими болями, что я был как парализованный, боялся шевельнуться! Доктора уверяли,

* Куреннов П. М.

что это невзлечимо и советовал бросить работу, отказаться от какой-либо активности и... жить нитроглицерином!?

Я этому не повсрился, обратился к травам, нашел Боярышник-Кратегус и стал пить его настой по 3 стакана в день. Через полгода постепенного улучшения я совершенно забыл о нитроглицерине, а теперь я здоров, почти как раньше, и в мои 73 года я работаю на заводе полных 8 часов в день, а вечером занят общественными работами. Я правлю автомобилем, иногда по 100 миль в день, без остановок, и свободно хожу по лестнице. Теперь Вы знаете, для чего мне нужен боярышник, а шиповник мне нужен как витамин "С", как приправа к боярышнику, чтобы приятнее было пить.

Настой боярышника я готовлю так: у меня кастрюля на 7 стаканов, я кладу в нее 7 полных столовых ложек ягод (ложки с "горбом") и заливаю это крутым кипятком, ставлю кастрюлю на нетеплопроводную подставку (лист асбеста любой толщины). Закутываю тепло кастрюлю и держу так, примерно 20 или 24 часа. Потом процеживаю содержимое через матерью, выжимаю набухшие ягоды и ставлю сок в холодильник. Пью по стакану 3 раза в день во время еды. Когда я начал лечиться травами, то я употреблял боярышник и пустырник в равной пропорции по весу, а 6 месяцев тому назад стал пользоваться одним боярышником, и, сказать откровенно, большой разницы не вижу.

Между прочим, хочу Вам сообщить, что в Германии настойка боярышника (кратегута) на спирту считается единственным настоящим лекарством против грудной жабы. Мне ее привозят знакомые и я пользуюсь ею в дороге, когда невозможно делать заварку или везти с собой бутылку с жидкостью.

В моем возрасте витамин "С" необходим, и, конечно, можно купить просто таблетки, но я поклонник натуральных средств, и поэтому предпочитаю заваривать боярышник вместе с шиповником, да и пить приятнее.

Нитроглицерин только успокаивает, а травы лечат... При первом признаке сердечной (еще до припадка) следует переходить на лечение напаром боярышника или боярышника пополам с сердечником (пустырником). "Предохранение — лучшее лечение", — говорит восточная мудрость. При нитроглицерине после первого припадка вскоре бывает второй, а часто и третий... При лечении же травами (если лечение начато до первого припадка) этого начального припадка не бывает долгие годы. Если лечение начато после первого припадка, то второй откладывается на долгие годы.

ПОМНИТЕ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что при нитроглицерине врачи предписывают отказаться от всякой физической активности, а при лечении травами человек в 70—75 лет может заниматься физическим трудом 8 и больше часов в день и не иметь никакого сердечного много лет и свободно ходить по лестницам...

Примечание. Капли боярышника на спирту называются "кратегут". Имейте всегда при себе металлическую рюмку, флакон капель и флакончик с водой. При всяком внезапном ухудшении состояния сердца наливайте в рюмку воды и накапайте из этого флакона 20 капель.

Читая письмо умного человека, многие не заметят элемента колоссальной ценности, то есть того, что умный человек решил подниматься как на ковче-самолете, — на двух элементах: длительном отдыхе, и... лучшем в

мире лекарстве от грудной жабы — напаре из ягод боярышника. Возьмем целую группу больных грудной жабой. Из 1000 человек 99 не последовал бы принципу умного человека, т. к. они оказались бы "людьми с горячими печенками" и через 2—3 недели, почувствовав заметное улучшение здоровья, пошли бы на физический труд, подчас довольно тяжелый. Здесь полностью оправдывается излюбленное выражение знаменитого фельетониста А. А. Яблонского: "Бывают люди умные и... другие"...

ДЕТОКСИКАЦИЯ

Первым шагом к оздоровлению организма является его абсолютная чистота. Любое накопление или задержка нездоровых веществ или шлаков замедляет процесс выздоровления.

Органами выделения являются легкие, поры кожи, почки и кишечник.

Потение — это действие потовых желез, выбрасывающих вредные для организма вещества и токсины.

Почки удаляют из печени конечные продукты пищи и обмена веществ организма.

Кишечник удаляет не только отходы пищи, но также отходы организма в виде отработанных клеток тканей, являющихся следствием нашей физической и умственной деятельности.

Одним из первых и быстрых методов очищения, особенно для взрослых, является следующий:

ВНИМАНИЕ: не применяйте этот метод детоксикации при аппендиците или имеющейся склонности к нему. В этом случае применяйте клизму — 3 раза в течение одной недели.

Утром, натощак выпить стакан раствора глауберовой соли (1 ст. ложка на стакан воды). Цель приема — не освобождение кишечника, а излечение из всех частей организма имеющихся там токсинов и отходов через кишечник. Этот раствор действует на лимфу и на отходы, так же, как магнит притягивает гвозди и железные опилки. Количество выходящих нечистот может составить в целом 3—4 литра и больше. Это приводит к обезвоживанию организма и поэтому ее надо восполнить. Выпить 2 литра сока цитрусовых, разбавленных двумя литрами воды для быстрого поглощения организмом. Такая смесь дает щелочную реакцию в организме.

Начинать пить этот сок через тридцать минут после принятия раствора глауберовой соли и продолжать его пить через каждые 20—30 минут, пока не кончится эта смесь в четыре литра.

Весь день ничего не есть, но если к вечеру голод станет нестерпимым, то можно поесть немного апельсин, или плодов грейпфрута, или немного сельдерейного сока.

Перед тем, как лечь спать, сделать клизму двумя литрами чуть теплой воды, в которую следует добавить сок одного или двух лимонов.

Цель клизмы — удалить из складок толстой кишки и из тонких кишок находящиеся там отбросы.

Такую процедуру детоксикации следует проделать 3 дня подряд, в результате, из организма будет удалено 12 литров жидкости токсичной лимфы и замещено таким же количеством ошелачивающей жидкости.

На 4-й и последующие дни следует пить овощные соки и есть фрукты только в сыром виде. В случае слабости не следует беспокоиться. Природы использует энергию организма для его очищения и вскоре после этого вы приобретете большую энергию и бодрость.

ГОЛОДАНИЕ

Голодать 12 дней, пить часто воду, а после того как кончили голодать — след. питание:

1-й день:

даются соки (виноградный, апельсиновый) из расчета 500 г в день. Сок в первый день дается разбавленным пополам с кипяченой водой. Пить маленькими порциями, по 1—2 чайн. ложке, через короткие промежутки времени (вначале через 5—10 мин.), постепенно количество сока и интервалы увеличивать.

2-й день:

даются целые перазбавленные соки в количестве 1 литра. Принимать через каждые 2 часа.

3-й день:

1 литр кефира и 500 г яблок (яблоки даются в очищенном виде и протертом) в смеси с кефиром в виде кашицы. Больные питаются 5 раз в день через 3 часа (9, 12, 15, 18, 21).

4-й день:

к указанному питанию добавляется тертая свежая морковь 250 г. Морковь дается в смеси с тертыми яблоками и кефиром из расчета 100 г яблок, 50 г моркови, 200 г кефира (5 раз).

5-й день:

яблоки, морковь, кефир даются в количестве на один прием — 100 г, 100 г, 300 г. Сюда можно добавить мед 1 ч. л. и орехи грецкие 1—2 штуки. Эта смесь принимается 5 раз в день. Кроме того, в 12 часов добавляется 150 г виногрета, в состав которого входят: картофель паровой 250 г, свекла вареная 80 г, морковь сырая тертая 100 г, капуста свежая сырая 50 г.

6-й день:

питание 4-разовое (9, 13, 17, 21). Каждый прием пищи начинается со смеси: 150 г моркови, 100 г яблок, 300 г кефира, 1—2 чайные ложки меда, орехи 1—2 шт. В 9 часов добавляется виногрет 200 г, хлеб 100 г.

7-й день:

к рациону предыдущего дня в 9 часов добавляется гречневая или овсяная каша на молоке в кол-ве 200 г, полужидкие, без соли. В 9 часов и в 21 час добавляется творог 150 г. Кол-во хлеба на прием увелич. на 100 г.

8-й день:

питание такое же, как и в предыдущий день.

9-й день:

к указанному питанию добавляются овощные супы и картофельное пюре на молоке, то и другое без соли.

С 12-го дня:

к питанию предыдущих дней добавляется 30 г масла и соли.

СОВЕТЫ ДОКТОРА ХАКСЛИ

Моргайте чаще, когда ходите в кино
или смотрите телевизор

Первый закон зрения гласит: "Когда глаз передвигается, он видит". Никто не может смотреть фильм или телевизионную передачу, если глаза при этом не двигаются. Таким образом, и поход в кино, и просмотр телепрограммы могут быть очень полезны для глаз, если вы смотрите правильно. Более того, в обоих случаях возможно даже улучшить свое зрение.

Доктор Хаксли приводит весьма полезные рекомендации.

Проанализируйте, как вы сидите и на каком расстоянии от телевизора. Сидеть следует прямо, не наклоняя голову влево или вправо. Что же касается расстояния, то все, как правило, зависит только от расстановки мебели в комнате. Если диван стоит далеко от телевизора, то человек сидит там, хотя расстояние до экрана отнюдь не соответствует тому оптимальному, которое для него свойственно. Кстати, расстояние это может установить врач.

Детям разрешается сидеть на любом расстоянии. Зачастую они располагаются просто на полу, глядя на телеэкран и пребывая в самых неудобных позах по нескольку часов. При этом некоторым детям разрешают смотреть телевизор и заниматься — скажем, делать уроки — одновременно. В этом случае следует учесть, что мозг человека может в определенный момент концентрироваться на выполнении лишь одной задачи. Попытка сконцентрироваться на выполнении домашнего задания и одновременно смотреть телевизионную передачу — одна из самых плохих умственных нагрузок и может вызвать перенапряжение глаз.

Для хорошего зрения необходим воздух: глаза должны получать кислород. Поэтому позаботьтесь о вентиляции. Особенно зимой, когда включено отопление и комната становится, по сути, герметически закупоренной.

Вот несколько правил, которых следует придерживаться при просмотре кинофильмов и телевизионных передач.

Сидите обязательно на том расстоянии, которое соответствует типу вашего зрения.

Не наклоняйте голову и не запрокидывайте ее. Смотрите на экран прямо, часто моргайте.

Не следует смотреть в одну точку, пусть глаза путешествуют по всему экрану.

В то же время, когда действие на экране разворачивается медленно или между сериями, мягко закройте глаза, дайте отдохнуть и укрепиться нервам сетчатки.

При возможности сидите прямо перед экраном, а не сбоку.

Для тех, кто нуждается в укреплении зрения, кинотеатр и телевизор могут стать хорошими помощниками.

Для близоруких: снимите очки и закройте ладонями глаза. Для глаз

очень вредно, когда вы снимете очки и сразу, не дав им привыкнуть к перемене, требуете интенсивного напряжения.

Сядьте так близко к экрану, чтобы вы могли видеть, что происходит, не очень четко, но вполне достаточно для того, чтобы следить за действием. Не старайтесь увидеть четкое изображение, просто смотрите, дышите глубоко, смотрите на весь экран, и вскоре вы почувствуете улучшение.

Сидите на одном и том же расстоянии от экрана и меняйте его только тогда, когда наступит реальное улучшение. В этом случае немного увеличьте расстояние. Один из моих близоруких пациентов, пишет Хаксли, начал сидеть в первом ряду, а через несколько месяцев сидел уже в последнем ряду балкона.

Для дальновзорких: снимите очки и определите, где вам удобнее смотреть на экран. Часто страдающие дальновзоркостью обнаруживают, что очки сокращают им зрение даже на расстоянии. Этим людям придется улучшать свое зрение как на близком расстоянии, так и на далеком. В этом случае сядьте вначале близко к экрану, а затем отодвиньтесь и найдите удобное для вас место на расстоянии от экрана. Если зрение вдаль не затруднено, сядьте как можно дальше и постепенно придвигайтесь к экрану по мере улучшения зрения.

Обратите внимание на все правила для восстановления хорошего зрения: моргание, перевод взгляда, дыхание, кратковременное прикрывание глаз для ослабления напряжения мышц глаз и век и периодически — в темноту для отдыха нервов сетчатки.

(Г. ДЕМИРЧОГЛАН.

"Советский спорт" 23/IX-90 г.).

ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДЫ

подробное описание того, что делала
ИАНА ВАЛЕСТР в период беременности

"Это было в июне, я была беременна и должна была родить моего первого ребенка в возрасте 30 лет.

В один прекрасный день овощные салаты, которые я так любил, стали казаться мне безвкусными, как древесные опилки, и я переключилась на совершенно другую диету, в частности:

В 1, 2 и 3-й месяцы беременности мне ничего не хотелось есть кроме грейпфрута и лесных орешков три раза в день.

4-й, 5-й и 6-й месяцы, кроме грейпфрута я ела и др. виды фруктов, тыквы, как сливы, груши, яблоки и ягоды, выращенные без химических удобрений.

Мы вычитали, что чай из малины очень полезен при беременности и поэтому засушили много этих листьев. Всю зиму я пила настой из листьев малины с медом и пятьдесят граммов морковного сока ежедневно. Если было задержание мочи, ела ананасы.

Самочувствие было короче. К врачу обратилась только в 6 месяцев. Доктор осмотрел меня, удивился сильному биению сердца ребенка и тому, что у меня не было лишнего веса и токсичности. Он верил в естественные роды и был доволен моей простой натуральной пищей. Я прогуливалась каждый день, делала упражнения для естественных родов и выполняла домашнюю работу.

И, наконец, мой ребенок выскочил на свет с пронзительным криком, голова его была покрыта густыми волосами.

Изумительный цвет кожи был предметом разговора сестер и врачей. К всеобщему удивлению врачей, я была готова кормить ребенка грудью, сначала молоко шло медленно, но скоро у меня пошло обильное жирное молоко. В больнице я просила давать из кухни только живую пищу. Муж и сестра ежедневно приносили мне 1 л морковного сока и мешочек орехов как добавку к моей простой пище. Принесенные мне сухофрукты были объявлены опасными для ребенка, т. к. у него будет понос. Но я их употребляла в течение 9 месяцев. 60% употребляемой мной пищи — составляли фрукты и овощи. Кишечник моего ребенка бездействовал. На 5-й день после рождения был первый небольшой нормальный стул, никакого запора и никакого поноса! Почему же стул был таким редким? Тайна была раскрыта позже. Оказалось, что пища усваивается им настолько полностью, что ничего необычного в том нет. Редкий стул продолжался до тех пор, пока ребенок питался грудью ибо хорошо усваивал материнское молоко. В 6 месяцев ему дали морковный сок, тертые бананы и авокадо. После этого стул стал регулярным. До годовалого возраста, кроме материнского молока ребенок ел фрукты, протертые через сито. Вскоре он сам начал выбирать и есть свежие фрукты по сезону...

Большинство моих друзей пичкали ребенка кашами и давали пастеризованное молоко. Вследствие этого, дети не в состоянии были переваривать крахмалы, без конца простужались и болели.

Моему ребенку 3 года, лица его состоит из свежих и сушеных фруктов, сырых овощей и их соков, орехов, семян и меда. Он хорошо развит умственно и физически, полон энергии и очень любознателен.

Часть вторая

**НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ФИЗИОТЕРАПИЯ**

ВВЕДЕНИЕ

Вторая часть сборника охватывает немедикаментозные способы лечения и физиотерапию на основе нетрадиционных методов лечения.

Немедикаментозные способы включают: сокотерапию, овощи, ягоды, фрукты, лечение продуктами пчеловодства (мед, прополис, пыльца, маточное молочко, пчелиный яд), мумие, живую и мертвую воду, водолечение, холодотерапию, диетотерапию. Читатель и специалист найдут также нетрадиционные способы физиотерапии: дыхание по системе Бутейко, магнитотерапию, электронотерапию, металлотерапию, акупунктуру и точечный массаж.

Читатель, и особенно специалист, найдет во второй части сборника обширный полезный для себя материал по различным способам лечения не правами (особенно, если есть противопоказания или какие-то другие причины, из-за которых нельзя применять траволечение). Кроме того, бывает так, что немедикаментозные методы и нетрадиционные способы дают более эффективные результаты с учетом индивидуальности больного и опыта лечащего врача. Необходимо отметить, что иногда эти методы в прямом смысле слова чудотворны при лечении многих болезней, особенно когда по неизвестным причинам не помогает траволечение.

Наконец, материалы данного раздела могут служить объектом глубокого исследования для научной медицины с целью разработки новых методов и рецептов для их использования в классической медицине после обширного изучения на практике.

Составитель.

Немедикаментозные способы лечения

С О К О Т Е Р А П И Я
(ОВОЩИ, ЯГОДЫ, ФРУКТЫ)

Лечение овощными и фруктовыми соками

Всем ясна важность и полезность фруктов и овощей для организма человека и особенно для больного. "Обширные и глубокие исследования, проводившиеся в течение многих лет научными учреждениями мира, дали возможность ученым со всей убедительностью заявить, что фрукты и овощи сами по себе являются важнейшими и весьма высокоценными продуктами питания, а соки, получаемые из них, содержат почти все компоненты свежих плодов и овощей."*

Наличие органических кислот, биостимуляторов, органических микроэлементов, множества солей и витаминов, в том же других веществ, вызывают слюноотделительные рефлексы в полости рта. Фрукты и соки из них повышают активность ферментов и обмен веществ, им присуще и общеукрепляющее действие, связанное с влиянием на пищеварение и усвоение пищи. Вышеизложенное указывает на лечебные свойства фруктов и овощей.

Соки из фруктов, ягод, овощей

Овощи и фрукты имеют большое значение в нашем питании и, следовательно, для нашего здоровья. Они служат источником не только витаминов и минеральных солей, но содержат также клетчатку, органические кислоты, пектиновые соединения, ароматические вещества и эфирные масла. В них содержится большое количество витаминов С, В₁, В₂, В₆, Е и А. Кроме того, они обладают лечебными свойствами для лечения многих болезней.

По содержанию витаминов овощи и фрукты можно разделить на следующие группы:

Первая группа. Овощи и фрукты, доставляющие в организм человека главным образом витамин С, а также минеральные вещества, сахар, клетчатку, витамины А и В₂.

К этой группе принадлежат помидоры, лимоны, апельсины, грейпфрут, капуста (особенно квашеная), смородина, крыжовник, лесные ягоды, стручковый перец, малина, клубника, зелень петрушки.

Вторая группа. Овощи и фрукты, снабжающие организм главным образом каротином. Овощи и фрукты этой группы поставляют, кроме того, минеральные вещества, витамин С, сахар, клетчатку, витамин В₂.

К этой группе принадлежат морковь, помидоры, дыня, абрикосы, тыква, лук-порей, брюссельская капуста, зеленые стручки гороха и фасоли, зелень петрушки, красный перец, рябина.

Третья группа. Овощи и фрукты, содержащие небольшое количество минеральных веществ и витаминов, растворимых в воде и положительно

* Самсонова А. Н., Ушва В. Б. Фруктовые и овощные соки. М., Пищевая промышленность, 1976.

влияющих на обмен веществ в организме (витамин С и витамины группы В).

К этой группе относятся свекла, огурцы, сельдерей, репчатый лук, редиска, петрушка, яблоки, груши, сливы, черешня и виноград.

Так как овощи и фрукты часто бывают загрязнены микробами, в иногда химическими веществами (средствами защиты растений), первичную обработку следует производить очень тщательно.

Чтобы приготовленные напитки сохранили питательную ценность исходного сырья, следует:

1. Овощи и фрукты, предназначенные к обработке, тщательно перебирать, откидывая испорченные и несвежие.

2. Старательно мыть овощи и фрукты под краном. Особое внимание обращать на клубнеплоды, которые бывают очень загрязнены землей и находящимся в ней микробами. Клубнеплоды мыть щеткой.

3. Овощи и фрукты, которые нельзя подвергать обработке с кожицей, вымыть, а затем срезать с них кожицу (тонкий слой) острым нержавеющей ножом или желобковым.

4. Очищенные овощи промыть быстро, чтобы они не потеряли ценных веществ (очищенные фрукты не мочут).

5. Фрукты и овощи, предназначенные для приготовления натуральных соков, перерабатывать быстро и непосредственно перед приготовлением.

Соки нужно готовить только из свежих, не подпорченных овощей, фруктов и плодов и сразу пить.

Как готовить соки в домашних условиях*

Их нужно делать только из свежих, не подпорченных овощей, фруктов, плодов и сразу пить. Советские ученые установили, что соки, полученные на центрифуге или центробежной соковыжималке, лучше чем соки, полученные другими методами, например, при помощи пресса. Центрифужный сок готовится в 3—4 раза быстрее, меньше окисляется. Так, в центрифужном яблочном соке количество флавоноидов может быть в 3 раза, в лейкоантоцианов (красящих веществ) в 10 раз больше, чем в прессованном. Кроме того, центрифужный сок содержит до 10 проц. мякоти и является нектаром. В него переходят значительно больше ФАВ (физиологически активных веществ), и следовательно, он биологически ценнее для организма. Сок надо употреблять сразу же после приготовления.

Даже кратковременное хранение в холодильнике ускоряет брожение и порчу продуктов, хотя его вкус может не измениться. Консервированные соки действуют менее активно, чем свежие.

В каком количестве можно пить соки?

Соки можно пить столько, сколько пьется с удовольствием, не принуждая себя. Как правило, для получения заметных результатов, необходимо

* Иванченко В. А. Растения и работоспособность. Биология 1984/6, М., "Знание".

пить по меньшей мере 600 мл в день. Нужно иметь ввиду, что чем больше мы пьем соки, тем скорее достигаем желаемых результатов.

Как мы можем оградить себя от влияния химических веществ, применяемых в сельском хозяйстве

Удалось установить, что химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве против вредителей, собираются в клетчатке и что яды не влияют на зизимы, атомы и молекулы овощей и фруктов.

Хорошо известно, что отсутствие правильного соотношения элементов в натуральных дешевых продуктах находится в прямой зависимости от соответствующего недостатка или отсутствия элементов в почве, где они росли.

Растирая овощи, мы освобождаем элементы из клетчатки, выжимая сок, ядовитые вещества остаются связанными в клетчатке. Такой сок содержит все энзимы, атомы и молекулы элементов, входящих в состав пищи фруктов и овощей, и он свободен от химикатов.

Таким образом, мы нашли ответ на вопрос, как должно предохранить себя от воздействия ядовитых химических веществ, так широко применяемых во всем мире. Разумеется, при употреблении салата мы не можем гарантировать себя от химикатов. В этом случае надо стараться закупать продукты, не опрысканные химикатами, или применять выращенные самими.

1. ОВОЩНЫЕ СОКИ

СОК БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЫ

Смесь брюссельской капусты с морковным, салатным и соком стручковой фасоли дает такое сочетание элементов, которое помогает усвоить и восстановить функции поджелудочной железы. Установлено, что соки эти исключительно полезны при диабете.

Однако они приносят пользу только в тех случаях, когда концентрированные крахмалы и сахар исключаются из диеты, а кишечник регулярно очищается от шлаков клизмами.

СОК КАПУСТЫ

При употреблении капустного сока удивительно быстро поддается лечению язва двенадцатиперстной кишки. Единственным неудовольствием является частое образование газов. С равным успехом можно использовать морковный сок, который гораздо вкуснее.

Сок капусты обладает великолепным очищающим действием и сбавляющим вес свойством. Образование газа в кишечнике объясняется тем, что сок капусты разлагает накопившиеся в кишечнике продукты гниения химической реакцией. Клизмы помогут удалению как газа, так и продуктов гниения, вызывающих газы.

Если после питья сока капусты образуется большое количество газов или ощущается беспокойство, то это может быть следствием ненормального

токсического состояния кишечника. В этом случае рекомендуется перед употреблением большого количества этого сока очистить кишечник, выпивая ежедневно морковный сок, либо смесь соков моркови и шпината в течение двух или трех недель с ежедневным очищением клизмой. Замечено, что когда кишечник в состоянии усвоить капустный сок, то он действует как идеальное очистительное средство, в особенности при ожирении.

Смесь соков моркови и капусты образует великолепный источник витамина С как средство очищения, в особенности, при инфекции десен, вызывающей парадантоз.

Сок капусты весьма эффективен, применяется при опухолях и запорах. Так как запоры являются основной причиной сыпи на коже, что они исчезает при употреблении этого сока.

Добавление соли к капусте не только уничтожает ее ценность, но и вредно.

Сок из свежей капусты употребляют при хронических гастритах, особенно с пониженной кислотностью, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, заболеваниях печени и селезенки, ожирении.

Принимают 1—2 стакана 2—3 раза в день за час до еды и теплом виде.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СОК

Сырой картофель содержит легко усвояемый сахар, который при варке превращается в крахмал. Лицам, страдающим венерическими заболеваниями, а также склонным к половому возбуждению, не следует есть картофель.

Сок сырого картофеля хорошо очищает весь организм. В смеси с морковным соком и соком сельдерея очень хорошо он помогает при нарушениях пищеварения, нервных расстройствах, например, при ишиасе и зобе. В этих случаях ежедневное употребление 500 г морковного, огуречного, свекольного и картофельного сока очень часто дает положительный результат за короткий срок, при условии, что исключены все мясные и рыбные продукты.

ЛИМОННЫЙ СОК

Лимон очень богат минеральными солями, особенно витамином С и лимонной кислотой, поэтому его употребление очень важно для организма. У него сильное антимикробное, антисептическое действие. Так, например, в южном Египте, где распространен скорпион, часто жители деревень подвергаются ужаливаниям скорпионом. Тогда просто берут лимон, режут его пополам, одну половину кладут на место ужаливания, а другую половину сосут, и все проходит.

Сок лимона принимают при атеросклерозе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни, нарушенном обмене веществ, геморрое, лихорадочных состояниях. Его можно пить, добавляя сок 0,5 лимона и 0,5 стакана горячей воды, 2—3 раза в день. Его добавляют и в салаты из свежих овощей без добавления поваренной соли.

Сок лимона, разведенный в воде (0,5 лимона на 0,5 стакана теплой воды) полезен для полоскания при ангине, воспалительных заболеваниях слизистой оболочки рта и глотки. Также сок применяется как наружное лекарство при грибковых заболеваниях кожи.

При каменной болезни в желчном пузыре пьют 10—12 стаканов и около 1,5 литра смеси морковного, свекольного и огуречного соков в течение всего дня. Через день-два начнутся приступы сильных болей, по 10—15 минут. На 6—7 день наступит кризис с сильными болями, затем боль утихнет, и вскоре после этого все пройдет, и камень исчезнет. При очень сильных болях обратиться к врачу для получения болеутоляющих лекарств.

СОК ЛЮЦЕРНЫ

Одним из наиболее богатых хлорофиллом растений является люцерна. Потребление в пищу люцерны дает человеку здоровье, силу и энергию до глубокой старости, при этом сопротивляемость организма к инфекциям — феноменальна.

Сок свежей люцерны очень силен, поэтому его лучше пить в смеси с морковным соком. В этом случае польза, приносимая каждым соком в отдельности, увеличивается. Было отмечено, что такая комбинация хорошо помогает при большинстве сердечных болезней, а также болезнях артерий.

Хлорофилл хорошо помогает при расстройствах дыхательной системы, в особенности легких и полостей черепа. Причиной заражения пазух и болей, а также бронхального и астматического состояния, включая сенную лихорадку, является слезь.

Сок моркови, люцерны и латука (сорт салата) восполняет необходимые вещества для питания корней волос. Ежедневное использование этой смеси (0,5 литра) поможет росту волос в значительной степени.

СОК СЫРОЙ МОРКОВИ

В зависимости от состояния человека, сырой морковный сок можно пить от 0,5 до 3—4 литров в день. Сок этот помогает приводить весь организм в нормальное состояние. Он — самый богатый источник витамина А, который организм быстро усваивает. В этом соке содержится большое количество витаминов В, С, Д, Е, К. Морковный сок улучшает аппетит, пищеварение и структуру зубов.

Кормящая грудью мать, с целью улучшения качества молока, должна пить ежедневно много морковного сока.

Сырой морковный сок является естественным растворителем при язвах и раковых образованиях. Он повышает сопротивляемость к инфекциям, действует весьма эффективно вместе с поджелудочной железой, он повышает сопротивляемость желез и пазух лицевого черепа и дыхательных органов тела. Сок этот предохраняет нервную систему и не знает себе равных для повышения энергии и силы.

Сухая кожа, дерматит (воспаление кожи) и др. кожные заболевания также являются причиной недостаточности в организме этих элементов питания, содержащихся в сырой моркови. То же самое относится к глазным болезням, таким как офтальмия, конъюнктивит и т. д.

Как средство борьбы против язв и раковых образований, сырой морковный сок является чудом нашего века. Однако, необходимо, чтобы он был приготовлен правильно (хорошо извлечен из клетчатки), а всякая пища, содержащая концентрированный сахар, крахмал и какую бы то ни было зерновую муку, была полностью исключена.

Этот сок особенно хорошо питает **ОПТИЧЕСКУЮ** систему.

Не менее эффективен свежий сок обыкновенной моркови в лечении язв и рака. Ткани, ослабленные от голодания клеток и именуемые язвами и раковыми образованиями, могут быть возвращены в более здоровое состояние применением морковного сока.

ОГУРЕЧНЫЙ СОК

Вероятно, огурцы являются наилучшим мочегонным средством. Однако огурцы обладают и другими ценными свойствами, такими, как улучшение роста волос; они укрепляют сердце и сосуды.

Огурцы содержат более 40 проц. калия, 10 проц. натрия, 7,5 проц. кальция, 20 проц. фосфора, 4,7 проц. хлора.

Добавление огуречного сока к морковному весьма благотворно влияет при ревматических заболеваниях, а такие болезни являются следствием содержания мочевой кислоты в организме.

Прибавление к этой смеси некоторого количества свекольного сока ускоряет общий процесс.

Высокое содержание калия в огурцах делает его очень ценным при высоком и низком кровяном давлении.

Огуречный сок помогает при плохом состоянии зубов и десен, как, например, при парадантозе.

Наши ногти и волосы особенно нуждаются в сочетании элементов, имеющихся в свежем огуречном соке и предотвращающих расщепление и выпадение волос.

Сок может быть полезен для профилактики перенапряжения миокарда. Он успокаивает и укрепляет нервную систему, препятствует атеросклерозу и улучшает память. Можно принимать до 100 мл чистого сока. Его действие усиливается при комбинации с другими соками, например, черносмородиновым, яблочным, грейпфрутовым (2:2:1:1) или томатным и чесночным (20:20:1).

СОК ОДУВАНЧИКА

Сок этот является одним из самых ценных тонизирующих и укрепляющих средств. Он необходим для нейтрализации сверхкислотности и нормализации щелочного состава организма. Сырой сок одуванчика, полученный из листьев и корней, сочетаемый с морковным соком и соком листьев репы, помогает при недугах позвоночника и др. болезнях костей, а также придает крепость зубам, предотвращая тем самым пародонтоз и их разрушение.

СОК ПЕРЦА (ЗЕЛЕНОГО)

Этот сок содержит изобилие кремния, так необходимого для ногтей и волос, он также помогает салыным железам и протокам.

В смеси с морковным соком (от 25 проц. до 60 проц. перцевого сока) дает великолепные результаты в очищении кожи от пятен.

Лица, страдающие от образования газов и кишечнике, от колик, спазм в кишечнике, получали большое облегчение при употреблении 500 мл этого сока ежедневно.

СОК ПЕТРУШКИ

Петрушка — это зелень, а сок ее — один из самых сильнодействующих соков, поэтому никогда не следует пить отдельно более 30—60 мл этого сока. Лучше, если это количество смешать с морковным, салатным, шпинатным или сельдерейным соком.

Сырой свежий сок петрушки обладает свойствами, необходимыми для кислородного обмена и поддержания нормальной функции надпочечников и щитовидных желез. Имеющиеся в нем элементы содержатся в таком сочетании, что способствуют укреплению кровеносных сосудов, особенно капилляров и артерий.

Сок этот — отличное средство при заболеваниях мочеполового тракта и очень помогает при камнях в почках и желчном пузыре, в мочевом пузыре, при нефрите, когда белок в моче, и других заболеваниях почек. Он успешно применяется при водянке.

Он также эффективен при заболеваниях глаз и системы зрительного нерва, изъязвлении роговой оболочки глаза, катаракте, конъюнктивите, офтальмии. Вялость зрачка во всех стадиях лечится эффективно питьем сырого сока петрушки, смешанного с морковным соком и соком сельдерея и индивия.

Сок петрушки в смеси со свекольным соком успешно применяется для менструаций. Спазмы, вызванные менструальным нарушением, очень часто прекращаются совсем при регулярном употреблении этих соков. При этом из диеты исключаются крахмалы, сахар и мясо.

Сок принимают вместе с морковным 1:3, когда нужно быстро восстановить зрение, пониженное при напряженной работе глаз. Сок улучшает дыхание, сердечную деятельность. Нельзя пить его при воспалении почек. Его принимают при гипертонии.

Количество сока на прием должно быть не больше 1 столовой ложки.

СОК РЕДИСА

Этот сок добывается из листьев и корней, и никогда не следует пить его отдельно, ибо он вызывает сильную реакцию.

В сочетании с морковным соком, он помогает восстановить тонус слизистой оболочки организма. Он особенно эффективен, если его пить в течение часа после принятия сока хрена, описанного в соответствующей главе. Этот сок успокаивает, исцеляет болячки и очищает организм от слизи, которую растворил сок хрена.

Кроме этого, он способствует восстановлению слизистых оболочек.

Обычно в большинстве случаев нет необходимости удалять слизь, вызывающую свист, при помощи операции. Благодаря операции, удаляется определенное количество слизи, но послеоперационный эффект в конечном счете будет отрицательным.

Для этой цели лучше использовать соус из хрена и лимона, который дает отличный результат. Причиной образования слизи является чрезмерное употребление молока и молочных продуктов, концентратов крахмалов, хлеба и крупы.

СОК РЕПЫ

Ни один из овощей не содержит такой высокий процент кальция, как лист репы.

Поэтому этот сок — великолепная пища для детей и лиц, страдающих размягчением зубов и костей. Смешивая сок листьев репы с морковным соком и соком одуванчика, мы получим одно из самых эффективных средств для укрепления зубов и всех остальных костных тканей организма.

Содержание калия в листьях репы такое высокое, что придает этому соку качество увеличивать щелочной состав организма, особенно, если смешивать этот сок с соком сельдерея и моркови. Поэтому он является отменным средством для понижения кислотности. Листья репы содержат большой процент натрия и железа.

СВЕКОЛЬНЫЙ СОК

Сок свеклы — самый ценный сок для образования красных кровяных шариков и для улучшения крови вообще.

Женщинам он особенно полезен, если его пить минимум 0,5 литра в день (в смеси с морковным соком).

Один только свекольный сок при употреблении одного винного бокала за раз может вызвать очистительную реакцию, а именно: небольшое головокружение или тошноту. Опыт показал, что и первое время лучше пить смесь, где преобладает морковный сок, а затем постепенно увеличивать количество свекольного сока, пока организм лучше перенесет его очистительное полезное действие. Обычно достаточно от 1 до 1,5 стакана свекольного сока 2 раза в день.

Во время менструального расстройства сок свеклы весьма полезен, в особенности, если во время этого периода сок пить небольшими порциями, не более одного винного бокала (50—100 мл) два или три раза в день.

Во время климактерического периода такая процедура дает гораздо больший постоянный эффект, чем выжигающее действие лекарства из синтетических гормонов.

Самым положительным свойством является то, что в свекле содержится более 50 проц. натрия и только 5 проц. кальция. Это соотношение ценно для поддержания растворимости кальция, когда вследствие употребления вареной пищи в организме накопился неорганический кальций в кровеносных сосудах, например, при расширении вен или их затвердении, или сгущении крови, вызывающих высокое давление крови и другие виды нарушения сердечной деятельности.

Содержание и красной свекле кальция обеспечивает общее питание для всех физиологических функций организма, а содержание хлора является великолепным органическим очищающим средством печени, почек и желчного пузыря, стимулируя также деятельность лимфы во всем теле.

Смесь морковного и свекольного соков является наилучшим естественным стронтемом кровяных клеток, особенно красных кровяных шариков.

Он стимулирует образование эритроцитов, улучшает память особенно при атеросклерозе, расширяет кровеносные сосуды. При гипертонической болезни это одно из лучших природных средств. Он незаменим при мало-

кровии, улучшает самочувствие. Он укрепляет нервную систему при неврозе и бессоннице.

Сок лучше оставить на несколько часов в холодильнике, снять пену и употребить в смесь с морковным в соотношении 1:4. Венгерские ученые считают, что улучшить состояние больных злокачественными опухолями может именно свежий сок. Они советуют пить его не более 100 мл в сутки. Сок можно получить как из корнеплодов, так и из молодой ботвы.

СОК СЕЛЬДЕРЕЯ

Сухая жаркая погода легче переносится, если утром выпить рюмку сока свежего сельдерея и столько же днем, между принятием пищи. Это нормализует температуру тела, и мы чувствуем себя превосходно.

Смесь сока сельдерея с другими соками весьма полезна и дает почти феноменальный результат в случае авитаминоза и при других недугах.

При нервных расстройствах, являющихся результатом перерождения (дегенерации) оболочек нервов) употребление соков моркови и сельдерея помогает их восстановлению.

Если в принимаемой пище нет достаточного количества серы, железа и кальция или даже имеется большое количество этих элементов, но они в лишенном жизненной силы, неорганическом виде, то могут быть вызваны такие нарушения, как астма, ревматизм, геморрой и т. д.

Он повышает тонус, улучшает аппетит, мочегонный и слабительный эффект. Его лучше всего пить тучным людям с нарушением обмена веществ и быстрой утомляемостью. Сок содержит витамины С, В₁, В₂, РР. Для профилактики обычно достаточно одной-двух чайных ложек сока 3 раза в день за 30 минут до еды, всего до 100 мл в сутки. Популярны такие сочетания: морковь, свекла, сельдерей (8:3:5), морковь, капуста, сельдерей (1:4:5), морковь, сельдерей, редька (8:5:3).

СОК СПАРЖИ

Сок спаржи очень эффективен как мочегонное средство, в особенности с морковным соком, так как он может иметь сильную реакцию на почки, если пить его отдельно.

Сок спаржи очень эффективен при почечных заболеваниях и при восстановлении больных желез. При малохровии и диабете этот сок полезен вместе с другими соками, предназначен для лечения этих болезней.

Так как этот сок способствует распаду кристаллов щавелевой кислоты в почках и во всей кишечной системе, то он полезен при ревматизме, неврите и т. д. Причиной ревматизма являются, конечно, продукты пищеварения, получающиеся при употреблении мяса и мясных продуктов, образующих большое количество мочевины. Постоянное употребление животных продуктов перегружает почки и другие органы выделения, в результате чего все меньшее количество мочевой кислоты выделяется из организма и соответственно большее ее количество поглощается мышцами.

Следствием этого является ревматизм.

Такое состояние — одна из причин заболевания предстательной железой. В этом случае сок спаржи вместе с морковным и огуречным хорошо помогает.

СОК СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛИ

Сок этот особенно полезен диабетикам. Диабет является болезнью, вызванной неправильным питанием, а именно, чрезмерным употреблением концентрированных крахмалов и сахаров.

Признано, что инъекции инсулина не являются лечением этой болезни. Диабет — не наследственная болезнь, она может быть вызвана употреблением большого количества концентрированных углеводов.

Установлено, что сок стручковой фасоли и брюссельской капусты содержит элементы, обеспечивающие нормальное выделение инсулина для содержания пищеварительных органов.

ТОМАТНЫЙ СОК

Томатный свежий сырой сок — один из самых полезных соков, имеющих щелочную реакцию, при условии, если при этом не присутствуют концентрированные сахар и крахмалы, в противном случае реакция будет определенно кислой.

Помидоры содержат довольно высокий процент лимонной и яблочной кислоты, а также некоторый процент щавелевой кислоты. Эти кислоты все полезны и необходимы при обменных процессах организма, если они находятся в органическом виде. Если помидоры варятся или консервируются, то эти кислоты становятся неорганическими, и как таковые вредны для организма. В некоторых случаях образование камней в почках и мочевом пузыре является прямым следствием употребления вареных или консервированных томатов, или их соков, особенно с крахмалом и сахаром.

Он хорошо стимулирует образование желудочного сока, улучшает деятельность сердца. Выпивая стакан сока, вы обеспечиваете половину суточной потребности в витаминах А и С. Этот сок часто используют в смеси с соком яблок, тыквы и лимона (2:4:2:1), особенно когда необходимо похудеть.

СОК ХРЕНА

Мы не применяем сок хрена, ибо в таком виде эфирные масла очень сильны, поэтому рекомендуется применять хрен в виде кашицы с добавлением лимонного сока два раза в день по пол чайной ложки натощак.

Такая смесь помогает разложению слизи в местах ее накопления без повреждения слизистой оболочки.

Кроме того, кашица хрена с лимонным соком является сильным мочегонным средством, особенно ценным при отеках и водянке.

Как правило, самые удовлетворительные результаты получаются при употреблении кашицы хрена в соотношении: смесь 2—3 лимонов (сока) и 150 г хрена.

СОК ЦИКОРИЯ-ЭНДИВИЯ

Цикорий имеет питательные вещества, а которых постоянно нуждается оптическая система глаз. Прибавляя к этому соку сок моркови, петрушки, сельдерея, мы снабжаем мышечную систему глаз, что дает удивительные результаты восстановления дефектов зрения.

250—500 мл смеси такого сока ежедневно часто восстанавливает зрение до нормального в течение нескольких дней или недель, и во многих случаях устраняется необходимость носить очки.

ЩАВЕЛЕВЫЙ СОК

Сок щавеля великолепно помогает при восстановлении вялых кишок. Этот овощ богат оксалатом калия, который ценен для человеческого организма в его органическом состоянии. Никогда не следует употреблять щавель в вареном виде.

Щавель содержит особенно большое количество железа и магния, в которых постоянно нуждается кровь, и огромное количество очищающих элементов — фосфора, магния, кремния, серы, которые необходимы всем частям организма, от головы до ног.

Совокупность этих элементов делает щавелевый сок очень ценным для питания всех желез человеческого тела.

СМЕСЬ СОКОВ МОРКОВИ, СВЕКЛЫ И ОГУРЦОВ

Камни и песок в желчном пузыре и в почках являются естественным результатом несостоятельности организма вывести накопившийся кальций, образовавшийся вследствие употребления концентрированных крахмалов и сахара.

Сок одного лимона в смеси с 0,5 стакана горячей воды несколько раз в день и 0,5 стакана смеси морковного, бурачного и огуречного соков (3—4 раза в день) поможет исчезновению камней и песка в почках в течение нескольких дней или недель (в зависимости от размера и количества камней).

Приведем только один из многочисленных примеров: мужчина около 40 лет в течение 20 лет страдал многочисленными острыми болями. Врачи установили камни в желчном пузыре, что было подтверждено рентгеновскими снимками. Только его отвращение и страх перед операцией оставили его желчный пузырь там, где ему должно быть.

Узнав об успехах соковой терапии и прочитав одну из ранних изданий книги доктора Уокера, он обратился к автору. И тот ему сказал, что быстрое лечение соками может вызвать более сильные боли, чем те, которые он испытывал раньше, что они будут продолжаться от нескольких минут до одного часа и затем с прохождением растворенного кальция вовсе прекратятся. Он начал пить 10—12 стаканов горячей воды, прибавляя сок одного лимона в каждый стакан воды и около 1,5 литра смеси морковного, свеклоного и огуречного соков в течение всего дня. На следующий день у него начались сильные приступы ужасной боли, по 10—15 минут каждый. К концу недели наступил кризис, во время которого он катался по полу от сильнейшей боли, вдруг боль утихла и вскоре после того, как камни вышли наружу, они вызвали реакцию в виде грязи в моче. В этот вечер он стал совершенно другим человеком, чувствуя себя на 20 лет моложе и удивляясь простоте чудодействия природы.

Смесь морковного, свеклоного и огуречного соков дает нам великолепное средство для целительного очищения желчного пузыря, печени, а также предстательной и других половых желез.

В то же время, необходимо воздержаться хотя бы на некоторое время от употребления концентрированных сахаров и крахмалов, а также мяса, чтобы дать возможность организму прийти в нормальное состояние.

2. ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

Известно, что целебные свойства растений обусловлены многими факторами. Знание лечебных свойств того или иного растения позволяет с успехом использовать его при лечении определенного заболевания.

Из огромного числа растений-целителей опишем лечебные свойства лишь некоторых. Это фрукты и ягоды.

Пищевые растения отличаются от несъедобных тем, что не содержат ядовитых и сильнодействующих веществ (многие из которых, кстати, находят применение в медицине).

Пищевые растения служат основными источниками углеводов, особенно ценных жиров (содержащих ненасыщенные жирные кислоты), многих витаминов и других биологически активных веществ, не содержащихся в животной пище, обладающих лечебными и профилактическими свойствами*. Ниже описываются лечебные свойства ряда фруктов и овощей и их применение.

АБРИКОСЫ

Содержат до 20—27 проц. сахаров, органические кислоты — салициловую, яблочную, лимонную, провитамины А (каротин), витамины С и В₁₅. Абрикосы богаты солями калия (305 мг% калия содержится в свежих плодах и 1717 мг% — в сушеных), железа. Абрикосы оказывают целительные действия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, при ожирении. Сушеные абрикосы — курага и урюк являются мочегонными средствами.

Они богаты фосфором и магнием, которые требуются организму для активной работы мозга, и прекрасно его тонизируют. Недавно ученые установили его явно положительное действие на сосуды мозга. Абрикос улучшает память и повышает работоспособность мозга. Он богат микрокальцием, необходимым для сердца, и также увеличивает гемоглобин в крови, который способствует увеличению сопротивляемости организма, а также помогает при анемии.

АРБУЗЫ

Содержат витамины С, РР, В₁, В₂, каротин, фолиевую кислоту, а также клетчатку, пектины, углеводы, соли калия. Они оказывают благотворное влияние при болезнях почек (и том числе и при камнях), заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в том числе при гипертонии, а также при атонии кишечника. Арбузы прекрасно утоляют жажду при лихорадке и способствуют выведению ядовитых веществ из организма.

Арбузы — незаменимое мочегонное средство при отеках, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Арбузный сок не

* Воробьев Р. И. Питание и здоровье. Москва, 1990.

только выводит из организма излишнюю жидкость, но и обеспечивает его легкоусвояемыми сахарами. Клетчатка арбуза усиливает перистальтику кишечника, ускоряет выведение избытка холестерина. Диетологи считают, что в день можно потреблять до 2—2,5 кг арбуза. Например, при почечно-каменной болезни щелочность мочи под влиянием веществ, содержащихся в арбузе, повышается, соли переходят в растворимое состояние и выводятся благодаря мочегонному эффекту. В этом случае нужно стремиться к "равномерному потреблению": есть арбуз порциями, и даже ночью.

Нет лучшей пищи для больных склерозом, подагрой, артритами, диабетом, чем арбуз.

БРЮКВА

Незаслуженно забытое пищевое и лечебное растение. Неприхотлива, может выращиваться чуть ли не на всей территории СССР. Содержит до 10 проц. сахаров, 2 проц. белка, витамины С, В, В₂, пектины, служит хорошим источником железа для организма. Сок брюквы обладает отхаркивающими свойствами. Применяется при железодефицитной анемии, атеросклерозе, воспалительных заболеваниях легких. Сок брюквы применяют наружно при гнойничковых заболеваниях кожи и ожогах, так как он оказывает прекрасное противомикробное действие благодаря наличию фитонцидов.

ВИНОГРАД

Был известен своими высокими лечебными свойствами еще в Месопотамии и Вавилоне 5500 лет назад. В Россию виноград завезен в 1613 г., и с тех пор популярность его возрастает.

В винограде содержится калий, кальций, магний, марганец, кобальт, витамины С, Р, РР, В₁, В₆, В₁₂, фолиевая кислота, каротин. Виноград богат углеводами (18—20 проц.), органическими кислотами (яблочной, салicyловой, лимонной, янтарной, муравьиной и др.).

Виноград — эффективное мочегонное, послабляющее и отхаркивающее средство, полезен при болезнях почек, легких, печени, при подагре и гипертонии, применяют его как и общеукрепляющее средство.

Такие сорта винограда, как Изабелла, Мускат, Каберне, Гамбургский оказывают выраженное антимикробное действие.

Сок винограда обладает тонизирующим действием. Он полезен при истощении нервной системы (астения) и упадке сил. Богат глюкозой. Он обладает мочегонными, потогонными свойствами. Снижает содержание холестерина в крови. Пить сок нужно за час до еды три раза в день. Начинать с половины стакана сока и к концу курса, через 1—1,5 месяца, довести до 2 стаканов на прием. Нельзя пить в больших количествах при склонности к поносам, сахарном диабете, ожирении, язвенной болезни желудка, хронических воспалительных процессах в легких.

ВИШНЯ

Ее употребляли еще первобытные люди. Вишня культивировалась в Киевской Руси, откуда распространилась в Суздальское и Владимирское княжества, в Москве известна с XVII века.

В СССР вишня после яблок занимает второе место по распространенности.

Содержит глюкозу и фруктозу, витамины С, В₁, РР, каротин, фолиевую кислоту, органические кислоты, медь, калий, магний, железо, пектины.

Вишня оказывает целебное действие при малокровии, болезнях легких, почек, при атеросклерозе, запорах. Вишневый сок губительно действует на возбудителей дизентерии и гнойных инфекций — стафилококков и стрептококков.

ГРАНАТОВЫЙ СОК

Он полезен своим общеукрепляющим действием, связанным с влиянием на пищеварение и усвоение пищи. Он является биогенным стимулятором и лечит болезни поджелудочной железы. Его употребляют при малокровии, при необходимости очищения крови. Пьют по 0,5—1 стакану сока 3 раза в день за 30—40 минут до еды. Необходимо соблюдать соответствующую диету. Курс лечения длится 2—4 месяца, затем следует месячный перерыв и повторить курс, но следует иметь в виду, что он обладает вяжущим эффектом, а в некоторых случаях может вызвать запор.

Сок принимают также при желудочно-кишечных расстройствах, после инфекционных заболеваний и операции как общеукрепляющее средство.

ГРЕЙПФРУТ

Созревая в декабре, плоды грейпфрута прекрасно сохраняют всю свою ценность до июля. Известны его высокие диетические и лечебные качества — улучшение пищеварения, снижение кровяного давления, нормализация работы печени, восстановление сил организма. Грейпфрут — достойный соратник лимона, но пожалуй, даже несколько опережает его, так как обладает приятным вкусом: пужо только знать, что вся горечь заключается в перегородках между дольками, которые следует удалить.

При атеросклерозе, гипертонической болезни, переутомлении принимать по 0,25 стакана за 20—30 минут до еды, а при бессоннице по 0,5 стакана на ночь.

Принимают сок с мякотью при отсутствии аппетита, нарушении процесса пищеварения.

ГРУША

С доисторических времен известна. Эта культура появилась в Древней Греции более 3 тыс. лет назад. В Россию груша проникла из Византии, в Подмосковье стала разводиться с XVI в.

В груше содержатся витамины С и В₁, сахара, клетчатка, органические кислоты.

Оказывает мочегонное и противомикробное действие, полезна при камнях в почках и при инфекциях мочевых путей.

ДЫНЯ

Богата сахарами (до 13 проц.), витаминами — С, РР, каротином, фолиевой кислотой, а также железом и клетчаткой. Полезна при запорах, ате-

росклерозе, геморрое, болезнях крови, почек и сердечно-сосудистой системы. Имеются данные об успокаивающем (седативном) влиянии дыни на центральную нервную систему.

ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА)

Обладает замечательными пищевыми и лекарственными свойствами. Она была известна еще людям каменного века. Но культура земляники (клубника) стала распространяться в Европе лишь с начала XVIII в., в России — со армен царя Алексея Михайловича.

В клубнике имеются сахара (до 15 проц.), витамины С, группы В, фолиевая кислота, каротин, клетчатка, пектины, кобальт, железо, кальций, фосфор, марганец, лимонная, яблочная, салициловая кислоты. Клубника оказывает общее оздоравливающее влияние на организм. Известный знаток народной фитотерапии М. А. Носаль пишет: "При склерозе, чрезмерном давлении крови (гипертонии), запорах, кишечных недомоганиях и поносах земляника — эффективное средство.

Многие формы старых, запущенных экзем (экземы с нагноением, с трещинами, струпьями, нередко со зловонными язвами), которые не излечивались различными дорогими средствами, успешно вылечивались земляникой...

Из личной практики и наблюдений над самим собой прихожу к заключению, что ее можно и нужно есть так много, чтобы на третьей неделе она настолько надоела, что нужно заставить себя есть ее. Давайте ее детям, давайте много. Не жалейте средств на приобретение земляники. Не считайте ее баловством или роскошью, а считайте ее необходимой".

Клубника нормализует нарушенный обмен веществ, помогает при болезнях сердца, сосудов, желудочно-кишечного тракта — язве желудка, холестиците и камнях в желчном пузыре, кишечных инфекциях, при болезнях почек, малокровии, базедовой болезни, так как клубника благотворно влияет на обмен йода в щитовидной железе. Клубника обладает противомикробной активностью по отношению к возбудителям кишечных инфекций, пневмококкам, стафилококкам, стрептококкам и вирусам гриппа.

КРЫЖОВНИК

Или "северный виноград", известен на Руси с XII в. Содержит сахара (до 14 проц.), органические кислоты, пектины, дубильные вещества. Лекарственную ценность крыжовника повышают входящие в его состав медь, железо, фосфор, витамины группы В, С, Р, каротин.

Крыжовник оказывает благотворное влияние на обмен веществ, является хорошим мочегонным и слабительным средством, помогает при железодефицитной анемии.

МАЛИНА

В ней обнаружены сахара (9—10 проц.), железо, медь, калий, пектины, клетчатка, дубильные вещества, органические кислоты, одна из них — салициловая, оказывает жаропонижающее действие, витамины С, В₁, В₁₂, РР, фолиевая кислота.

В качестве лекарственного средства малина применялась еще в Древней Греции и Риме.

Полезна малина при малокровии и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при атеросклерозе, болезнях почек, гипертонии. Фитонциды малины губительны для золотистого стафилококка, спор дрожжей и плесневого гриба.

В народной медицине плоды и сок малины употребляют в качестве потогонного и жаролонижающего средства при простудах и лихорадке. Сок с сахаром — хорошее освежающее питье для лихорадящих больных.

СОК ПЕРСИКА

Принимают при нарушении сердечного ритма, малокровии, заболеваниях желудка с пониженной кислотностью, при запорах. Принимать по 0,25 стакана сока за 15—20 минут до еды.

Противопоказано: при аллергических состояниях, сахарном диабете, ожирении.

РЯБИНА

С древнейших времен применяют в качестве лекарственного растения. В ней имеются витамины С, Р, К, Е, каротин, глюкоза и фруктоза, органические кислоты, дубильные вещества.

Рябина целебна при гипертонии, атеросклерозе, оказывает мочегонное и кровоостанавливающее действие. Сок рябины в народной медицине применяют при геморрое, гастрите с пониженной кислотностью.

Фитонциды рябины губительны для золотистого стафилококка, сальмонеллы, плесневого гриба. Из рябины выделена сорбиновая кислота, обладающая бактерицидными свойствами, применяют ее для консервации соков и овощей.

Свежие плоды и сок рябины применяют при дизентерии (по 100 гр плодов принимать 3 раза в день за 20—30 минут до еды).

Рябиновый сок из отжатых ягод принимать по 1/4 стакана 2—3 раза в день за 30 минут до еды.

РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ

В последние годы все большую популярность приобретает черноплодная рябина. И это справедливо. В ней содержатся витамины С, В₁, Е, Р, РР, каротин, сахара (до 8 проц.), органические кислоты, марганец, медь, бор, йод, магний, железо.

Черноплодная рябина эффективна при гипертонии и атеросклерозе. В клинике Омского медицинского института 70 больных гипертонией лечили соком черноплодной рябины. Сок назначался по 50 мл 3 раза в день в течение 1—1,5 мес. У большинства больных (75 проц.) полностью прекратились головные боли, улучшился сон, артериальное давление крови снизилось до нормы.

Полезна черноплодная рябина и при гастрите с пониженной кислотностью, капилляротоксикозе, токсикозах беременных.

Фитонциды черноплодной рябины задерживают развитие золотистого стафилококка, дизентерийной палочки.

СЛИВА

Заслуживает внимания как лекарственное растение. Слива — природный гибрид алычи и терна. В ней содержится до 16 проц. сахаров, пектины, калий, витамины С, В₁, РР, каротин, органические кислоты. Слива (особенно сушеная — чернослив) обладает выраженным послабляющим и мочегонным эффектом, оказывает целебное действие при атеросклерозе, колечистите, болезнях печени, сердца, почек, при гипертонии.

ТЫКВА

Одно из лучших мочегонных пищевых растений — тыква. В ней содержатся соли калия, кальция, магния, железа, а также сахар, витамины С, В₁, В₂, РР, каротин, белок, клетчатка. Из тыквы выделено вещество, подавляющее рост туберкулезной палочки. Семена тыквы — популярное противоглистное средство. Тыква особенно полезна при болезнях сердца, почек, ожирении, гипертонии, запорах, при колечистите.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Чрезвычайно полезна, занимает после шиповника второе место по содержанию витамина С (до 300 мг %). В ней также содержатся витамины В₁, РР, каротин, калий, железо, лимонная, яблочная и другие органические кислоты, пектины, дубильные вещества, сахара (до 16 %).

Черная смородина оказывает лечебное действие при язве желудка, гастрите с пониженной кислотностью, атеросклерозе, болезнях почек, нарушении обмена веществ, малокровии.

Фитонциды черной смородины активны по отношению к золотистому стафилококку, микроскопическим грибам, возбудителям дизентерии, дифтерии. Водный настой черной смородины в 10 раз повышает противомикробную активность тетрациклина, пенициллина, биомicina, других антибиотиков. Сох черной смородины уничтожает вирусы гриппа А₂ и В.

Черная смородина заметно повышает иммунитет. В эксперименте черная смородина в 5 раз увеличила количество выживших животных, зараженных смертельной дозой стафилококков.

ЧЕРНИКА

По содержанию марганца превосходит все другие ягоды, фрукты и овощи. В чернике также найдены витамины С, В₁, В₂, каротин, дубильные вещества, пектины, сахара (5—6 проц.), яблочная, хинная, янтарная и молочные кислоты.

Черника широко используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности при гастрите с пониженной кислотностью, кишечных инфекциях, при гепатите, а также при малокровии, камнях почек, подагре, ревматизме, кожных болезнях. Так как черника улучшает зрение, она рекомендуется для людей, профессия которых требует хорошего зрения.

Черника снижает концентрацию сахара в крови и потому полезна при диабете. Длительный прием свежих ягод черники помогает при запорах.

Фитонциды черники губительно действуют на дизентерийную палочку, стафилококки, возбудителей дифтерии, брюшного тифа.

ЯБЛОКИ

Самым распространенным среди плодовых растений в нашей стране является яблоня. Она известна человечеству с древнейших времен. Яблоню знали в Египте, Палестине, Греции, Риме. На Руси первые яблоневые сады были заложены в Киеве на территории Киево-Печерской лавры при Ярославе Мудром.

В яблоках содержатся витамины С, В₁, В₂, Р, Е, каротин, в них много калия, железа, марганца, кальция, пектинов, сахаров, органических кислот.

Прекрасное средство против склероза. Эффективны при кишечных инфекциях, болезнях сердца, почек, гипертонии, при ожирении, малокровии, подагре, камнях в почках. В последнем случае рекомендуется пить напиток, приготовленный из сушеной кожуры яблок (1 столовая ложка порошка из кожуры на стакан кипятка). Кислые сорта яблок рекомендуются при диабете.

Фитонциды яблок активны по отношению к возбудителям дизентерии, золотистого стафилококка, протей, вирусов гриппа А. Антимикробная активность фитонцидов увеличивается от периферии плода к центру.

Врачи рекомендуют употреблять яблоки в период после перенесения инфаркта.

ЯБЛОЧНЫЙ СОК

Хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему, полезен людям умственного труда. Довольно много в соке хвощеворных элементов. При ожирении делают смеси соков: яблочный сок — 100 мл, дынный — 50 мл, томатный — 5 мл, лимонный — 25 мл. Принимают также при авитаминозе и малокровии.

При атеросклерозе, гипертонической болезни, ожирении, заболеваниях желчного пузыря принимать по 0,5 стакана за 15—30 минут до еды. Кислые сорта (например, антоновка) принимают при заболеваниях желудка с пониженной кислотностью и запорах.

НЕКОТОРЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ И ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ*

Известно много растений, которые обладают высокими пищевыми и лекарственными свойствами, но в культуру не введены. Возможности использовать флору далеко еще не исчерпаны. Например, только в Сибири нас-

* Воробьев Р. И. Питание и здоровье. Москва, 1990.

читывается около 250 видов съедобных растений, не считая грибов и водорослей. Это огромный источник пищевых и оздоровительных ресурсов.

Приведем сведения о некоторых дикорастущих съедобных растениях, обладающих и лечебными свойствами.

АИР

Содержит аскорбиновую кислоту, камедь, крахмал, эфирное масло (камфору), дубильные вещества. Усиливает секрецию соляной (хлористоводородной) кислоты в желудке, снижает артериальное давление (если оно повышено), оказывает успокаивающее действие, служит хорошим отхаркивающим средством.

Аир полезен при гастрите с пониженной кислотностью, при болезнях легких, недостаточности яичников, патологическом климаксе и при снижении половой потенции.

Аир используется как ароматическая добавка при выпечке хлеба, а также при изготовлении фруктовых вод.

БОЯРЫШНИК

В съедобных плодах содержатся флавоноиды, органические кислоты, в том числе аскорбиновая, каротин, пектины, фруктоза, крахмал, сапонины.

Из боярышника получают ценное сердечное средство, улучшающее работу мышцы сердца. Боярышник полезен при атеросклерозе, гипертонии, аритмии сердца, сердечной слабости.

В пищу употребляют плоды боярышника. Из сушеных плодов, перемолотых в муку, размешанных с медом, получают полезную и вкусную начинку для пирогов. Ягоды и листья можно использовать для заварки вместо чая.

ЕЖЕВИКА

В плодах обнаружены глюкоза, фруктоза, витамин С, каротин, органические кислоты, токоферолы.

Ягоды ежевики и разных стран, например, в Польше, используются при воспалении суставов, болезнях почек и мочевого пузыря, при диабете, колитах. Ежевика оказывает общеукрепляющее действие на организм.

Из плодов ежевики готовят варенье, сироп, кисель, морс, начинку для пирогов. Листья можно заваривать вместо чая, этот напиток полезен при болезнях желудка и печени.

КАЛИНА

В плодах содержатся сахара, витамин С, пектины, органические кислоты, в том числе валериановая и изовалериановая, оказывающие выраженное успокаивающее действие на центральную нервную систему. Плоды калины оказывают мочегонное и потогонное действие, усиливают сокращение сердца, помогают при болезнях желудка.

Плоды калины имеют горьковатый вкус и могут вызывать рвоту, поэтому их надо срывать после заморозков, тогда горечь исчезает. Из них варят кисели, компоты, варенье.

КЛЕВЕР

Цветки содержат глюкозиды, витамины С, группы В, квертин. Цветки обладают отхаркивающим и мочегонным свойствами. Рекомендуются при болезнях легких, почек, в также при малокровии. Имеются наблюдения о противораковом действии клевера.

В пищу могут быть использованы высушенные измельченные цветки клевера, например, для заправки первых блюд. Из свежих листьев и стеблей готовят салаты.

КРАПИВА

Растение содержит витамины С, К, В₂, каротин, пантотеновую кислоту, хлорофилл, соли железа, калия, кальция, серу, сахара, белки.

Крапива повышает свертываемость крови, увеличивает количество гемоглобина, тромбоцитов и эритроцитов, снижает концентрацию сахара в крови, оказывает мочегонное, ранозаживляющее и общеукрепляющее действие. Она полезна при кровотечениях, анемии, атеросклерозе, болезнях почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря, при геморрое, туберкулезе, при нарушении обмена веществ, в период выздоровления.

Крапива — ценный пищевой продукт. Из молодых побегов и листьев варят вкусные и питательные щи, из листьев приготавливают салаты. Кроме того, листья и побеги крапивы можно засаливать и использовать как это делают, например, на Кавказе, в виде приправы к мясным блюдам.

ЛОПУХ (РЕПЕЙ)

В корнях имеются полисахарид, инсулин, превращающийся в фруктозу в кислой среде, белки, эфирное масло, слизь, дубильные вещества, витамин С.

Лопух оказывает мочегонное и потогонное действие. Экстракт из корней нормализует состав крови, снижает в ней концентрацию сахара, алкалоиды лопуха угнетают рост злокачественных опухолей.

В пищу идут корни растения, которые обладают лечебными свойствами при подагре, ревматизме, холецистите, болезнях желудка.

Корни лопуха тушат с маслом, жарят, пекут, используют для приготовления первых блюд. Из молодых готовят салаты.

МЕДУНИЦА

В траве медуницы обнаружены марганец, соли калия, железа, кальция, витамин С, рутин, каротин.

Медуница обладает противовоспалительными, мочегонными, ранозаживляющими свойствами, стимулирует кроветворение, активизирует действие витаминов В₁, регулирует деятельность желез внутренней секреции.

Используется медуница при заболеваниях легких, почек, крови и как ранозаживляющее средство.

Из медуницы готовят первые блюда, салаты.

ОДУВАНЧИК

Съедобные листья одуванчика содержат каротин, витамины С, В₂, холин, никотиновую кислоту, кальций, калий, марганец, железо, фосфор.

Одуванчик помогает при хронических заболеваниях печени, камнях в желчном пузыре и в почках, при атеросклерозе и при воспалительных заболеваниях почек.

Из листьев одуванчика готовят салаты (собирают до появления стебля, в мае), предварительно залив их соленой водой для уничтожения горечи. Из отварных листьев можно приготовить пюре.

К сожалению, одуванчику присуще неприятное свойство — поглощать из выхлопных газов свинец, что делает непригодным для питания растения, собранные вдоль шоссе с интенсивным автомобильным движением.

ПАСТУШЬЯ СУМКА

В растении имеются витамины С, К, холин, калийорганические кислоты.

Пастушья сумка помогает при кровотечениях, болезнях печени, почек, при нарушении обмена веществ, вялой перистальтике кишечника и при патологическом климаксе.

В пищу можно употреблять листья пастушьей сумки. Знатоки утверждают, что особенно нежным вкусом обладают молодые побеги растения. Из них можно готовить салаты, варить щи, жарить с мясом. Листья можно заготавливать впрок — их солят, сушат.

СОСНА (обыкновенная)

Хвоя содержит витамины С, К, В₁, В₂, Р, каротин, дубильные вещества, органические кислоты, крахмал. Почки сосны оказывают мочегонное и отхаркивающее действие.

Л Е Ч Е Н И Е
ПРОДУКТАМИ ПЧЕЛОВОДСТВА

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

Человек в последние годы больше и больше обращается к природе и ее полезным явлениям, как например, лечебным травам, разным полезным естественным продуктам, в том числе и продуктам пчеловодства: мед, прополис, маточное молочко, пыльца и т. д.

Прополис

Еще с глубокой древности прополис известен, как лечебное средство. Сильный лечебный эффект прополиса появляется с каждым годом. Он обладает хорошим антисептическим, регенерирующим, противобактерийным свойством. Поэтому медицина использует следующие биологические и фармакологические действия прополиса: бактерицидное, бактериостатическое, антивирусное, фунгицидное, фунгистатическое, антифлогистическое, прогитоксическое, дерматопластическое, местно анестезирующее. А народная медицина широко пользуется этим чудотворным продуктом пчеловодства.

Мед

Этот продукт пчеловодства с богатым содержанием глюкоидов, которые делаются с химической точки зрения на глюкозы, глюкозиды, озаны.

Состав меда: Левулеза — 36 проц., глюкоза — 32 проц., сахароза — 2 проц., мальтоза — 8 проц., вода — 20 проц., минеральные соли — 2 проц.

Благодаря богатому содержанию углеводов, мед является очень важным энергетическим продуктом питания. Мед должны употреблять все: взрослые, особенно при большом физическом напряжении сил, спортсмены, дети в период роста и пожилые люди. С точки зрения терапевтической ценность меда объясняется тремя факторами: природой сахаров, наличием пыльцы и маточного молочка в меде, воздействием антибиотика из тела пчелы. Мед как медикамент рекомендуется людям всех возрастов — от грудных детей до престарелых. В последнем случае мед рекомендуется, например, при всех острых заболеваниях (брюшном тифе, заболеваниях дыхательных путей, желтухе), для подслащивания чая. Большие дозы меда рекомендуются для больных сердечной недостаточностью. Известные кардиологи рекомендуют применение медовых растворов в ассоциации с инъекцированием инсулина больным сердечными заболеваниями для стимулирования миокарда. Мед рекомендуется всем людям, у которых с возрастом сердечная мышца стареет и модифицируется в большей или меньшей степени.

Пыльца

Анализ этого продукта показал, что в пыльце 27 элементов: натрий, калий, никель, титан, ванадий, хром, фосфор, циркон, берилл, бор, цинк,

свинец, серебро, мышьяк, олово, галлий, стронций, барий, уран, кремний, алюминий, магний, марганец, молибден, медь, кальций, железо.

Пыльца рекомендуется при физическом истощении, анемии и в период выздоровления больных. Однако, прежде чем начинать курс лечения, необходимо проконсультироваться у врача. Ряд медиков предупреждает, что потребление большого количества пыльцы может вызвать нарушение витаминного равновесия организма. Поэтому после периода курса лечения пыльцой необходим перерыв. Пыльца дает хорошие результаты в случае депрессий и половой способности. Она регулирует кишечные функции в случае хронической диареи и запора.

Количество гемоглобина растет очень быстро и всегда отмечается значительное улучшение общего состояния, и все это из-за ее антианемического и гетополетического воздействия.

Маточное молочко

Высокопитательный продукт с высоким содержанием протеинов и витаминов. Маточное молочко благоприятно действует на костный мозг, вызывает увеличение диаметра эритроцитов одновременно с увеличением числа ретикулоцитов и количества гемоглобина, а также с изменением содержания железа в крови.

В терапевтической практике оптимальная доза маточного молочка составляет 5—10 мг.

Благодаря содержанию протеинов, аминокислот, витаминов, эфиров, углеводов и ацетилхолина, маточное молочко рекомендуется для лечения неврастении, анемий, ревматизма, бронхитов, выпадения волос.

Пчелиный яд

Пчелиный яд (апитоксин) — секрет ядовитых желез пчел. Он выделяется нитевидной железой жалящего аппарата рабочей пчелы. Этим ядом она парализует своих недругов. Апитоксин представляет собой желтоватую густую жидкость кислой реакции. Имеет резкий запах. Ей присущи горькость и жгучесть. Некоторые люди плохо или совсем не переносят ужаления пчел. Прибегают к медицинской помощи.

Химический состав пока изучен не полностью. Яд содержит жироподобные вещества, белки и микроэлементы. Из него изготавливают ряд медицинских препаратов.

ПРОПОЛИС

Прополис — новое лечение чудо пчелиной семьи

Всем известны чудесные оздоровительные свойства пчелиного меда, пыльцы, собираемой пчелами с цветущих растений, пчелиного яда и маточного молочка. А вот о прополисе мало кто знает.

В последние годы прогрессивными учеными-врачами из сокровищницы народной медицины взято на вооружение новое, необычайной эффективности лечебное средство — прополис или пчелиный клей.

На 2-й Ленинградской научной конференции по применению продуктов пчеловодства в медицине и ветеринарии советскими учеными-врачами из Казани, Ленинграда, Одессы, Симферополя и др. городов сделано 20 докладов о чудесных, поразительных по своей лечебной мощи, свойствах прополиса. Там, где никакие самые верные медицинские средства не помогают, препараты вылечивали, давали стойкие облегчения больным.

Прополис обладает высочайшим бактерицидным и антимикробным действием (способность убивать болезнетворные микробы). Если в старину врачи-знахари лечили прополисом только раны и язвы, то в настоящее время врачи, вооруженные знанием, лабораториями и средствами анализа и синтеза, выявили диапазон его лечебных свойств и действий.

Прополисом лечат все нахожные заболевания, простые раны и раны долго незаживающие, язвы нахожные, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологические заболевания воспалительного характера, гемморой, насморк, грипп, невриты, радикулиты, туберкулез легких (за 4—10 месяцев).

И сейчас пчелы, живущие в благоустроенных человеческом рамочных ульях, автоматически, инстинктивно покрывают своим клеем-прополисом стены, дно, потолок улья, заделывают им щели и прочно прикрепляют рамки с сотами к стенкам и потолку улья. А попавших случайно в улей животных закалывают насмерть и, не имея силы вытащить из улья, покрывают их слоем клея, и мертвое животное: мышь, змея и т. п. годами и десятилетиями лежит замурованным в этом чудесном саркофаге без гниения и разложения.

И вот теперь прополис — одно из чудес пчелиной семьи разумом наших прогрессивных врачей прочно входит в практику лечебной медицины, излечивая тяжелейшие недуги человека и облегчая его страдания.

На основании материалов 2-й Ленинградской конференции, а также материалов многих печатных источников, составлена памятка по приготовлению самых простых препаратов прополиса и лечения прополисом. Мазь на вазелине, смальце, базехитовом масле, рыбьем жире, свином сале (для смазывания и втирания).

10 проц. мазь:

1. При ожогах и обмороживаниях.
2. При геморрое.
3. При насморке — введением в ноздри на 15—20 минут ватным тампоном на спичке, смазанным мазью или по 2—4 капли жидкого препарата в каждую ноздрю 4 раза в день.
4. В гинекологии: при воспалительных процессах — кольпингитах, эндоцервитах, при эрозии шейки матки и т. д. Во влагалище вводится тампон с прополисной мазью и плотно прижимается к эрозированной поверхности, тампон удаляется через 10—12 часов. Лечение 10—12 дней.

15 проц. мазь:

1. Для быстрого заживления ран, порезов, в том числе долго незаживающих, гноящихся, при ушибах.

2. В дерматологии: при угрях, сыпях, прыщах, кожных зудях, эрозиях и язвах слизистых оболочек носа, губ, при воспалении век.
 3. При сильных ожогах и обморожениях (после 10 проц. мази).
- 20 проц. мазь:
1. При грибковых заболеваниях.
 2. При экземах.
 3. При фурункулах, карбункулах.
- 30—40 проц. мазь:
1. При роже смазыванием и втиранием (индотетрит).
 2. При радикулитах, ишиасе и поражениях периферической нервной системы (верхних и нижних конечностей) втиранием и прогреванием синей лампой.
 3. При сибирско-язвенном карбункуле.

Прополис — продукция пчеловодства

Прополис (от латинского слова заделывать, заклеивать) или пчелиный клей, клейхос, смолистое с приятным запахом, зеленовато-коричневого цвета вещество, собираемое и вырабатываемое пчелами.

Это не пищевой продукт, пчелы его используют для замазывания щелей в улье, сокращения летка, полировки ячеек и придания им прочности, покрывают им холстики, размещенные поверх рамок, что способствует лучшему сохранению тепла в гнезде, замуровывают вредителей, попавших в улей. Осенью, готовясь к зимовке, пчелы его в большом количестве откладывают.

Происхождение, химический состав прополиса не полностью изучен. Однако многие утверждают, что основную часть прополиса пчелы собирают с клейких древесных почек, выделяющих смолистые вещества, и пыльцевых зерен. Состав пчелиного клея (прополиса) не одинаков, в среднем он содержит: смол и бальзамов около 55 проц., эфирных масел около 10 проц., воска около 30 проц., цветочной пыльцы 5 проц., кроме того в его состав входят ароматические вещества.

Прополис, как отмечалось выше, обладает высоким антимикробным действием, препятствует развитию гнилостных процессов, способствует гибели микробов. Благодаря этим свойствам он издавна имеет широкое применение в медицине при лечении кожных заболеваний, туберкулеза в виде прополисной мази или спиртового раствора. Применяется он и в ветеринарии при лечении сельскохозяйственных животных, кроме того имеет ряд технических применений, особенно в лакокрасочной промышленности для изготовления лаков, которыми покрывают поверхность струнных музыкальных инструментов и деревянной посуды (чашки, миски, ложки), находит применение и при изготовлении пластмасс, в частности, грампластинках.

Заготавливают прополис в основном соскабливая стамеской с верхних и боковых брусьев рамок, потолочин, а также холстиков. Сбирать следует при осмотре улья, так как к нему прилипает большое количество различ-

ного мусора, что является благоприятной средой для внутриульевых паразитов. При сборе прополиса воск обязательно отделяется. Хранить прополис рекомендуется в темном, прохладном помещении, следует учесть при этом, что при хранении его происходит некоторое изменение его химического состава, однако значительного уменьшения антимикробных свойств не наблюдается.

При понижении температуры (ниже нуля) прополис становится чрезвычайно хрупким, затвердевает, как канифоль. Температура плавления 65 град., полностью растворяется в эфире и слабо в спирте.

Приготовление мазей

Вазелин или вазелин с лимоном, ланолин, рыбий жир, сливочное масло и т. п. доводится до кипения в эмалированной посуде, снимается с огня и добавляется мелко нарезанный прополис. Смесь непрерывно размешивается в течение 30 минут при температуре 80 град. и в горячем виде фильтруется через один слой марли и разливается по банкам. Мазь сохраняется долгие годы.

Прополис на сливочном масле 10 проц. концентрации

1. При язвах желудка и двенадцатиперстной кишки за 1—1,5 часа до еды, по 10—15 г (чайная ложка). При лечении строгая диета и вся пища — перетертая для избежания травмирования язвы — лечение 3—4 недели.

Можно также принимать прополисный экстракт внутрь, по 20 капель в воде, молоке или 0,5 проц. растворе новокаина за 1—1,5 часа до еды 2—3 раза в день.

2. При легочных болезнях, при туберкулезе легких и тонзиллитах 2 — 3 раза в день по 10 — 15 грамм прополисного масла за 1 — 1,5 часа до еды. Лечение при туберкулезе от 4 до 10 месяцев, по мере лечения концентрацию увеличить с 10 до 15 проц.

Приготовление прополисного масла

1 кг сливочного масла довести до кипения в эмалированной посуде, снять с огня, положить мелко изрезанный прополис 100 или 150 грамм в зависимости от концентрации и перемешивать (экстрагировать) в течение 20—30 минут при температуре 80°.

Применение экстракта прополиса

Экстракт: 20 грамм измельченного прополиса на 100 мл 70 проц. спирта ректификата дают настояться в течение 3 суток при комнатной температуре, периодически встряхивая бутылку со смесью, через 3 суток экстракт прополиса фильтруют через один слой марли.

Экстракт прополиса принимается при туберкулезе (вместо прополисного масла), при тонзиллитах, при воспалении среднего уха (закапывают 3 раза в день по 3 капли). При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки принимают внутрь по 20 капель в теплой воде, молоке или 1,5 проц. растворе новокаина, за 1 — 1,5 часа после еды 2 — 3 раза в день.

Из натурального прополиса

1. Для ликвидации мозолей: лепешки из прополиса (чистого), величиной с горох, накладывают на мозоль, забинтовывают. Через 3 суток снимают вместе с мазью и мозоль срезают.

2. При гриппе и ангине, как при заболеваниях, так и профилактически, кусочек прополиса величиной с 1—2 горошины надо держать во рту, изредка перебрасывая языком с одной стороны на другую, на ночь заложить за щеку. Держать сутки.

3. При зубной боли: держать кусочек прополиса величиной с 1 — 2 горошины у корня больного зуба.

Препараты прополиса убивают возбудителя туберкулеза, дифтерии, сифилиса, патогенных грибов, стрептококков, стафилококков, лептоспироза и др.

Эфирное масло прополиса по силе анестезирующего действия превосходит действие кокаина в 5,5 раза, новокаина в 52 раза.

Фармакопейный комитет Минздрава СССР узаконил применение прополиса в стоматологии в виде 2—4 проц. раствора местного значения. Спиртовой раствор прополиса применяется для обезболивания при появлении чувствительности деснина, при обнажении шейки зубов, втиранием препарата ватным тампоном в течение нескольких минут.

В комплексной терапии пародонтоза, при удалении зубного камня, кюретажа десневых карманов. Обезболивающее действие продолжается 10—15 минут. Осложнений не бывает. Доцент Каримов пишет: "Прополис, или пчелиный клей, широко используется в медицине и является совершенно безвредным для организма человека. При применении большими прополисного масла внутрь отмечается наступление хорошего самочувствия, доброе настроение, прекрасный сон, хороший аппетит".

Применение прополиса при лечении некоторых болезней

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ БРОНХИТАМИ, РИНИТАМИ И ТРАХЕИТАМИ

Способ ингаляции прополиса, которым можно воспользоваться в домашних условиях, состоит в следующем: 60 г прополиса и 40 г воска необходимо поместить в алюминиевую чашку емкостью 300 мл и поставить ее в другую посуду большего размера с кипящей водой. Прополис и воск в этих условиях растворятся, фитонциды прополиса вместе с парами воды будут возгоняться.

Ингаляции прополисом рекомендуются проводить утром и вечером по 10—15 минут.

ПРОПОЛИС В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА И ШЕЙКИ МАТКИ

При лечении воспалений влагалища и шейки матки, вызванных трихомонадами, патогенными грибами или смешанными бактериальными инфекци-

ями, используется 3-проц. раствор прополиса в 96-проц. этиловом спирте. Бактерицидное действие фракции этилового спирта — 3 мг/мл питательной среды; испытано на "стафилококкус пиогенес".

Лечение продолжается 7—10 дней, препарат применяется 1 раз в день.

ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Воспаление слизистой оболочки полости рта — очень распространенное заболевание, требующее продолжительного лечения. Хороший результат показал новый препарат, приготовленный на основе прополиса.

Способ приготовления препарата:

50 г хорошо очищенного и измельченного прополиса заливают 60 мл 70-процентного этилового спирта и 20 мл эфира. Эту смесь оставляют на несколько дней в сосуде из темного стекла, с плотно закрывающейся пробкой, периодически взбалтывая. После растворения смесь фильтруют через марлю, и полученный фильтрат используют как основной препарат для лечения. Его можно использовать без дополнительной обработки, но если хотят устранить твердые вещества, фильтрат нужно оставить еще на несколько дней. Затем надосадочная жидкость отстаивается и используется для приготовления следующего препарата:

Фильтрат прополиса	50 г
Ровомицин или рондомицин	
Мед с 2% маточного молочка	5 г
Рыбий жир	2 г

Полученная смесь тщательно перемешивается до полного растворения и разливается в сосуды из темного стекла. До применения препарата слизистую оболочку следует подсушить. Образовавшаяся желтая пленка устойчива в течение суток, постепенно слюна ее растворяет.

Способ применения:

больное место тщательно очищается перекисью водорода и подсушивается струей теплого воздуха, затем пипеткой на него наносят несколько хапсель раствора препарата до образования однородной пленки. После этого больное место вновь подсушивается слабой струей воздуха; при этом спирт и эфир испаряются. Образуется пленка, играющая роль защитной "повязки", устойчивой в течение суток. Эту процедуру повторяют ежедневно в течение 3—5 дней до полного излечения.

АНГИНА

Самое эффективное средство при ангине любой стадии — прополис (на ночь — за щеку). Быстро помогает только прополис высокого качества, он должен вызывать во рту жжение и небольшое онемение языка. Во всех же остальных случаях выдаваемая за прополис воцнина, обладающая сильным цветочным запахом, бесполезна. Для лечения ангины надо медленно жевать после еды кусочки прополиса величиной с ноготь. За день необходимо съесть около 5 г. При хорошем прополисе ангина проходит за 2 дня без осложнений, столь присущих этой болезни.

Полоскание водным или спиртовым раствором прополиса.

Для приготовления спиртового раствора прополиса (его всегда необходимо иметь в домашней аптечке) нужно размельчить 10 г хорошего прополиса и смешать его со 100 мл спирта, настоять в темноте (обязательно при комнатной температуре, так как прополис теряет свои свойства при охлаждении) в течение недели. Если нужно срочно приготовить раствор, то очень мелко измельченный прополис необходимо смешать со спиртом (1:10), поместить на водяную баню и нагреть до 40 град., не выше. Затем несколько часов периодически встряхивать бутылочку со смесью. Хранить раствор прополиса в темной бутылке. Для получения водного раствора для полоскания спиртовой раствор нужно смешать с теплой водой: 10 мл спиртовой смеси на 100 мл воды. Для маленького ребенка количество спиртового раствора нужно уменьшить до 5 мл. С прополисной спиртовой настойкой полезно пить во время болезни чай с медом (несколько капель).

ГАЙМОРИТ

Вскипятить воду в кастрюле, влить туда 0,5 чайной ложки 30 проц. настойки прополиса. Укутаться и подышать над этой кастрюлей.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ КОЛИТОМ

При лечении острого и хронического колита применяется 20 проц. раствор прополиса на 70-процентном этиловом спирту.

Пациент принимает по 40 капель спиртового раствора прополиса на стакан теплой воды или сырого молока, за 1 час до еды, три раза в день. Необходимо соблюдать диету. Продолжительность курса 20—30 дней.

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ВОСПАЛЕНИЙ СРЕДНЕГО УХА ПРОПОЛИСОМ

Хронические гнойные заболевания среднего уха опасны своими осложнениями, так как ведут к потере слуха.

Для лечения хронических заболеваний и острых воспалений среднего уха применяется 30-проц. спиртовой раствор прополиса на 70-проц. спирте.

Больные с мезотимпанитами, тщательно очистив ухо от гноя, вводят в слуховой проход смоченные в растворе прополиса марлевые трубочки, плотно прижимая их к барабанной перепонке. На следующий день процедуру повторить. Средняя продолжительность лечения 10—15 дней. (В зависимости от тяжести процесса). Считается процесс затихшим, если в полости уха становится сухо и нет выделений через месяц после прекращения лечения.

ЛЕЧЕНИЕ ТУГОУХОСТИ ПРОПОЛИСОМ

Для лечения тугоухости применяется 30—40-проц. спиртовая настойка прополиса в смеси с жидким растительным маслом (предпочтительно оливковым или кукурузным) в концентрации 1:4. При взбалтывании смеси об-

разуется однородная жидкость — масляно-спиртовая эмульсия прополиса. Перед употреблением жидкость нужно взбалтывать. Лечение проводится путем введения в слуховой проход мврлевых трубочек, пропитанных эмульсией.

Детям после 5 лет — ежедневно на ночь на 10—12 часов (10—14 процедур), взрослым — через день на 36—38 часов (10—12 процедур).

ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ

Прополис оказывает хороший терапевтический эффект при хроническом простатите и устраняет его симптомы, антибактериальным действием, в также выраженным анестезирующим, противовоспалительным, рассасывающим и регенеративным свойством.

Для лечения используется суппозитории из экстракта прополиса, полученного путем выпаривания (40 г прополиса в 200 мл 96-проц. спирта).

Суппозитории содержат: экстракт прополиса 0,1 г, масло-какао 2 г. Из этой смеси изготовить свечи. Их вводят в прямую кишку 1 раз в сутки в вечернее время.

Лечение состоит из 2—3 30-дневных курсов с 1—2 месячными интервалами между ними.

ХРОНИЧЕСКИЕ ФАРИНГИТЫ

Хронические воспалительные заболевания слизистой оболочки глотки весьма распространены. Больные, страдающие хроническим фарингитом, часто жалуются на сухость в горле, першение, ощущение инородного тела в глотке, сухой кашель, скопление вязкой слизи с одновременной сухостью.

Прополис активно воздействует на течение биологических процессов в тканях организма, обладает антимикробным, противовоспалительным и местноанестезирующим свойством. Он активизирует процессы восстановления.

Берут экстракт прополиса с расчетом одну часть экстракта на две части глицерина или персикового масла и хорошо смешивают.

При хроническом фарингите слизистую оболочку носо-ротоглотки, предварительно освобожденную от слизи и корок, смазывают полученной смесью в течение 10—15 дней один раз в день. На одну аппликацию расходуется 2—2,5 мг препарата.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПОЛИСА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Прополис применяется при язве желудка в двенадцатиперстной кишке.

Рекомендуется принимать прополис в двух лекарственных формах — в виде спиртового раствора и прополисного масла.

Спиртовой раствор применяется 10-проц. на 70-проц. спирте.

Для приготовления прополисного масла 10 г очищенного измельченного прополиса смешивают со 100 г разогретого на водяной бане несоленого сливочного масла. Экстрагирование прополиса проводят путем подогревания смеси на водяной бане в течение 5—10 минут, после чего ее фильтру-

ют в горячем состоянии через один слой марли, постоянно помешивая. При экстрагировании прополиса не рекомендуется доводить смесь до кипения.

Спиртовой прополисный раствор следует принимать внутрь по 15—20 капель на воде, кипяченом молоке или 0,5-проц. новокаине, три раза в день за 1—1,5 часа до еды, в течение 18—20 дней. При необходимости курс повторяют через одну-две недели.

Нужно строго соблюдать дозировку: большие дозы могут вызвать уменьшение аппетита, снижение общего тонуса, вялость, увеличение лейкоцитов в крови.

Прополисное масло принимают внутрь по одной чайной ложке на подогретом молоке, три раза в день за 1—1,5 часа до еды. Длительность курса лечения та же. Использование прополисного масла противопоказано при заболеваниях печени.

ДОМАШНИЙ СПОСОБ ИНГАЛЯЦИИ ПРОПОЛИСОМ

Для ингаляции кладут 60 г прополиса и 40 г воска в эмалированную миску емкостью 200—300 мл и ставят ее на кастрюлю с водой. Доводят воду до кипения. Как только поднимется пар из миски, проводят ингаляцию по 10—15 мин. в течение 10—15 дней 2 раза в день утром и вечером.




Рис. 1 — Домашний способ ингаляции прополисом.

Хороший результат данный метод дает при лечении бронхита, туберкулеза, ангины, насморка, гриппа, фарингита.

ЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛИНЫМ МЕДОМ

БЕССОННИЦА, НЕВРАСТЕНИЯ

Стакан теплой воды на 1 ст. ложку меда на ночь. Действует успокаивающе, вызывает крепкий сон, действует регулирующим образом на кишечник. При этом следует отметить, что нет более безвредного снотворного, чем мед.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка сока свеклы, 1 ст. ложка сока моркови, 1 стакан сока хрена (натертый хрен предварительно настаивают в воде в течение 36 часов), сок 1 лимона. Все смешать, принимать по 1 ст. ложке 2 раза в день за 1 час до еды.

Курс лечения 1,5 месяца.

Из народной медицины до нас дошли рецепты смесей с медом, принимаемых с целью понижения артериального давления при гипертонической болезни. Первый рецепт: смешать по одному стакану морковного сока, сока хрена и меда с соком одного лимона. Хранить в стеклянной банке с плотной крышкой в прохладном месте. Принимать по 1—2 чайных ложки 3 раза в сутки за час до еды или через 2—3 ч после приема пищи. Второй рецепт: к содержимому первого рецепта добавить стакан сока из столовой свеклы. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день в те же сроки по отношению к еде. Длительность лечения 1,5—2 месяца.

ГРИПП

1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка шиповника, 1 ст. ложка смородины, 1 ст. ложка малины, залить кипятком 100 мл. Выдержать 15 минут.

Пить 3 раза в день по 0,5 стакана перед едой.

Хорошим средством из народной медицины при гриппе с явлениями вазомоторного ринита является смесь натертого чеснока с натуральным медом в соотношении 1:1 (принимают на ночь столовую ложку смеси внутрь, запивая кипяченой водой).

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку сушенцы болотной залить 250 мл кипятка, отстоять 30 минут.

Пить по 2 ст. ложки 3 раза в день. С низкой кислотностью принимать за 2 часа до еды.

КОЛИТ

Ален Кайяс (1968) предлагает следующий рецепт: 180 г меда, 50 г цветочной пыльцы и 800 мл воды. Мед растворяют в холодной воде и при постоянном помешивании прибавляют цветочную пыльцу. Смесь на несколько дней оставляют при комнатной температуре до появления призна-

ков ферментации. Принимают по 1/2—2/3 стакана перед едой. Курс лечения 1—1,5 месяца. Можно употреблять пергу в чистом виде, по одной чайной ложке 3 раза в день. Побочные эффекты отсутствуют.

Рекомендуется для лечения колита мед. Принимают по 80—100 г в сутки, растворенным в яблочном соке или в холодной воде, 3 раза в день до приема пищи. Помимо лечебного действия способствует устранению запоров.

ВОСПАЛЕНИЕ МИНДАЛИН

Полоскание рта и горла раствором воды с медом снимает воспаление миндалин, кроме того, очищает зубы, делая их белыми. 1 ст. ложка меда на стакан теплой воды.

НЕВРОЗ СЕРДЦА, НЕВРАСТЕНИЯ, ИСТЕРИЯ

При неврозе сердца, неврастении, истерии наряду с известными медикаментозными средствами очень широко применяется натуральный мед. При неврастении С. Младенов (1976) рекомендует принимать цветочный мед по 100—120 г в сутки в течение 1—2 мес.— утром и вечером по 30 г, после обеда 40—60 г. Перед сном, за полчаса, мед необходимо разбавить в стакане воды комнатной температуры. Спустя 1—2 недели после начала лечения у больных наступает хороший крепкий сон, чувство бодрости, повышается работоспособность.

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ДЕТЕЙ

В 0,5 стакане кипяченой теплой воды растворить 1 чайную ложку меда. Пить 2 раза в день по 0,5 стакана перед едой.

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА

1 чайная ложка меда, один взбитый белок яйца, 2 ст. ложки муки. Полученное тесто накладывается на очищенную кожу лица на 10 минут. Смывается водой.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ

1 кг меда смешать с 1 кг черной смородины. Принимать по 1 чайной ложке за 30 минут до еды. Продолжать до окончания смеси.

С лечебной и профилактической целью при заболеваниях печени мед рекомендуют применять утром (30—50 г) с добавлением маточного молочка (одна ложечка для горчицы), а после обеда — столовую ложку меда с одной чайной ложкой перги (Ю. В. Стамболину, 1974). Эффективно действует смесь из одной ложки меда с яблочным соком, принимать утром и вечером (М. И. Шмидт, 1968).

РАДИКУЛИТ, РЕВМАТИЗМ

Вырезать из корня плода редьки полость, заполнить ее медом. Через 4 часа сок готов. Растереть заболевший орган.

РОЖА

Лоскут натурального шелка красного цвета, величиной с ладонь, растереть на мелкие кусочки. Смешать с натуральным пчелиным медом,

разделить эту смесь на 3 части. Утром за час до восхода солнца наложить эту смесь на пораженное рожей место и перевязать. На следующее утро процедуру снова повторить. Делать так ежедневно до выздоровления.

СКЛЕРОЗ

Натереть на мелкой терке лук репчатый, отжать. Стакан лукового сока смешать со стаканом меда. Хорошо размешать. Если мед засахарился, слегка подогреть в водяной бане. Принимать по столовой ложке 3 раза в день за час до еды или через 2—3 часа после еды.

Применяется при атеросклерозе, особенно при склерозе мозга.

СТОМАТИТЫ, АНГИНА, КОЛИТЫ

1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка ромашки, залить 250 мл кипятка.

Принимать в качестве полоскания и клизма при колитах.

ТУБЕРКУЛЕЗ

а) Мед пчелиный липовый 100 г, сало свиное нутряное — 100 г, маело сливочное несоленое 100 г, алоэ, сок (или агавы) 150 г, какао в порошке 50 г.

Алоэ перед срезанием не поливать 2 недели. Растопить в эмалированной кастрюле свиное сало, масло, мед. Когда все расплавится (кипеть не давать), кастрюлю снять и добавить туда остальные компоненты. Хорошо размешать. Хранить в стеклянной банке в холодильнике. Принимать по столовой ложке состава, растворив в стакане горячего молока. Пить утром и вечером. Принимать длительное время.

Применяется при туберкулезе легких и упорном бронхите.

б) Мед липовый 1200 г, лист алоэ мелко порезанный 1 стакан, оливковое масло — 100 г, березовые почки — 25 г, липовый цвет — 10 г, вода — 2 стакана.

Мед растопить в эмалированной кастрюле, не давая кипеть. Добавить к меду алоэ и дать покипеть 5—10 минут, процедить, отжать. Когда мед остынет, вылить в него настой почек и липы. Хорошо размешать. Смесь разлить в темные бутылки, добавить в каждую бутылку поровну оливкового масла. Перед употреблением взбалтывать. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день.

Применяется при туберкулезе и болезнях легких.

Некоторые полезные рецепты с медом

Необходимо отметить, что эффект меда усиливается при сочетании его с настоями и отварами мать-и-мачехи, плодов малины, цветков липы, ромашки, эвкалипта и других лечебных растений.

Ниже следуют настои и отвары и их применение*.

* Синяков А. Ф. "Стимуляторы жизни". Москва, 1990.

НАСТОЙ ЦВЕТКОВ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ С МЕДОМ

Возьмите 10 г цветков липы (3 ст. ложки) и залейте 200 мл кипятка в эмалированной кастрюле, закройте крышкой и поставьте на 15 мин. в кипящую водяную баню, затем дайте настою остыть и процедите его. Оставшееся сырье отожмите. Объем настоя доведите кипяченой водой до 200 мл и растворите в нем 1 ст. ложку меда.

Принимать в теплом виде по 1/2—1 стакану 2—3 раза в день как потогонное и жаропонижающее средство при простудных заболеваниях.

ОТВАР ЦВЕТКОВ ЛИПЫ И ПЛОДОВ МАЛИНЫ С МЕДОМ

Возьмите по 1 ст. ложке цветков липы и плодов малины, залейте их 2 стаканами кипяченой воды, кипятите 5 мин., дайте настояться, процедите и растворите в отваре 2 ст. ложки меда. Принимать его теплым по полстакана 3—4 раза в день как жаропонижающее и противовоспалительное средство при простуде и гриппе.

ОТВАР ЛИСТЬЕВ ЭВКАЛИПТА С МЕДОМ

Возьмите 0,5 л отвара листьев эвкалипта, приготовленного в пропорции 1:10 и растворите в нем 2 ст. ложки меда. Полученный раствор используют для орошения ран, примочек и ванночек.

НАСТОЙ МАТЬ-И-МАЧЕХИ С МЕДОМ

Возьмите 5 г листьев мать-и-мачехи (1 ст. ложка), залейте стаканом кипящей воды в эмалированной кастрюле, закройте крышкой и поставьте на 15 мин. в кипящую водяную баню, затем дайте настою остыть и процедите его. Оставшееся сырье отожмите. Объем настоя доведите кипяченой водой до 200 мл и растворите в нем 1 ст. ложку меда.

Принимать его по 1/3 стакана 2—3 раза в день как смягчающее, отхаркивающее, противовоспалительное, противомикробное и потогонное средство при заболеваниях дыхательных путей: ларингитах, трахеитах, острого и хронического бронхитах, бронхоэктазах, воспалениях легких.

НАСТОЙ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ С МЕДОМ

Приготовьте настой цветков ромашки аптечной 1:10, для чего возьмите 25 г (6 ст. ложек) сухих цветков, залейте их в эмалированной посуде 500 мл кипяченой воды, закройте крышкой и поставьте на 15 мин. в кипящую водяную баню. Затем дайте настою остынуть, процедите его, а оставшееся сырье отожмите и доведите объем кипяченой водой до 500 мл. Растворите в нем 2 ст. ложки меда и используйте для полосканий: при ангине, стоматите и др. заболеваниях, примочек при язвах и ранах и клизм при колитах. Настой можно принимать внутрь по 1/3—1/2 стакана после еды как противовоспалительное: антисептическое и спазмолитическое средство при спазмах кишечника, метеоризме, поносах.

НАСТОЙ ТРАВЫ СУШЕНИЦЫ БОЛОТНОЙ С МЕДОМ

Приготовьте настой травы сушеницы (готовится так же, как и настой ромашки, соотношение сырья к растворителю 1:10), растворите в нем мед (на 1 стакан настоя 1 ст. ложка меда) и используйте для промывания, орошения и примочек при гнойниках, длительно незаживающих ранах, язвах, ожогах кожи и т. п. Внутрь настой сушеницы с медом принимают по 1/3 стакана 2—3 раза в день после еды как противовоспалительное средство при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ С МЕДОМ

Чаще всего применяется спиртовая настойка из плодов и семян лимонника на 70 проц. спирту по 20—30 капель или порошок из высушенных плодов и семян по 0,5 г за 15—30 мин. до еды 2—3 раза в день. Назначают их как стимулирующее и тонизирующее средство при умственном и физическом утомлении, депрессивных состояниях, сонливости, а также для усиления остроты зрения. Мед же принимают во время еды (например, в виде напитка) по 20—35 г три раза в день.

Применение меда в косметике

Мед применяют в составе масок, для предупреждения морщин и очищения кожи лица и рук. Необходимо применять чистый мед или в сочетании с другими веществами (глицерина, лимонного сока, яичного желтка и др.).

Перед нанесением маски необходимо предварительно очищать кожу лица при помощи умывания или с помощью специальных материалов.

Ниже следуют рекомендации и некоторые рецепты изготовления медовых масок и их применение, предложенные К. А. Кузьминой.

1. К одному сырому желтку добавлять 1 ст. ложку глицерина или меда и перемешать. Полученную массу наносят на кожу лица и оставляют на 10—15 минут. Смывают обычной водой. Такую маску можно применять ежедневно перед утренним туалетом. Маска рекомендуется при сухой коже, предупреждает появление морщин.

2. 100 г меда смешивается с соком 1 лимона. Полученную массу наносят тонким слоем на кожу лица и оставляют на 5—10 мин., затем смывают холодной водой. Рекомендуется при сухой и нормальной коже.

3. 2 столовые ложки муки смешать с взбитым белком 1 яйца и добавить 1 чайную ложку меда. Полученная тестообразная масса накладывается на очищенную кожу лица на 10—15 мин. Смывается обычной водой. Маска рекомендуется для предупреждения морщин при сухой и нормальной коже.

4. Смешать 25 мл спирта и 25 мл воды (по 2 столовых ложки) и добавить 100 г слегка разогретого меда. Все хорошо перемешать до однородной массы. Маску держать на коже лица 10—12 мин. Такая маска очищает кожу лица, оказывает дезинфицирующее действие, смягчает кожу.

5. 90 г ячменной муки, 35 г меда и 1 яичный белок, предварительно взбитый до пены, тщательно перемешать. Маска наносится на 10—15 мин. Рекомендуется для предупреждения морщин при сухой и нормальной коже.

Весьма полезна для кожи лица и "медовая вода" (1 столовая ложка меда на 2 стакана теплой воды). Рекомендуется в течение 5—7 мин. мыть ею лицо на ночь, после чего ополаскивать теплой водой без мыла. "Медовая вода" хорошо питает кожу лица, делает ее бархатистой и в какой-то мере сглаживает морщины.

Мед в смеси с другими веществами хорошо смягчает кожу рук, устраняет сухость и шелушение, делает их нежными и приятными. Вот один из таких наиболее распространенных рецептов:

Глицерина — 3 столовых ложки

Нашатырного спирта — 1 чайная ложка

Буры — на кончике ножа

Мед — 1 чайная ложка

Воды — 0,5 стакана

Все смешать, перед употреблением взбалтывать.

ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В МЕДЕ

Часто наблюдается на рынках, особенно в последнее время, случаи добавления к меду различных примесей и добавок, как, например, сахарного сиропа, крахмальной или свехольной патоки, сахарина, сорбита и др.

Такие примеси к меду, как сахар, крахмал и другие, нетрудно обнаружить. Для этого надо растворить мед в воде. Если мед без примесей, раствор получается слегка мутный, без осадков. При наличии примесей образуется осадок. Если в меде содержится крахмал, прибавление к раствору меда несколько капель настойки йода вызывает синее окрашивание.

Примесь мела можно обнаружить, воздействуя на осадок какой-либо кислотой или уксусом; в этом случае произойдет вспенивание вследствие выделения углекислого газа.

Для обнаруживания в меде хартофельной и сахарной патоки или тростникового и свекловичного сахара необходимо ставить уже более сложные пробы в специальных лабораториях.

ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

Пчелиное маточное молочко — секрет аллотрофических желез рабочих пчел, вырабатываемый для питания личинок, обеспечивающих их быстрый рост и развитие.

Личинка рабочей пчелы питается этим молочком только первые три дня, и ее средняя продолжительность жизни 45 дней. Матка питается молочком на протяжении всей своей жизни, продолжительность которой 4—5 лет.

Для нормального роста и развития организма человека необходимы незаменимые аминокислоты, которые организм не может синтезировать сам и должен получать в готовом виде. Маточное молочко содержит незаменимые кислоты (аргинин, гистидин, валин, метионин, триптофан и др.). Содержит биологически активные вещества (ацетилхолин, холинэстеразу и

др.); витамины B_1 , B_2 , B_3 , B_6 , B_{12} , B_c , С, Н, РР, Е; фолиевую кислоту, никотиновую кислоту, биотин и др.

В частности, биотин необходим для нормального жирового обмена; витамин Е стимулирует половую деятельность. Из микроэлементов, содержащихся в молочке, особый интерес представляет железо, марганец, цинк и кобальт, необходимые для нормального кровотока (способствуют регенерации и выработке красных кровяных телец). Пантотеновая кислота способствует укреплению и росту волос, исцелению ожогов, трофических язв и ран. Маточное молочко обладает бактериостатическим и бактерицидным действием. В нем содержится 40—45 проц. белка, 20 проц. свободных аминокислот, 20 проц. углеводов, 13—15 проц. жиров.

Биологическая роль и физическое действие маточного молочка

Тонизирующее, антимикробное, противорадиационное, иммуногенное, стимулирующее обмен веществ, улучшающее вялость и повышающее жизненный тонус организма, нормализующее артериальное давление, состояние сосудов и функции органов.

Эффективно при неврастениях, астениях, депрессиях, снятии психического и физического перенапряжения, атеросклерозах, при стенокардии, энцефалитах, при ожирении и истощении организма. Его применять показано после хирургических вмешательств, родов с большой кровопотерей и анемии. Препараты пчелиного маточного молока показаны также в комплексе лечения гриппа, для способствования рассасывания при пневмонии.

Употребление

Как профилактическое средство по одной капсуле за 30 минут до еды в течение 10—20 дней до 2—3 капсул в сутки.

Эффективно при повторении курса употребления через 2—3 месяца.

Желательно капсулу с молочком положить под язык утром, когда просыпается, не вставая с постели, принять маточное молочко, лежа на правом боку. Необходимо лежать, чтобы не проглотить ее. В желудке маточное молочко теряет свою активность.

Хранить в сухом, прохладном и затемненном месте при температуре не выше +14 град. С. Срок хранения 2 года.

Примечание: при повышенной чувствительности к пчелиному маточному молочку, консультироваться с лечащим врачом.

Имеется целый ряд клинических наблюдений,* свидетельствующих о хорошем терапевтическом эффекте при лечении больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипотоническая болезнь, стенокардия),

* Мищенко Е. Д., 1960.

маточным молочком. Благоприятный эффект маточного молочка при этих заболеваниях связан с угнетением атеросклеротических изменений в стенке сосудов за счет уменьшения содержания в крови холестерина. Маточное молочко назначалось по 20 мг (под язык) 3 раза в день в течение 10—20 дней.

Хороший лечебный эффект наблюдали,* назначая маточное молочко (10—20 мг 2 раза в день) больным с артритом нижних конечностей.

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА

Коротко о цветочной пыльце. Целебные свойства пыльцы, которую пчелы приносят в ульи, хорошо изучены, но все же, наверно, никогда никто не сможет сказать, что ее тайны полностью раскрыты. Наиболее солидное исследование — книга французского ученого Алена Кайяса "Пыльца", изданная в 1968 г. Можно из этой книги узнать о роли пыльцы в регулировании, балансировании нормального обмена в организме. Многие ее составляющие, например, рутина, влияют на повышение сопротивляемости стенок капилляров, улучшают сердечную деятельность.

Автор пишет, что при употреблении пыльцы любое заболевание в короткий срок ослабевает или исчезает. Он объясняет, что мнение об аллергичности пыльцы является ошибочным: "Аллергию может вызвать пыльца, разносимая ветром, но пчелы, собирая ее, добавляют немного нектара и слюны, которые разрушают аллергены".

В магазинах "Пчеловодство" продается пыльца двух видов — в смеси с медом и в гранулах. Так как пыльца очень гигроскопична, то для нее опасна сырость, разрушающая ее и даже делающая вредной для здоровья. Поэтому, хранить пыльцу, смешанную с медом, очень сложно (это возможно лишь короткое время). Пыльца в гранулах (прибалтийского производства) сохранится лучше и более удобна для потребления. Ален Кайяс подчеркивал, что цветочную пыльцу должны принимать все люди, а не только больные. Однако продукт этот — концентрированный, поэтому достаточно принимать пыльцу в течение месяца несколько раз в год, особенно в начале каждого сезона, по 1 ч. ложке в день, лучше натощак, смешивая ее с медом и запивая теплой или прохладной водой. Пыльцу не рекомендуется принимать на ночь или поздно вечером.

Пыльца обязательно должна быть свежей: через год хранения она теряет 75 процентов своей ценности, а через 2 года становится бесполезной. Хранят ее в холодильнике при температуре 9 град. Пыльца — биологический стимулятор, прекрасно действующий на половые гармоны, как иногда считают.

При приеме пыльцы необходимо снижать количество потребляемой пищи, особенно животных белков. Есть исследования, доказывающие, что 20 г пыльцы соответствуют 1 кг мяса, но это в несчетное число раз более ценный белковый продукт.

* Зайцев Г. Н., Перадин В. Т., 1961.

Известный специалист по пчеловодству Н. П. Йориш сказал: "41 г пыльцы содержит столько суточных доз витамина Р (рутина), что может предохранить несколько человек от кровоизлияния в мозг, сетчатку глаза и сердце".

Цветочная пыльца — это мужской элемент цветка, представляет собой естественный, высококачественный, концентрированный, питательный и биологически активный продукт питания.

Цветочная пыльца содержит все основные вещества, необходимые для построения, развития и существования живого организма: белки, жиры, углеводы, витамины, аминокислоты, глюкозид-рутин, антибиотик, стимулятор роста и др. Цветочная пыльца является пчелным полуфабрикатом, имеет огромное значение в сохранении здоровья человека.

Показания к применению

Цветочная пыльца применяется как концентрированный продукт питания с целью дополнить обычные продукты питания теми веществами, которых в них мало или вообще нет, а организму человека необходимы.

Кроме того, цветочная пыльца применяется в медицине:

- улучшает аппетит,
- улучшает состояние организма при похудении,
- при заболевании кишечного тракта,
- действует как антибиотик,
- улучшает психическое и нервное состояние организма,
- улучшает общее состояние организма,
- возвращает физические силы и стимулирует умственный труд,
- действует благоприятно на рост,
- лечит ослабевших детей,
- при заболеваниях детей,
- при заболеваниях простатитом.

Способ применения и дозы

Дневную дозу лучше принимать за 10—15 мин. до еды утром или перед вторым завтраком (особенно детям, больным или слабым лицам). Можно также принимать и во время еды, но ни в коем случае на ночь или поздно вечером.

Доза взрослым — поддерживающая 20 табл. по 0,5 г в день

— ударная 40 табл. по 0,5 г в день

Доза детям от 3 до 5 лет — 12 табл. по 0,6 г в день

от 6 до 12 — 16 табл. по 0,6 г в день

После 12 лет — нормальный рацион взрослых

Курс приема — ОДИН месяц. Повторять нужно несколько раз в год, особенно в начале каждого сезона. Иногда стоит продолжать весь год (при заболеваниях проститом), делая время от времени перерыв.

От гипертонической болезни рекомендуется применять цветочную пыльцу, Н. П. Йориш (1958) с этой целью назначал больным пыльцу,

смешанную с медом в соотношении 1:1 и 1:2, по одной чайной ложке 3 раза в день и получил хорошие результаты лечения.

Условия хранения

Хранить следует в сухом и чистом помещении при температуре не выше +20 град. и влажности не выше 75 проц. Лучше в холодильнике, в отделении для овощей.

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД

Применение пчелиного яда в лечебных целях в народной медицине многих стран от востока до запада было основано на случайных простых опытах и наблюдениях. Например, было доказано, что люди, занимавшиеся пчеловодством, редко болели подагрой и ревматизмом.

Пчелиный яд опасен (токсичен) как для человека, так и для животных и насекомых, так как он в больших дозах вызывает двигательный паралич.

Несмотря на то, что яд может вызвать тяжелые последствия, вплоть до смертельных случаев, в умеренных дозах он является важным средством для лечения ряда болезней, трудно излечимых медикаментами.

Лечение пчелиным ядом должно проводиться в чистом виде или в комплексе с другими медикаментами только под наблюдением знающего врача. Имеется немалое количество наблюдений, свидетельствующих о большой эффективности лечения ядом.

Введение пчелиного яда осуществляется посредством ужаления пчелами, внутрикожной или подкожной инъекцией апитоксина, иногда местно — путем мазей, содержащих пчелиный яд.

По специальной схеме* для ужаления используют те же участки тела, что и при введении лекарственных веществ посредством инъекций: наружные поверхности плеч и бедер. В первый день больной подвергается ужалению одной пчелы, на второй день — двух пчел, на третий — трех, и так до 10 дней, в течение которых больной получит 55 ужалений. После этого следует перерыв на 3—4 дня, а затем ежедневно по 3 ужаления. В течение второго курса лечения (1,5 мес.) больной должен получить примерно 150 ужалений, а всего за два курса — 200 ужалений пчел.

Более точная дозировка пчелиного яда достигается при подкожном введении его по 0,1, 0,2, 0,3 мл, что соответствует одному, двум или трем ужалениям.

Данный метод дает хорошие результаты лечения заболеваний периферической нервной системы при введении пчелиного яда посредством электрофореза.

* Схема предложена Н. П. Яришом.




Рис. 2 — Лечение пчелиными ужалениями (цифры указывают дни лечения).

Пчелиный яд обычно хорошо переносится, 1—5 и даже 10 ужалений одновременно у здорового взрослого человека чаще всего вызывают лишь местную реакцию в виде покраснения и припухлости, ощущения жжения. 200—300 ужалений одновременно вызывают тяжелую интоксикацию организма, характерными признаками которой является острое нарушение сердечно-сосудистой деятельности.

Наиболее чувствительны к этому яду дети, лица пожилого возраста, женщины, а также лица, склонные к аллергическим заболеваниям. Лицам, имеющим повышенную реакцию на пчелиный яд, данный метод противопоказан.

При заболеваниях периферической нервной системы (невралгия, миозиты, полиневриты и др.), ревматизме, ревматоидных артритах рекомендуется комплексное лечение пчелиным ядом и маточным молочком. При этом фармакологический эффект значительно усиливается, повышаются и защитные силы организма.

Старый метод лечения ревматизма укусами пчел

Русские знахари с незапамятных времен лечили своих пациентов укусами пчел. Врачи официальной медицины ряда стран стали применять этот способ лечения при тяжелых случаях ревматизма. Техника лечения этим способом крайне проста. Обыкновенно, ловят пчел; берут пчелу за крылья и садят на больное место. Пчела почти всегда немедленно кусает. Следующий укус производят через сутки после первого на 4—8 см от места первого укуса. Первый день делают укус одной пчелы, на следующий день — двух, на третий — трех и так до 5. Затем дают больному 2 дня отдыха и производят укусы в обратном порядке, т. е. начинают от 5 пчел, и, убавляя каждый день по 1 пчеле, сходят на нет. Если больной все еще чувствует боли, то через неделю повторить курс лечения. После второго курса лечения надо дать больному 2 недели отдыха перед тем, как подвергать его третьему курсу лечения, если таковой является необходимым, что бывает очень редко.

Побочные эффекты при лечении медом и другими продуктами пчеловодства и противопоказания к их применению

Встречается немало случаев непереносимости меда. Побочные эффекты при его применении проявляются чаще всего в виде повышения температуры, аллергических реакций (крапивница, кожный зуд, насморк, головная боль, расстройства желудочно-кишечного тракта, удушье). Чаще всего они появляются у людей с повышенной чувствительностью при первом в жизни приеме меда или другого продукта (пчелиный яд и т. д.) — так называемая идиосинкразия. Таким людям мед противопоказан. Однако иногда может проявляться непереносимость только какого-нибудь сорта меда.

Тогда необходимо подобрать такой сорт, который лучше переносится, без каких-либо побочных явлений.

Непереносимость меда и других продуктов пчеловодства может быть установлена посредством предварительно собранных данных. Ее можно определить постановкой внутрикожной пробы (подобно на чувствительность к антибиотикам группы пенициллина).

Основные противопоказания к применению меда и других продуктов пчеловодства: а) сверхчувствительность к ним (идиосинкразия); б) ограничение углеводов (касается меда) во всех случаях, когда больным по роду заболевания оно предписано; в) введение меда посредством ингаляции (через дыхательные пути) больным с выраженной эмфиземой легких, бронхиальной и сердечной астмой, "легочным сердцем", миокардитом, клапанными пороками сердца, туберкулезом легких.

М У М И Е

Ряд ученых считает, что мумие или как иногда называют "горный воск"*, входит в состав продукта дикой медоносной пчелы, получившего также название "мумие всиль" или "мумийон, мумийа". Этот продукт применяется в народной медицине с древности. О лечебных свойствах мумие знал и писал еще Авиценна (Ибн Сина).

В народной медицине древности мумие применялось при самых разнообразных травматических повреждениях. В последнее время мумие привлекло внимание и медиков.

В Узбекистане была организована специальная экспедиция с участием геологов и медиков по изысканию мумие. Бальзам среднеазиатских гор был обнаружен в пещерах на высоте 2000—3000 метров над уровнем моря.

В последние годы на страницах газет и журналов запестрело слово "мумие", которое называют чудодейственным бальзамом, эликсиром. Действительно такое мнение существовало в прошлом у народов Востока, да и теперь мумие, как лечебное средство, широко применяется в некоторых азиатских странах. Это и привлекло внимание советских медиков, заставило их заняться изучением бальзама.

Первым широким циклом научных изысканий явилась диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук ташкентского хирурга А. Ш. Шакирова. Врач исследовал мумие, испытал его действие на животных и в клинике при переломах костей. Установлена высокая эффективность препарата, что способствует успешному заживлению переломов и улучшает общее состояние больных. Исследования Шакирова положили начало научному изучению мумие и в других областях медицины. Интерес к мумие — пахучему, смолистому веществу, добываемому в горах, возрастает из года в год. Древние медики приписывали ему многие целительные свойства. Сейчас в ряде клиник нашей страны мумие также используется для ускорения заживления костей после переломов и лечения других болезней. Однако до сих пор происхождение мумие остается загадкой. На этот счет существует множество гипотез. Одни исследователи связывают природу мумие с различными видами микроорганизмов, другие рассматривают его как мед диких пчел, сок тутовника, арчи и даже экскременты различных животных.

Выписка из докторской диссертации А. Ш. Шакирова (хранится в Ленинской библиотеке, в Москве).

...По утверждению древних медиков, самое высококачественное мумие — черного цвета, блестящее, мягкое. Оно пахнет подобно нефти, но имеет особый специфический запах. Под мумие они понимают различные природные образования на стенках гротов, похожих на смолу веществ... или они сообщают, что пчелы запечатывают свой мед и летку воском и покрывают запечатанное место чем-то черным, с острым запахом трав, похожим на воск... или мумие готовят из трав... или это продукт брожения навоза...

* Кузьмина К. А., Лечение пчелиным ядом и медом. Саратов, 1981.

В настоящее время существует несколько теорий происхождения мумие: одна нефтяного, другая биогенного (разложения экстракта навозной жижи различных животных, разложение смолы арчи, лишайников и других растений, разложение воска диких пчел). Пока что экспедициями советских специалистов установлено, что мумие натечного типа от коричневого до черного цвета со специфическим острым запахом. Бальзам просачивается из разломов горных пород, скапливается на сводах и стенках пещер, часто свисает с потолка темными сосульками.

Свыше 70 источников с сообщениями о мумие обнаружил А. Ш. Шакиров в литературе прошлого. Мумие, как указано в восточных рукописях, дает силу всему организму и особенно сердцу. Его применяли также при болезнях печени, желудка, туберкулезе, бронхиальной астме, параличах, воспалительных процессах, помогает также при отравлениях, укусах скорпионов, язвах мочевого пузыря, слоновости, заикании, вялости органов, рассасывает опухоли, нормализует функции внешних и внутренних органов, усиливает половую деятельность, помогает при головной боли, мигрени, дивбете, оказывает общее укрепляющее действие на организм. Но главным образом способствует успешному заживлению костей и ран. "Лишь мумие спасает от смерти", — гласит древняя восточная пословица.

Мумие* — горькая на вкус твердая масса — темно-коричневого или черного цвета с блестящей поверхностью. При нагревании мумие размягчается. В состав этого продукта входит много органических веществ и разнообразных микроэлементов. Это вязкая клейкая масса, теплотой рук размягчается, имеет смолистый специфический запах, в воде растворяется с небольшим осадком.

В своем составе мумие содержит около 28 химических элементов, 30 макро- и микроэлементов, а также 10 различных оксидов металлов, 6 аминокислот, ряд витаминов — В₁₂, Р-617, В₁ и др., эфирные масла, пчелиный яд, смолотоподобные вещества — каждое из которых способно повлиять на соответствующие обменные процессы организма, усиливать регенеративные процессы в различных тканях. Как противовоспалительное, антитоксическое, общеукрепляющее средство, а также восстанавливающее пониженную функцию периферических нервных стволов или анализаторных центров головного мозга, положительно участвует в биосинтезе клстки ДНК, что приводит к усиленному делению и увеличению количества клеток.

Мумие лечебно действует на множество заболеваний, и этот механизм действия средства представляется весьма сложным, влияет многосторонне на всю жизнедеятельность организма, на различные его процессы и т. д. (например: в любом фармацевтическом лекарстве сочетаются лишь 5—6 элементов, химически подобранных искусственным путем, а здесь имеют место 50 компонентов, подобранных природой). Для определения качества мумие его минут: хорошее при этом быстро размягчается, а некачественное остается твердым.

Мумие является малотоксичным веществом: прием внутрь 30 мг/кг или введение внутривенно и подкожно 4% раствора мумие в количестве 250

* 1) Из научных трудов Шакирова, Исмаилова, Вишневого, Нуралиева и др.

2) Кузьмина К. А. Лечение пчелиным медом и ядом. Саратов, 1981.

мг/кг веса не вызывает у экспериментальных животных никаких токсических проявлений. Мумие обладает бактерицидным и бактериостатическим действием. Под влиянием приема мумие усиливается минеральный обмен, ускоряется заживление переломов костей, костная мозоль образуется на 8—17 дней раньше обычного.

В Узбекском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии проводятся работы по изучению возможного применения мумие в лечебных целях у человека. Наблюдения над большой группой больных с инфицированными переломами костей, остеомиелитами, ожогами, длительно незаживающими язвами и др. показали, что мумие обладает высоким лечебным эффектом.

Мумие способствовало не только более скорому заживлению ран и формированию костных мозолей, но одновременно у больных нормализуется кровь, улучшается общее состояние, появляется хороший сон, аппетит, исчезают боли, быстро происходило восстановление функции пораженной конечности.

Мумие назначается 1 раз в день утром натощак в дозе 0,15—0,20 г. Курс лечения — 10 дней, после чего рекомендуется сделать перерыв на 5—10 дней, затем лечение можно повторить вновь. Количество курсов колеблется от 3 до 4.

Дозы мумие для детей: в возрасте от 3 месяцев до 1 года — 0,01—0,02 г, до 9 лет — 0,05 г, 9—14 лет — 0,1 г в день.

Лечебные свойства мумие подтверждены наблюдениями врачей в целом ряде лечебных учреждений страны. В настоящее время на протяжении ряда лет продолжается исследование мумие в Ленинградском химикофармацевтическом институте (ЛХФИ, на кафедре фармакологии и аптечной технологии лекарства), а также в Московском ХФИ и в гг. Ташкенте, Душанбе, Самарканде и др.

Это дорогостоящее средство особенно часто используется в народной медицине и клиниках в Таджикистане, г. Ташкенте, и на Кавказе.

При регулярном и правильном применении мумие успех всегда будет обеспечен. В народной медицине мумие величиной с пшеничное зерно (0,15—0,2 г), и назначают его по 1—2 раза в сутки, чаще всего перед сном.

В период лечения мумием, принимать алкоголь противопоказано.

Противопоказаний по применению в умеренных дозах мумие не имеет, а наоборот, защитноадаптогенные свойства положительны, снимают чувство усталости и действуют на организм человека общеукрепляюще, способствуют прибавлению и восстановлению утраченной силы, энергии.

Ряд исследователей в последнее время считает, что поскольку мумие включает в себя биологически активные вещества, постольку находят, что применение этого продукта противопоказано для больных в преклонном возрасте, считая, что эти биологически активные вещества развивают (умножают) клетки предполагаемых опухолей, если они имеются в организме пожилых людей.

Ценнейшее лекарственное средство мумие жизненно оправдало себя на протяжении ряда столетий и его применение научно обосновано экспериментаторами клиническим применением на больных.

Оно применяется вовнутрь непосредственным приготовлением с соками, на воде, меде, чае, молоке и т. д., благодаря хорошей растворимости.

Применяется также наружно смазыванием, закапыванием с различными соками, спиртом, медом и т. д.

Ниже мы приведем дозировку и применение мумие против ряда заболеваний, когда достигаются хорошие результаты.

Некоторые данные о мумие

(из других источников)

Удельный вес — 2,13. В воде растворяется без остатка. Цвет густо заваренного чая. При выпаривании водного раствора мумие образуется липкий экстракт, горячий без копоти и оставляющий 3,6% золы. На воздухе сгущается, уплотняется. При нагревании размягчается, даже разжижается.

Мумие широко использовали медики Востока при лечении нервных заболеваний, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, а также болезней печени, селезенки, легких, при переломах и для стимулирования защитных регенеративных и репаративных процессов в организме.

Мумие при постоянном введении в организм также не токсично. Результаты исследований показывают обоснованность применения мумие при лечении гнойно-воспалительных процессов.

При исследовании радиоактивности мумие получены результаты, которые почти равны показателям фона, т. е. радиоактивность мумие ничтожна, поэтому оно может быть использовано в медицине. Особую ценность радиоактивность мумие приобрела в качестве регенератора костной ткани.

Мумие широко применяется в Индии, при лечении астмы, туберкулеза, хронического бронхита, мочекаменной болезни, водянке, диабете, паразитических заболеваниях кожи и в качестве антисептика. По мнению врачей Индии, мумие является весьма эффективным средством лечения диабета. С этой целью применяется мумие — и исчезает жажда, полиурия, чувство жжения, усталости и повышается ассимиляция сахара. Назначают его с молоком или с фруктовым соком. В Бирме мумие под названием Час—Тум (кровь из горы) считают укрепляющим, противотуберкулезным, а также способствующим долголетию средством. Его употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в качестве отхаркивающего средства. В древние времена врачи применяли его при артритах, опухолях и различных воспалительных процессах. Есть различные виды мумие (индийское, бирманское, монгольское, японское и др.). Бывает сходный качественный химический состав, но отличаются соотношениями отдельных составных частей.

Прием мумие по Шакирову

Детям до 14 лет — 0,05 г, взрослым — 0,2—0,5 г один раз в день натощак за 1—2 часа до еды. Запивать сладким чаем, молоком, медом. Всего на лечение — 6 г. Курс лечения 7—10 дней — 2 г. Перерыв 10 дней, затем повторить еще 2 раза.

Лечат заболевания нервной системы, уха, кожные, желудочные заболевания, переломы. При суставном ревматизме, после вправления вывихов,

при растяжениях, переломах и пр. — 0,5—0,75 г мумие с розовым или другим маслом. Добавить крымских бобов и 3—4 желтка. Можно применять их наружно или внутрь по 0,2 г один раз в день натощак. После 10 дней перерыва повторить курс. Изучается в Узбекской НИИТО.

А. А. Шакиров исследовал на животных, не оказывает ли мумие отрицательного влияния на те или иные внутренние органы, нет ли у него канцерогенных свойств? Оказалось, что и в этом отношении мумие не вызывает перерождения тканей. Мумие практически не токсично и не радиоактивно. Биохимические исследования подтвердили усиление процесса обмена веществ под влиянием мумие. Мумие повышает тонус, стимулирует жизненные функции, положительно влияет на деятельность желудка, на функции некоторых эндокринных органов и печени, оно антибактериально и особенно эффективно при инфекциях и лучевой болезни.

В "Крабиде Кабире" приводится следующий способ смешивания мумие. Для смешивания мумие с различными маслами, розовой водой, соками и отварами трав пользуются водяными банями, которые умеренно подогревают. Затем смешивают стеклянной палочкой. Когда образуется однообразная масса, верхний сосуд снимается и смесь хранится до употребления в прохладном месте.

В восточной медицине мумие употребляется в виде пилюль, состав которых разнообразен. Здесь приводится только один, помогающий при общей слабости, переломах, ушибах, растяжении: 3 части мумие смешивают с розовой водой, затем 2,5 части гуммарабика (не клей) и прибавляют кристаллический сахар в количестве, равном мумие. Кристаллический сахар и гуммарабик растирают в порошок и добавляют мумие, растворенное в розовой воде. Все смешивают до тестообразного состояния и из этого густого теста скатывают пилюлю. Так как доза приема 0,2 г в день, то каждая пилюля должна соответствовать 1/4 этой дозы. Для получения розового масла лепестки красной розы смачивают водой, сверху наливают растительное масло, все это смешивается и кипятится. Вода испаряется и остается масло, которое фильтруется через марлю.

БОЛЕЗНИ И РЕЦЕПТЫ

ЯЗВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА, КИШЕЧНО-ЖЕЛУДОЧНОГО ТРАКТА, ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ (ЖЕЛУДКА, ПЕЧЕНИ, СЕЛЕЗЕНКИ), МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МОЧИ), ПРИ КОЛИТАХ, ГАСТРИТАХ

1. Принимать вовнутрь желательно натощак, 1—2 раза в день утром и вечером перед сном, в течение 25—28 дней 1 курс лечения и повторный через 10 дней при запущенной стадии заболевания.

Необходимое количество мумие для одновременного употребления — 0,02—0,4—0,5 г в зависимости от веса тела: до 70 кг — 0,2 г, 80 кг — 0,3 г, до 90 кг — 0,3—0,4 г, более 90 кг — 0,4—0,5 г.

Разводить желательно в молоке: 1:20 частям (2—3 стол. ложки, можно в воде, и добавять по вкусу мед, либо чередовать разведение мумие с соками (виноградным, огуречным), травами петрушки, черники, тмина, с желтка-

ми янц. Необходимое количество экстракта мумие на 1 курс лечения составляет 0,2—0,5 г — 10—25 г (в зависимости от веса тела).

В период лечения язвенных болезней, кишечно-желудочного тракта и органов пищеварения (печени, селезенки) и т. п. особенно соблюдать диету и умеренность в пище. Алкоголь противопоказан.

2. При травмах, если повреждена печень, больному дают пить 0,2 г мумие вместе с 0,1—0,2 г армянской глины и 0,5 г шафрана, соком маслины или соком листьев цикория.

3. Заболевания печени и почек — 3 г мумие растворить в 3 л кипяченой воды. Принимать по 20 мл раствора 3 раза в день за 30 минут до еды. Желательно запивать соком сахарной свеклы. 10 дней принимать, 3 дня отдыхать. На курс лечения — 15 г мумие.

4. Атония кишечника (запоры) — 2 г мумие на 1 л кипяченой воды, пить натощак по 100 мл раствора. Запивать сырой водой. Принимать 10 дней.

5. При язвенных заболеваниях мочевого пузыря и мочеточников — пить 3 раза по 0,2 г мумие с теплым молоком, а на ночь раствором 1 г мумие на 100 мл теплой воды сделать спринцевание. На курс лечения 15 г мумие.

ДИСПЕПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (ИЗЖОГА, ТОШНОТА, ОТРЫЖКА, РВОТА)

Принимать вовнутрь по 0,2 г мумие с молоком или медом, либо растворить в столовой ложке чая или кипяченой воды 2 раза в день утром и вечером перед сном в течение 24—26 дней. Излечение наступает на 10—15-й день.

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, АНГИНЕ, НАСМОРКЕ, КАТАРЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ЧИХАНИИ, КАШЛЕ

1. Принимать мумие по 0,2—0,3 г в смеси с молоком, либо с коровьим жиром и медом вовнутрь натощак и вечером перед сном (в соотношении 1:20), а также смазывания на ночь поверхности воспаленного участка ноздри, горла тем же составом посредством тампона или же полосканием горла (при ангине).

Всего необходимо 1—3 курса лечения в зависимости от формы заболевания. Курс лечения продолжать 25—28 дней с 10-дневным перерывом.

2. При болезнях верхних дыхательных путей: астме, кровохарканье, ангине, некоторых заболеваниях пищеварительного тракта, печени, почек, а также половой слабости мумие смешивают с салом коровы, медведя, волка, свиньи, соком баслена, тмина, петрушки, желтком яйца, маслом кокосового ореха, чечвицы, солодовым корнем и т. п. лекарственными компонентами растительного происхождения.

ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА

1. Закапывать в каждую ноздню смесь 0,1 г мумие с камфорным маслом в соотношении 1:5, 1:8 (по 0,2 г за присм). Исчезает после 2 курсов лечения в течение 25 дней на курс при 10-дневном перерыве.

2. От носовых болезней, особенно кровотечения, мумие также лечит.

Его смешивают с камфорой или добавляют сок майорана и закапывают в нос.

ГНОЙНЫЙ ОТИТ, ВОСПАЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УША, ПОНИЖЕНИЕ СЛУХА

1. Закапывание мумие по 0,4 г в смеси с маслом в соотношении 1:10 по 2 раза в день утром и вечером перед сном. Употребление при том также мумие вовнутрь 0,2—0,3 г в смеси с молоком и медом усиливает отток гноя и усиливает противовоспалительную функцию.

2. 0,35 г мумие смешивают с чистым розовым маслом, прибавляют сок неспелого винограда и закапывают в ухо. Это помогает при глухоте, язве и гниении уха. Мумие также смешивают с несоленым свиным салом и капают в ухо. Это помогает при врожденной глухости.

3. Воспаление среднего уха. Раствор мумие: 2 г на 100 мл воды. Вставлять тампон в ухо. Повторять несколько раз.

ТРОМБОФЛЕБИТ, А ТАКЖЕ ТРОМБОФЛЕБИТ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Принимать вовнутрь по 0,25—0,3 г 2 раза в сутки в течение 25 дней с добавлением мумие в смесь с медом и молоком в частях 1:20 в течение 20—25 дней с 10-дневным перерывом на курс лечения.

Уменьшает чувство боли, степень отечности и объема больной конечности, увеличивается количество эритроцитов, нормализуется РОЭ, а также лейкоцитарная формула, исчезают и другие симптомы заболеваний, увеличивается содержание гемоглобина.

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Сахарный диабет — пить 2 раза в день (утром за час до еды, вечером перед сном) по 0,2 г мумие в растворе. 10 дней пить, 5 дней отдыхать. На курс лечения 10—12 г мумие.

ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, МИГРЕНИ, ОЗНОБАХ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯХ, ЭПИЛЕПСИИ, ПАРАЛИЧЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

1. Днем мумие принимать вовнутрь по 0,2—0,3 г в смеси с молоком и медом в частях 1:20 2 раза в сутки утром натощак и вечером перед сном в течение 25 дней, а при запущенной стадии с повторениями через 10 дней после курса лечения.

2. При головной боли, мигрени, эпилепсии, параличе тела или лицевого нерва, вялости органов: берут 0,07 г мумие, смешивают с соком или отваром майорана (травы) и дают пить; а при летаргии — 0,125 г мумие смешивают с отваром чебреца ползучего и девясилом высоким и употребляют после кипячения.

3. Головная боль — пить по 0,2 г мумие на ночь 10 дней, 5 дней отдых.

ПРИ ЗАИКАНИИ

1. Необходима смесь мумие с медом в пропорции 1:5, 1:8 по 0,2 г экстракта. Лечение необходимо вести в течение 4 месяцев.

2. При занкании язык смазывают раствором мумие с медом.

ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ЛЕГКИХ

Принимать вовпуть в смеси 0,2 г мумие с сиропами (вишневым, персиковым и т. д.) в соотношении 1:20 при приеме 2—3 раза в сутки (вечером обязательно перед сном). Необходимы 3—4 курса лечения по 25 дней с 10-дневным перерывом. При тяжелой форме лечение продолжать. Возможно в смеси мумие с медом и молоком в тех же пропорциях.

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

1. Прием мумие по 0,2—0,3 г в смеси с молоком либо с коровьим жиром и медом вовнутрь натошак и вечером перед сном (в соотношении 1:20) с полосканием.

Всего необходимо 1—3 курса лечения в зависимости от формы заболевания. Курс лечения продолжать 25—28 дней с 10-дневным перерывом.

2. Примочки от опухоли и ран. 3 г мумие на 100 мл воды. Делать компрессы 1 раз на ночь и прием вовнутрь 0,2 г.

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ, СУСТАВОВ, ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ВЫВИХИ, УШИБЫ, РАСТЯЖЕНИЯ МЫШЦ, ТРОФИЧЕСКИЕ КОЖНЫЕ ЯЗВЫ, СВИЩИ, ОПУХОЛИ, ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, РЕВМАТИЗМ

1. Прием препарата вовнутрь в дозах 0,2—0,5 г наряду с растиранием пораженного места (в зависимости от участка поражения), курс лечения вовнутрь должен быть 25—28 дней и чередовать через 10 дней при необходимости, растирание продолжать весь период лечения без остановок.

2. При ушибах с повреждением грудной клетки и ее органов рекомндуется пить 0,2 г мумие с отваром тмина айгона, тмина обыкновенного.

3. 0,5 г мумие смешивают с розовым маслом и дают пить, а также смазывают перелом. Кости срастаются очнь быстро.

ПРИ СУСТАВНОМ РЕВМАТИЗМЕ

1. При суставном ревматизме, после вправления вывихов, при растяжении, переломах, после ушибов и пр. травм восточные медики рскомендуют аналогичные рецепты: от 0,5 до 0,75 г мумие смешивают с розовым маслом или по желанию с другим маслом. Смесь давать вместе с отваром крымских бобов и желтков 3—4 яиц. Эту же смесь можно положить на поврсжденную поверхность тела.

2. Боли в суставах — 100 г жидкого меда смешать с 0,5 г мумие. Компресс на ночь и принимать по утрам за час до еды по 0,2 г. 10 дней принимать, 5 дней перерыв. Прием вовнутрь 6 г на курс. Для полного лечения — 2—3 курса.

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ СТВОЛОВ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (РАДИКУЛИТАХ, НЕЙРОДЕРМИТАХ, ПЛЕКСИТАХ, НЕВРАЛГИИ)

1. Втирание (в течение 5—6 мин.) раствора прспарата в болезненные участки 8—10% раствора (лучше всего спиртового) в течение 20 дней

для курса лечения и чередования через 10 дней. При одновременном приеме вовнутрь с молоком и медом и чистяк 1:20 (0,2 г) и растирании болезненных участков, а также легком массаже участка отмечается более быстрое снижение тонуса воспаленной мышцы, исчезают чувство боли, зуд и другие симптомы заболевания.

2. Радикулит. 2 г мумие смешать с 2 г меда, втереть и оставить на ночь в виде компресса. Повторять 5—6 раз.

ПРИ ЭКЗЕМЕ КОНЕЧНОСТЕЙ

Необходимо в водной бане пропаривать конечности рук или ног в 5—6% растворе мумие, и также одновременно принимать вовнутрь по 0,2 г 2 раза в день утром и вечером перед сном с соком облепихи или с соком смородины (пропаривание конечностей лучше всего также осуществлять перед сном за 30—35 минут и течение 25 дней и продолжать после 10-дневного перерыва). Это заболевание требует методического регулярного лечения. При экземе можно также вместо пропаривания конечностей осуществлять натирание с массажем участка с раствором мумие и облепиховым соком, спиртом и т. д.

ПРИ БЕСПЛОДИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, УМЕНЬШЕНИИ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ, ПРИ ГИПОЛЕПЕРЕМИИ

(искаченные семя у мужчин)

Принимать вовнутрь по 0,2—0,3 г мумие совместно с соком моркови, либо с соком облепихи, либо с соком черники по 1—2 раза в день натощак утром и вечером перед сном (в соотношении 1:20). Курс лечения продолжать в течение 25—28 дней. Желаемых результатов иногда достигают при смешивании мумие с желтками яиц либо с соками некоторых лекарственных растений. Усиление половой функции заметно чувствуется уже на 6—7-й день.

ПРИ ЖЕНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ДЕФЕКТАХ ТКАНЕЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

(эрозии стенки влагалища и шейки матки
и других воспалительных процессах)

1. До и после менструального цикла — на эрозированное место накладывается салфетка, хорошо смоченная 4% раствором мумие, которая затем фиксируется тампоном. Курс лечения составляет 2—3 недели, после чего через 10 дней повторяется при необходимости. Наряду с проводимым курсом лечения рекомендуется и прием вовнутрь 1 раз, что сокращает сроки лечения. Во время лечения рекомендуется воздерживаться от полового акта. Лечение желательно проводить на ночь.

2. Эрозия матки — раствор 2,5 г мумие на 100 мл воды. Тампоны на ночь.

ПРИ ВОСПАЛЕНИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Прием мумие по 0,2—0,3 г в смеси с молоком, либо с коровьим жиром и медом вовнутрь натощак и вечером перед сном (в соотношении 1:20).

только присм вовнутрь в первые дни — по 0,2 г мумие 3—4 раза в день (5—6 дней, а далее как описано).

ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ИНФИЦИРОВАННЫХ РАНАХ, ОЖОГАХ, ГНОЙНЫХ ЯЗВАХ

1. Смазывать раны 10% раствором мумие пораженные места, либо 2—3% раствором или мазью.
2. Ожоги, нарывы — растворить 3 г мумие на 200 мл воды. Смазывать.

КОСТНО-ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ (тазобедренного, коленного сустава, позвоночника)

Прием вовнутрь по 0,1—0,2 г 2 раза в сутки в течение 25 дней с повторениями через 10-дневный перерыв в смеси с молоком, медом в соотношении 1:20.

ПРИ ГИПЕРТОНИИ

Гипертония — раз в день на ночь после еды через час 0,15—0,2 г мумие в растворе. 10 дней пить, 5 дней отдыхать. После приема 6 г мумие месяц отдыхать. 2—3 курса.

ПРИ КАМНЕ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

Камень в желчном пузыре. На 1 л воды — 1 г мумие. Пить 3 раза в день за 30 минут до еды по 200 г раствора. 10 дней пить, 5 дней перерыв. На курс лечения 12 г мумие.

ПРИ ГЕМОРРОЕ

Прием вовнутрь натошак 2 раза в день (утром и вечером перед сном) по 0,2 г мумие за один прием. И самое обязательное при этом — постоянное смазывание заднепроходного отверстия вглубь до 10 см (мумие в смеси с медом в частях 1:5—1:8).

Прнем вовнутрь повторить через 25 дней после 10-дневного отдыха, а смазывание продолжать по 3—4 месяца с месячным прерывом. При запущенном геморрое излечение наступит через 6—8 месяцев или гораздо раньше. Наилучшее примснение также достигается в смеси с мумие персикового масла или коровьего жира в тех же пропорциях для одновременного приема вовнутрь и смазывания (при этом необходимо значительное количество мумие на курс).

ПРИ ПАРОДОНТОЗЕ: ДЕСНА, ЗУБЫ, СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ПОЛОСТИ РТА, МЕСТНЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ И Т. Д.

1. Присм мумие по 0,2 г вовнутрь 1—2 раза в день (ночью обязательно перед сном) в течение 25 дней за курс лечения, с молоком и медом, либо с водным раствором в частях 1:20 с одновременной аппликацией мумие в виде 5% раствора.

2. Пародонтоз (оголение десен) — 2,5 г мумие на 100 мл воды. Полоскать утром и на ночь. Раствор проглотить.

ПРИ ЦИСТИТЕ

На стакан горячей воды развести 2—3 г мумие, сделать спринцевание. Снимает боли, рези в течение 10 минут.

ПРИ ГЛАУКОМЕ

Прием внутрь по 0,2 г мумие 2-3 раза в день за 30 минут до еды. 10 дней пить, 5 дней отдыхать. 3—4 курса.

ПРИ ТРУББРОНХОДИТЕ

Принимать по 0,2 г мумие в растворе по утрам за 30 минут до еды. 10 дней принимать, 5 дней отдыхать. 3—4 курса.

ПРИ ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС, ОЖОГОВОЕ ОБЛЫСЕНИЕ

1. Выпадение волос (облысение) — 1% раствор мумие (1 г на 100 мл воды) на настое лопуха и мяты. Смесь 50% и 50% корней лопуха и мяты. 1 ст. ложку смеси на стакан хипатха заварить как чай. 1 раз в день втирать в кожу головы.

2. Ожоговое облысение — 3 г мумие на 150 мл воды. Добавить 150 г дистиллированной воды. Раствор втирать в очаг 1 раз в день.

АЛЛЕРГИЯ

Одно из сильных средств лечения аллергич. Мумие разводится в концентрации 1 г на 1 л теплой воды (хорошее мумие мгновенно растворяется без признаков мутн).

Принимать утром один раз в сутки: детям 1—3 лет по 50 мл, 4—7 лет — по 70 мл; 8 лет и старше — по 100 мл раствора мумие.

Если аллергия очень сильная, нужно повторить прием днем, но дозу уменьшить вдвое. Мумие обладает мочегонным и послабляющим действием. При экземе смазывать высыпания более концентрированным раствором — 1 г на 100 мл воды.

Действие мумие обычно бывает очень сильным: даже отеки слизистой оболочки горла, приводящие к ночному храпу у самых маленьких детей, проходят в первые же дни лечения. Но нельзя довольствоваться этими быстрыми результатами. Необходимо провести курс лечения не менее 20 дней. Если принимать по 100 мл раствора (1 г — на 1 л) в день, то 1 г мумие хватит на 10 дней.

Авиценна рекомендовал проводить курсы лечения по 20 дней весной и осенью.

При бронхиальной астме особенно хорошо помогает мумие, растворенное в отваре солодки (лакричного корня). В 500 мл отвара солодки растворить 0,5 г мумие. Принимать отвар по 200 мл (детям до 8 лет порцию уменьшить) утром 1 раз в день. Отвар хранить в холодильнике. Через два дня готовить новый.

"ЖИВАЯ" И "МЕРТВАЯ"

В О Д А

И. И. М. И. И.

В начале 1981 года автор* прибора для приготовления "живой" и "мертвой" воды заболел воспалением почек и аденомой предстательной железы, вследствие чего был положен в урологическое отделение Ставропольского медицинского института. В этом отделении пролежал более месяца. Когда ему предложили сделать операцию аденомы, он отказался и был выписан. Будучи еще больным, он в течение 3-х дней доделывал устройство для получения "живой" и "мертвой" воды, о котором была опубликована статья Латышева В. М. в журнале "Изобретатель и рационализатор" за 1981 г. — 2 под заголовком "Неожиданная вода", и интервью в — 9 спецкорреспондента Ю. Егорова с академиком АН УзССР Вахидовым под заголовком "Активизированная вода перспективна".

Первое испытание полученной воды он провел на незаживающей более 6 месяцев ране на руке сына.

Проведенная проба лечения превзошла всякие ожидания: рана на руке сына зажила на аторис сутки. Сам он начал пить "живую" воду по 0,5 стакана перед едой 3 раза в день, и почувствовал бодрость. Аденома П. Ж. за неделю исчезла, прошел радикулит и опухоль ног.

Для большей убедительности, после недели приема "живой" воды он прошел обследование в поликлинике со всеми анализами, при которых не обнаружилось ни одной болезни, нормализовалось давление.

Однажды его соседка обварила руку кипятком, ожог 3-й степени.

Для лечения использовала полученную им "живую" и "мертвую" воду, и ожог за 2 дня исчез.

У сына его знакомого, инженера Гончарова, в течение 6 месяцев гноилась десна, в горле образовался нарыв. Применение различных способов лечения не дали желаемого результата. Для лечения он порекомендовал воду, 6 раз в день полоскать "мертвой" водой горло и десну, а после принимать внутрь по стакану "живой" воды. В результате — полное излечение мальчика в течение 3-х дней.

Автор обследовал более 600 человек с различными заболеваниями и все они дали положительный результат при лечении активизированной водой. В конце этого материала имеется описание устройства, которое позволяет получить "живую" (щелочную) и "мертвую" (кислотную) воду любой крепости. Проведенное испытание воды в лаборатории Ставропольского водоканала ("живой" — крепости 11,4 ед. и "мертвой" — 4,21 ед.) показали, что крепость за месяц снизилась на сотые доли ед., причем температура и снижение активности воды не влияет.

Использование активизированной воды автором на себе и на членах семьи и многих людях дали возможность автору составить практическую таблицу процедур лечения ряда заболеваний, определить сроки лечения и проследить ход и характер выздоровления.

(Советуем не заниматься самолечением без консультаций лечащего врача).

* Автор — Кратов.

**Использование "живой" и "мертвой" воды
для лечения ряда болезней**

№ п/п	Наименование болезни	Порядок проводимых процедур	Результат
1	2	3	4
1.	Аденома пред- стат. железы	В течение 5 суток 4 раза в день за 30 мин. до еды принимать по 0.5 стакана "Ж" — воды	Через 3-4 дня вы- деляется слизь, нет желания часто мочиться, на 8-е сутки опухоль проходит
2.	Ангина	В течение 3 суток 5 раз в сутки после еды полоскать горло "М" водой и после каждого полоска- ния выпить 0.25 стакана "Ж" воды	Температура сни- жается в первый день, на 3-й сутки болезнь прекра- щается
3.	Боль в суставах рук и ног	3 раза в день перед едой принимать по 0.5 стакана "М" воды в течение 2-х суток	Боль прекра- щается в 1-й день
4.	Воспаление печени	В течение 4-х дней в день при- нимать 4 раза по 0.5 стакана воды. Причем, в 1-й день — только "М", а в последующие — "Ж" воду.	
5.	Воспалительные процессы, за- крытые нарывы фурункулы	В течение 2-х суток прикла- дывать компресс к воспаленному участку, смоченный подогретой "М" водой	Заживание проис- ходит в течение 2-х суток
6.	Геморрой	В течение 1-2 суток утром про- мывать трещины "М" водой, а затем прикладывать тампоны с "Ж" водой, меняя их по мере высыхания	Кровотечения прекращаются, трещины зажи- вают в течение 2-3 суток
7.	Гипертония	В течение дня принимать 2 раза по 0.5 стакана "М" воды	Давление норма- лизуется
8.	Гипотония	В течение суток 2 раза принимать по 0.5 стакана "Ж" воды	Давление норма- лизуется
9.	Гнойные раны	Рану промыть "М" водой, а через 3-5 минут смочить "Ж" водой, затем 5-6 раз в сутки смачивать только "Ж" водой	В течение 5-6 суток происходит заживление
10.	Головные боли	Выпить 0.5 стакана "М" воды	Боль проходит через 30-50 мин.
11.	Грипп	В течение суток 8 раз полоскать нос и рот "М" водой, а на ночь выпить 0.5 стакана "Ж" воды	В течение суток грипп исчезает
12.	Запах ног	Вымыть теплой водой ноги, вы- тереть насухо, смочить "М" водой, а через 10 минут "Ж" водой и дать высохнуть	Неприятный запах исчезнет

1	2	3	4
13.	Зубная боль	Полоскать полость рта "М" водой в течение 5-10 мин.	Боль исчезает
14.	Изжога	Выпить 0.5 стакана "Ж" воды	Изжога прекращается
15.	Кашель	В течение 2 суток пить 4 раза в день по 0.5 стакана после еды "Ж" воды	Кашель прекращается
16.	Кольпит	Подогреть "М" и "Ж" воду до 37-40°C и на ночь спринцевать "М" водой, а через 15-20 мин. спринцевать "Ж" водой. Процедуру повторять 2-3 дня.	После одной процедуры кольпит проходит
17.	Гигиена лица	Утром и вечером после умывания протереть лицо, сначала "М" водой, потом "Ж" водой	Пропадает перхоть, прыщи, лицо становится нежнее
18.	Лишай, экзема	В течение 3-5 суток пораженный участок смачивать "М" водой и дать просохнуть, после чего 5-6 раз а сутки смачивать "Ж" водой. (Утром смочить "М", а через 10-15 мин. "Ж" водой и еще 5-6 раз "Ж" в течение суток)	Вылечивается за 3-5 суток
19.	Мытье волос	Вымыть голову с шампунем, вытереть, смочить волосы "М" водой, а через 3 минуты "Ж" водой	Пропадает перхоть, волосы становятся мягче
20.	Ожоги	При наличии пузырей — водянок их необходимо проколоть, пораженный участок смочить "М" водой, а через 5 минут "Ж" водой. Затем а течение суток 7-8 раз смачивать "Ж" водой. Процедуры проводить 2-3 дня	Ожоги заживают за 2-3 дня
21.	Опухшие руки	В течение 3 суток принимают воду по 4 раза в день за 30 мин. до еды: 1-й день — "М" воды по 0.5 стакана; 2-й день — 0.75 стакана "М" воды, 3-й день — 0.5 стакана "Ж" воды	Опухоль спадает, боли нет
22.	Понос	Выпить 0.5 стакана "М" воды, если а течение часа понос не прекращается, процедуру повторить	Боль в животе прекращается через 20-30 минут
23.	Порез, укол, разрыв	Промыть рану "М" водой и перезакрыть рану	Рана заживает а течение 1-2 суток
24.	Простуда шеи	Сделать на шею компресс, смоченный в теплой "М" воде и пить 4 раза а день по 0.5 стакана перед едой	Рана заживает в течение 1-2 суток

1	2	3	4
25. Радикулит	В течение суток 3 раза перед едой выпить 3/4 стакана "Ж" воды	Боль проходит в течение суток, иногда через 20-40 мин.	
26. Расширение вен, кровотечение из разорвавшихся узлов	Промыть вздувшиеся и кровоточащие участки тела "М" водой, затем смочить кусочек марли "Ж" водой и приложить к вздувшимся участкам вен. Внутрь принимать по 0.5 стакана "М" воды, а через 2-3 часа начать прием по 0.5 стакана "Ж" воды с промежутками 4 часа 4 раза в день. Процедуру повторить в течение 2-3 дней	Участки вздувшихся вен рассасываются, раны заживают	
27. Стерилизация и дезинфекция	Любые предметы, овощи, фрукты смачивают или протирают тампоном, смоченным в "М" воде		
28. Удаление отмершей кожи со ступней ног	В мыльной воде попарить ноги, обмыть их в теплой воде, затем не вытирая намочить ноги в подогретой "М" воде, потирая участки с наростами, удалить отмершую кожу, промыть ноги в подогретой воде, насухо вытереть		
29. Улучшение самочувствия, нормализация организма	Утром и вечером после приема пищи полоскать рот "М" водой и выпить 0.5 стакана "Ж" воды щелочностью 6-7 ед.		

"Ж" — Живая вода
 "М" — Мертвая вода

Примечание: при употреблении внутрь только "Ж" воды возникает жажда, ее надо утолять компотом или подкисленным чаем. Интервал между приемами "М" и "Ж" воды должен быть не менее 2-х часов.


Щелочная вода
 PH = 10—11 ед.
 с белым осадком

Брезентовый мешок
 Ø 50—70 мм
 H = 160—200 мм

Кислотная вода
 PH = 4—5 ед.

Литровая банка, 2 электрода из нержавеющей стали, расстояние между ними 40 мм, не достают до дна. Нержавейка размером 40х160х0,8 мм.

Процесс приготовления воды длится 3—8 минут в зависимости от необходимой крепости. После приготовления, отключив вилку от сети и вынув устройство, быстро вытащить мешочек и вылить "М" воду в другую посуду.



Живая вода (щелочная) (-)
Мертвая вода (кислотная) (+)

Рис. 3 — Прибор для получения "живой" и "мертвой" воды. Электрод — 2 шт. нержавеющей сталь 0.8х40х160 мм. Емкость — 1 литр. Время — 3—8 минут.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ

В. П. КОЗЛОВ, доктор медицинских наук

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА И ВОДОЛЕЧЕНИЕ

Издавна было известно, что кожа — самый обширный орган выделения шлаков, и вопросам водолечения посвящена многочисленная литература. Очень хорошая историческая справка о водолечении представлена в книге В. Т. Олефиренко "Водолечение" (1986).

Первые сведения о водолечении дошли до нас в индийском эпосе Ригведа (1500 лет до нашей эры). Вода применялась не только как средство омовения тел с гигиеническими целями, но и служила лечебным средством у индусов и египтян. В литературе имеются указания на то, что с лечебной целью ее применяли ассирийцы, вавилоняне и иудеи. Из Египта метод лечения был перенесен в Грецию Пифагором (582—507 гг. до нашей эры), где был усовершенствован Гиппократом (460—377 гг. до нашей эры).

Из Греции учение Гиппократа о водолечении было перенесено в Рим врачом Асклепиадом (114—59 гг. до нашей эры). В Риме лечение водой получило широкое распространение, о чем свидетельствуют многочисленные остатки древнеримских терм. Рим славился общественными купальнями, располагавшими большим количеством помещений: для умывания теплой водой, мытья горячей водой, купания в холодной воде, для отдыха и релаксаций. Эти купальни носили название "бальнеум". От слова этого и произошёл в дальнейшем "бальнеотерапия". Особенно ценились купальни-бальнеум, располагавшие минеральной водой.

В "Каноне", созданном в XI в. Абу Али Ибн Синой (Авиценной), среди других лечебных средств также упоминается вода как средство сохранения здоровья. В Индии бальнеологические процедуры предписывались больным как при наружных, так и при внутренних заболеваниях. Очень распространено было потогонное лечение при отеках на лице, конечностях, при общей водянке и во всех случаях, когда, по мнению врача, организм больного переполнялся сыростью, влагой и мокротой. Популярными были грязелечение, втирание, ванны, окуривание дымом и парами, согревающие компрессы, горячие влажные и сухие припарки; при кожных болезнях, в особенности если они сопровождались зудом, больных купали в искусственных серных ваннах или природных минеральных источниках.

В период средневековья, сменившего античную культуру, развитие водолечения, как и ряда других достижений Древнего мира, приостановилось. Возрождение водолечения относится ко второй половине XVII и первой половине XVIII вв., когда оно начало развиваться в ряде европейских стран. Однако даже к концу XIX в. этот метод лечения не получил еще достаточного научного обоснования. Длительное время применение водолечебных процедур строилось лишь на чисто эмпирических представлениях. Эмпирики, упоенные успехом своих терапевтических мероприятий, как отмечал А. А. Лозинский (1916), нередко доходили в своих методах до курьеза. Они предписывали больным потеть в парной бане или в горячей не-

чи 15 дней подряд, держали больных в воде не только днем, но и ночью или заставляли их выпивать в день до 80 стаканов минеральной воды. Чтобы разнообразить длительное пребывание больных в воде, в бассейне для водолечения помещала плавучие столки с закусками. Такой фанатизм не мог способствовать развитию водолечения как науки.

ВОДА

Все мы знаем, что вода играет очень важную роль в жизни человека. Но мы знаем также, что вода разнится по своему составу в зависимости от источника: речная, подземная, колодезная, опресненная, минеральная и другие.

В этом разделе речь пойдет о минеральной воде, широко распространенной среди горожан в виде питьевой воды, хотя таковой ее нельзя назвать.

Люди часто увлекаются употреблением минеральной воды, не учитывая, что в ее состав входит свой неповторимый набор химических элементов, что и определяет ее пользу или вред.

Большинство любителей минеральной воды пьют ее из-за наличия углекислого газа в ней. Особенно ею увлекаются страдающие от повышенной кислотности и гурманы, покупая любую минеральную воду без разбора — что есть в этот момент в продаже, не думая, что данная минеральная вода вредна для его организма и не для той болезни, которой страдает больной. Минеральная вода предназначена только для лечебных целей и может нанести вред организму, особенно детскому.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Лечебными свойствами обладает вода, насыщенная минеральными солями, органическими и биологическими активными веществами, а также различными газами. Такие воды называются минеральными. В зависимости от содержания в минеральной воде тех или иных ингредиентов и электрического заряда ионов она обладает различными целебными свойствами. Кроме того, физиологическое действие той или иной минеральной воды определяется ее температурой (которая колеблется в широких пределах — от 1 до 40°C и более) и способом приема воды (залпом или небольшими глотками, задолго до еды или непосредственно перед едой). Основные лечебные свойства минеральной воды зависят от ее химического состава.

Например, гидрокарбонатный ион участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия в организме. Такая вода, как нарзан, боржоми, обладая щелочной реакцией, нормализует моторную и секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, уменьшает диспепсические расстройства. Она полезна не только при заболеваниях органов пищеварения, но и при воспалительных процессах в мочеполовой системе.

При застое желчи в желчном пузыре и при пониженной кислотности желудочного сока полезна минеральная вода с содержанием иона хлора типа эссенуки № 4.

При запорак рекомендуются сульфатные минеральные воды (баталинская, арзни), раздражающие слизистую оболочку кишечника, благодаря чему усиливается его перистальтика.

Железистые минеральные воды (марциальная, джермук) стимулируют образование крови и поэтому их полезно принимать при малокровии.

Йодистые минеральные воды используются при атеросклерозе. При невробах назначают минеральные воды, в состав которых входит бром (например, талаа). Вода с кремниевой кислотой оказывает болеутоляющий, антитокический и противовоспалительный эффект.

В последние годы получают распространение радоновые минеральные воды в качестве питьевых, так как было установлено, что в небольших количествах они полезны при пиелонефрите и нарушении функций желудочно-кишечного тракта.

Содержащийся во многих минеральных водах углекислый газ стимулирует двигательную и секреторную активность желудка и кишечника, что полезно при заболеваниях, для которых характерны сниженная желудочная секреция и вялая перистальтика кишечника.

Грамотное применение минеральных вод позволяет снижать или повышать кислотность желудочного сока, улучшать кровообращение в желудке и печени, усиливая приток артериальной крови и отток венозной, что весьма благоприятно для деятельности органов, в частности потому, что при этом уменьшается или полностью ликвидируется гипоксия — кислородное голодание тканей, что повышает их устойчивость к воздействию болезнетворных факторов. В результате приема минеральных вод в печени нормализуются обменные процессы, ликвидируется застой желчи, в желудке — ускоряется процесс заживления язвы, восстанавливаются функции желудочных желез. Минеральные воды оказывают благотворное воздействие и на поджелудочную железу, в частности при панкреатите — воспалении поджелудочной железы.

Важное значение придается минеральным водам как стимуляторам секреции кишечных гормонов — гастрина и секретина, которые необходимы для нормального пищеварения. Кроме того, минеральные воды действуют на желудочно-кишечный тракт и рефлекторно. Следовательно, можно говорить о нейрогуморальном механизме влияния минеральных вод на пищеварительную систему.

Первым в России был открыт источник Марциальных вод на северо-западе страны при Петре I. Он очень верил в целебные свойства минеральных вод, не раз бывал вместе с женой (будущей Екатериной I) на курорте, возникшем в районе источника, и рекомендовал лечиться там заболевшему А. Д. Меншикову. В одном из документов той эпохи читаем: "царь по обычной церемонии, разсуждая о болезни его светлости изволил объявить о неслыканном действии Минеральных вод".

В СССР лечение минеральными водами на курортах получило большое распространение.

К пищевым веществам относится и вода, без которой жизнь невозможна. Именно в водной среде протекают биохимические реакции, что обусловлено уникальными физико-химическими свойствами воды — этой поистине удивительной жидкости. Не случайно именно в ней зародилась жизнь.

Живая клетка на 60—99,7% состоит из воды, что позволило Дюбуа утверждать: "Живой организм — это одушевленная вода". Организм взрослого человека массой 65 кг содержит в среднем 40 л воды. Больше всего

(25 л) находится в клетках, остальные 15 л составляют внеклеточную жидкость. Чем моложе организм, тем больше в нем жидкости, с возрастом количество воды в организме уменьшается.

Вода — единственная на Земле жидкость, которой присущи особые физико-химические свойства. Молекулы воды легко распадаются на ионы — положительно заряженный водород (H^+) и отрицательно заряженный гидроксил (OH^-). Именно эти ионы и определяют пространственную структуру белков, липидов, нуклеиновых кислот и других органических веществ. Полярности молекул вода обязана свойством растворять разнообразные вещества: минеральные соли, простые спирты, сахара и др. Потому-то вода и служит средой, где протекают многочисленные химические реакции, в совокупности создающие жизнь.

Вода играет ведущую роль в терморегуляции организма, поддерживает тепловой гомеостаз, что позволяет адаптироваться к перепадам температуры окружающей среды. При повышении температуры увеличивается испарение воды с поверхности тела и оно охлаждается. Понижение температуры воздуха и окружающей среды резко сокращает испарение воды, и тепло в организме сохраняется.

Потеря большого количества воды (путем испарения, в результате рвоты, поноса, усиленного диуреза) нарушает постоянство внутренней среды (вместе с водой теряются и соли). Нормальная жизнедеятельность организма немыслима без сохранения водно-солевого баланса.

Важно учитывать количество не только введенной в организм воды, но и выделенной. Если количество выделенной воды меньше введенной, то это может свидетельствовать, например, об ухудшении функций почек, недостаточности сердечно-сосудистой системы.

Естественно, изменение химико-физического состояния воды, ее электропроводности приводит к изменению обмена веществ, усиливая либо тормозя ход биохимических реакций. Подобные изменения наблюдаются в талой, намагниченной воде и в воде, получаемой с помощью электролиза. Проблема влияния на организм ионизированной воды в последние годы интенсивно изучается и уже получены интересные результаты.

Исходя из того, что растительная пища ощелачивает организм (что благоприятно влияет на физиологические функции), можно ожидать, что и отрицательно заряженная вода, обладая щелочными свойствами, также благотворно действует на организм. Специальные эксперименты на животных и наблюдения над людьми подтверждают эти предположения.

Наш краткий рассказ о роли воды в живой природе закончим словами Антуана де Сент-Экзюпери: "У тебя, вода, нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое... Ты самое большое богатство в мире".

О ТАЛОЙ ВОДЕ*

При употреблении талой воды:

...Животные делаются вдвое более стойкими к возможным случайным

* Выписка из статьи доц. Гумана А. К. "Новое о талой воде", 1959 г., статья Гумана А. К. 5 апреля 1965 г.

Доклад был опубликован в трудах Общества Естественных Исследователей при ЛГУ, том XX, вып. I, 1959 г. В журнале "Звезда" № 8 1960 г. опубликован очерк П. Жура "Могучая вода".

инфекциям... Кошки, потерявшие способность к деторождению (от старости), приобрели снова эту способность и родили котят... При замачивании семян в талой воде и поливе ею растений урожай увеличился от 1,6 до 2,1 раза (рожь, пшеница, гречиха)... Ускоряются сроки созревания зерен...

По предварительным данным, талая вода является сосудистым средством, способствует уменьшению сердечных болей и даже рассасыванию тромбов коронарных сосудов сердца. Она прекращает сильные геморроидальные кровотечения, снижает геморроидальные боли, улучшает кровообращение после тромбозов нижних конечностей и облегчает течение болезни при варикозном расширении вен. У сердечно-сосудистых больных значительно снижается содержание холестерина в крови и улучшается обмен веществ. Талая вода может служить весьма эффективным средством против патологической тучности. (Случай: за три месяца вес снизился с 90 до 75 кг). Талая вода повышает спортивные качества спортсмена и сокращает время вхождения в форму.

После охлаждения льдом "омолодились" старые самцы крыс, они оказались повышено стойкими к холоду, перегреванию, резкому звуку, вызывающему у крыс судороги.

В тесном контакте с биологическими молекулами, даже при температуре теплокровного организма, часть воды находится как бы в "замороженном" состоянии, состоянии "льда". Эти ледяные структуры воды, по Сент-Дьерди, являются "матрицей жизни", без которой невозможна сама жизнь.

Только их наличие делает возможным протекание важнейших для жизни биофизических и биохимических реакций, в частности, транспорт энергии от места ее нахождения до места ее потребления в живом организме... Вода внутри организма, которая должна бы в данной зоне "замерзнуть" (при температуре организма!), может остаться в "переохлажденном" состоянии, чтобы заставить переохлажденную воду "замерзнуть", надо либо еще охладить ее, либо внести в нее центры кристаллизации (затравку). Тогда превращение воды в "лед" идет по цепной реакции. Такой затравкой является талая вода. По причинам, аналогичным тем, которые действуют на воду и вне организма, в живом организме, в зонах, где должен быть "лед", во многих случаях будет образовываться и сохраняться "переохлажденная" вода. Структура этой воды не упорядочена. "Лед", необходимый для жизненных процессов, отсутствует. Жизнь нарушена. В частности, нарушены пути подвода энергии к тем живым молекулам, где она потребляется... Примерно одинаковый эффект производят на "переохлажденную" воду талая вода и простое охлаждение организма. Надо лишь чтобы охлаждение коснулось "переохлажденной" зоны... Охлаждение, несмотря на последующее отогревание, оставило остаточные изменения. Эти изменения стойкие.

Структура льда важна в одном отношении: она идеально подходит к структуре биомолекул, т. е. крупных молекул белковых веществ и нуклеиновых кислот, несущих функции жизни. Живые молекулы могут быть вписаны в ледяную решетку, при замораживании даже до абсолютного нуля без нарушений их жизненных функций (после оттаивания). В организме живые молекулы вложены в ледяную решетку, как в идеально подходящий к ним футляр. Поэтому вхождение биомолекул и прочность удержания ими воды намного выше, когда вода, образующая с ними систему, имеет струк-

туру "льда". Если структура "льда" искажена, как она искажена в "перехожденной" воде, то "футляр" уже не подходит. Живые молекулы уже не помещаются между молекул воды и поэтому они будут все хуже и хуже удерживать воду. Но прогрессирующее снижение процента связанной в организме воды есть один из характернейших признаков наступления старости. Все худшее удержание воды — работа Кройта — ведет ко все худшей стойкости белковых веществ (коллоидов) живого организма: они все легче повреждаются, все легче осаждаются. Осаждение коллоидов внутри сосудистой стенки приводит к неполноценности сосуда.

Снеговая вода может иногда иметь преимущества перед другой талой водой. Она содержит особенно мелкодисперсные примеси — мельчайшие пузырьки газов, она лишена солей и поэтому, в частности, быстрее всасывается. Газированность воды увеличивает число центров кристаллизации.

Употребление талой воды (инструкция)

В течение дня желательно выпивать от 2 до 3 стаканов возможно более холодной талой воды (с кусочками льда). Выпивать стакан надо сразу, в один присест (предварительно приучив себя к ледяной воде). Первый стакан выпивать рано утром за час до еды. Остальные стаканы в течение дня, также за час до очередной еды. В зимнее время талую воду можно получить, замораживая водопроводную воду на балконе в эмалированной кастрюле (затем внести в комнату и дать ей растаять). Частично растаявшую воду поставить в нижнее отделение холодильника.

В летнее время делать лед в морозильнике. Минимальная доза, оказывающая эффект — 4—6 г талой воды на 1 кг веса. Это 2—3 стакана воды в день. Не стойкий, но заметный эффект может наблюдаться даже от 3/4 стакана один раз утром натощак (2 г на 1 кг веса).

В ряде случаев все время или периодически доза выпиваемой воды должна быть большей.

К горячей и кипяченой воде человек приучает себя долго и мучительно с пеленок, и потом становится наркоманом чая, кофе, кипятка. Его тянет к кипятку как к любимому привычному яду.

Пить надо прохладную родниковую или талую воду, вместо чая. Она должна быть не теплой, а прохладной и со временем просто холодной, какую пьют на севере очень здоровые люди.

Применение воды для лечения (водные процедуры)

Применение воды при лечении разделяется на следующие виды: компрессы, ванны, пользование паром, обливание, обмывание и питье воды.

В данном разделе приведены рекомендации Севастьяна Кнейппа, автора книги "Моя вода" — лечение, составленное на основании 40-летней практики.

Компресс

а) КОМПРЕСС НА ТУЛОВИЩЕ

Компресс на туловище оказывает воздействие при скоплении газов. Необходимо плотное покрывало смочить водой, покрыть туловище, так чтобы оно все было плотно прикрыто, сверху укутаться шерстяным одеялом и держать 45—60 минут. Такой компресс можно повторить несколько раз, вновь и вновь смачивая покрывало.

б) КОМПРЕСС НА СПИНУ

Оказывает благоприятное действие при болях в спине, остеохондрозах. Смоченное покрывало положить на постель, предварительно подложив клеенку, лечь на спину и укрыться шерстяным одеялом. На компрессе лежать 45 минут.

в) КОМПРЕСС НА ТУЛОВИЩЕ И СПИНУ

Эффективен при большом жаре, скоплении газов, приливах крови, ипохондрии и др. заболеваниях. Компресс можно делать или один за другим или одновременно.

Лечь на спинной компресс и наложить другой на туловище и укрыться шерстяным одеялом. Продолжительность — 45—60 минут.

г) КОМПРЕСС НА ЖИВОТ

Полезен при тяжести в желудке, холках и др. заболеваниях. Смоченную в воде плотную ткань накладывают на низ живота и покрывают сверху теплым одеялом.

Ножные ванны

Очень полезно при параличе принимать ножные ванны.

а) ХОЛОДНАЯ НОЖНАЯ ВАННА

Очень важна для здоровья как освежающее и укрепляющее средство, снижает кровяное давление.

б) ТЕПЛАЯ НОЖНАЯ ВАННА

Существует несколько способов применения:

а) в теплую воду положить ст. ложку соли на 1 л воды. Продолжительность — 12—15 минут.

б) в 3—5 горстей сенной трухи налить кипятка, закрыть посуду и дать остыть. Эти ванны полезны при болях, открытых ранах, опухлях, ушибах, подагре и т. д.

в) овсяную солому варить 30 мин. и охладить, 20—30 мин. держать ноги в этом отваре.

г) в местах, где разводят виноград, тем, кто страдает ревматизмом, полезно держать ноги 20—30 мин. в виноградных выжимках.

Полуванны

Под полуваннами подразумеваются ванны, при которых вода доходит не выше середины живота.

Способ применения их бывает трех видов:

1. Стоять в воде так, чтобы она была выше икры или колена.

2. Стоять в воде на коленях, чтобы бедра были в воде.
3. Сидеть в воде так, чтобы вода достигала до середины живота, до пояса.

Эти ванны холодной воды принимаются для закаливания организма. Продолжительность не более 1/2—3 мин.

СИДЯЧАЯ ХОЛОДНАЯ ВАННА

Холодная сидячая ванна улучшает пищеварение, регулирует кровообращение, помогает при гинекологических заболеваниях. Нужно налить воду в ванну так, чтобы она доставала до нижней части живота. Продолжительность 1/4—4 мин. Помогает также при бессоннице и неврозе.

ТЕПЛАЯ СИДЯЧАЯ ВАННА

Лучше всего делать с отварами полевого хвоща, овсяной соломы или сенной трухи. Помогает при наружных опухолях, при слабости желудка, запоре, геморрое, коликах и т. д. Продолжительность 1/4 часа. Отвар можно использовать неоднократно. Такие ванны можно повторять 2—3 раза в неделю, попеременно с холодными ваннами.

ХОЛОДНАЯ ПОЛНАЯ ВАННА

Всем телом погрузиться в воду и обмывать мочалкой верхнюю часть туловища. Продолжительность не менее 1/2 минуты и не больше 3 мин.

Такие ванны полезны и больным и здоровым летом и зимой. Они способствуют укреплению здоровья, очищению кожи, освежают, оживляют весь организм.

ТЕПЛАЯ НОЖНАЯ ВАННА

Могут принимать и здоровые, и больные люди. Погружаться в ванну всем телом и оставаться 25—40 мин. Затем принять холодный душ в теч. 1 мин. Не вытираясь, одеться быстро и делать движения по комнате или на свежем воздухе.

Можно эти ванны разбавлять настоем сенной трухи, овсяной соломы или сосновых веток.

СМЕШАННЫЕ ВАННЫ

Смешиваются отвары из сенной трухи и овсяной соломы, причем нужно, чтобы они варились вместе.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ

Не следует злоупотреблять сильнодействующими средствами, такими, как минеральные воды (внутренне или наружно). Самое умеренное — самое лучшее средство, касается это водолечения или лекарственного. Нужно помогать больному организму спокойно и ровно, а не резко и сурово.

ВАННЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА

а) Ручная ванна (для кисти и всей руки)

В случае, если болит палец или кисть руки, нужно делать компресс или ванну всей руки. Продолжительность от 2—3 мин. до 15 мин.

б) Головная ванна

В тех случаях, когда пациент страдает сильными головными болями, ревматизмом головы, очень полезны головные теплые или холодные ванны. Продолжительность таких ванн 1 минута — холодной и 5—7 — теплой. После ванны необходимо голову вытереть и не выходить на улицу с мокрыми волосами без головного убора.

ГЛАЗНАЯ ВАННА

Бывает холодная и теплая. Погрузить лицо в холодную воду и открыть глаза на 15 сек., затем поднять голову и через 15—30 сек. снова погрузить и так 3—4 раза.

Если это теплая ванна, то после нее необходимо погрузить лицо в холодную ванну.

К теплой ванне хорошо примешать отвар разных растений.

Холодные и теплые ванны благоприятно действуют на слабые глаза и укрепляют зрительный аппарат.

ПАРОВЫЕ ВАННЫ

Пользоваться паровыми ваннами следует умеренно и осторожно, иначе они вместо пользы принесут вред. Паровые ванны весьма полезны, они очищают организм от накопившихся шлаков. После пара следует обмыться холодной водой, что укрепляет и закаляет тело.

При заболеваниях отдельных частей тела следует принимать ванны этих частей.

а) Головная паровая ванна

Необходимо наполнить тазик кипятком и прикрыть крышкой. Сесть на стул, накрыться плотным покрывалом и наклонить голову над тазом. Верхняя часть тела должна быть обнажена. Затем крышку с таза снять, чтобы горячие пары устремились к голове и на грудь, оказывали воздействие. Продолжительность ванны 20—24 мин. Держать открытыми рот, нос и глаза. После ванны верхнюю часть тела обмыть свежей водой, проделать движения. Хорошо в ванну добавить травы: укроп, шалфей, подорожник, липовый цвет и т. д.

После ванны следует остыть, и лишь затем выходить на свежий воздух. Хорошо также после принятия головной ванны погрузиться в холодную ванну на 1 мин. Головные паровые ванны эффективны при головных болях, простудах, ревматических и конвульсивных болях в верхней части тела, при катарах горла и т. д.

б) Ножная паровая ванна

Таз (или ведро) наполнить кипятком, поставить ноги на край таза и прикрыть плотным покрывалом, можно употребить отвары разных трав.

Продолжительность 15—20 минут, чтобы продлить ванну, необходимо положить в воду раскаленный кирпич.

Пользуются ножными ваннами при отеках, ног, мозолях, сильном ножном поте и т. д. Следует делать ванны не более 1—2 раз в неделю.

а) Паровая ванна на ночном стуле (горшке)

Применяется при болезнях мочевого пузыря, почек и камнях. В ночной горшок наливают кипяток с добавлением отвара овсяной соломы, полевого хвоща и садятся на стул (горшок). Продолжительность не более 15—20 мин. После этого обливание.

Отвар сенной трухи применять при конвульсивном и ревматическом состоянии живота, нарывах в мочевом пузыре и при водянке.

г) Особая паровая ванна для отдельных больных мест

Паровые ванны очень полезны во многих случаях. При ядовитых укусах насекомых, змей, собак. Паровые ванны выводят ядовитые вещества из организма.

Продолжительность не более 20 минут.

Пары для вдыхания, глаз, ушей и т. д. не должны обжигать.

Обливания

При ослаблении организма после заболевания полезно делать обливания ног. Сесть, обнажить ноги до колена, поставить их в тазик и садовой лейкой поливать (особенно коленки) холодной водой (или душем с гибким шлангом). Поливать необходимо несколько раз, снизу вверх, сверху вниз.

а) Обливание бедер

Необходимо облить быстро ноги, а затем обливать бедра. Это обливание делается стоя.

б) Обливание нижней части тела

Тело обливают вначале сзади, начиная от ног до бедер и выше, а затем обливают равномерно нижнюю часть тела, главным образом область поясницы. Это обливание всегда должно следовать за паровой ножной ванной.

а) Обливание спины

Необходимо облить сзади все тело от затылка до пят и повторить 3—5 раз. Заканчивается эта процедура обмыванием груди и живота. Обливание спины благотворно влияет на позвоночник, кровообращение.

г) Обливание всего тела

Делать обливания попеременно сзади и спереди 3—4 раза. Особенно рекомендуется это обливание здоровым полным людям. Оно закаляет, улучшает циркуляцию крови. Можно делать при нормальной температуре. Слабым и больным рекомендуется обливание теплой водой.

д) Обливание верхней части тела

Обливание делается так, чтобы вода не стекала на нижние части тела. Нужно низко нагнуться над тазиком или ванной и поливать так, чтобы во-

да стекла по плечам вниз. Повторить обливание 3—4 раза. После этого обмыть руки, лицо и быстро одеться.

е) Обливание рук

Положено обливать только руки, начиная с кистей вверх по плечу. Эта процедура применяется для закаливания рук и полезна для устранения застоя крови в руках, для излечения от ломоты и ревматизма.

ж) Обливание головы

Лить воду так, чтобы струя текла за уши, на щеки и на закрытые глаза. Повторять 2 раза. Волосы вытереть насухо.

Обмывания

Обмывание будет эффективным, если оно равномерно и самое короткое должно продолжаться 1—2 мин. Рекомендуется только при нормальной температуре.

а) Полное обмывание для здоровых

Необходимо взять грубое полотенце, смочить в холодной воде и начать обмывать с груди и живота, затем переходить на спину, и, наконец, обмыть ноги, руки. Продолжительность не более 2 мин., избегать сквозняка. Лучше всего такое обливание делать по утрам.

б) Полное обмывание для больных

Необходимо равномерно обмыть все тело. Приподнять больного с постели и быстро обмыть спину, затем грудь и живот. Продолжительность не более 1 мин. Для слабых больных вместо воды употреблять уксус.

в) Обмывание отдельных частей тела

Грубое полотенце смочить водой и делать по правилам, указанным выше.

Обертывания

а) Обертывание головы

Полить голову так, чтобы вода не капала с волос, плотно повязать голову сухим платком. Через полчаса волосы будут сухими. Повторить 2—3 раза. После обертывания обмыть шею и голову холодной водой. Перед каждым обертыванием голова должна быть сухой.

Эти процедуры помогают при головных болях ревматического характера.

б) Обертывание шеи

Мягкое полотенце смочить холодной водой. Обернуть шею и покрыть сухой грубой повязкой в 3—4 оборота, так чтобы не было доступа воздуха. Обертывание продолжается 1—1 1/2 часа.

в) Шаль

Шаль применяется для груди и верхней части спины. Плотную ткань сложить шалью, намочить и наложить на голое тело, сверху накрыть сухой

тканью (из шерсти или холста). Продолжительность 1/2—1 1/2 часа. Мочить шаль через 1/2—3/4 часа, чтобы не высыхала.

Помогает в случае прилива крови, катара, воспалительных процессов, болезни дыхательных путей.

г) Ножное обертывание

Поверх мокрых носков надеть шерстяные, лечь в постель, укрывшись теплым одеялом. Продолжительность 1—1 1/2 часа. Обязательно лечь в постель.

Оказывает благотворное влияние при воспалении легких, улучшает кровообращение, снижает жар.

д) Обертывание до колен

Обернуть ноги мокрым бинтом до колен и плотно укутать шерстяным одеялом. Продолжительность и правила те же, что и в первом случае.

е) Нижнее обертывание

Назначается при болезни ног и живота. Обертывание начинается с подмышек, тах, чтобы голова, шея, плечи, руки были свободными. Они должны быть прикрыты чем-нибудь теплым. Плотная ткань должна быть настолько большой, чтобы ею можно было обернуть 2—3 раза, сложив в два раза, намочить эту ткань, выжать, разложить ее на шерстяное одеяло. На нее ложится пациент и оборачивается вокруг всего тела, затем плотно оборачивается шерстяным одеялом.

Продолжительность 1—1 1/2 часа. Помогает при опухольях на ногах, ревматизме, вздутии живота и т. д.

ж) Короткое обертывание

От подмышки до колен. Намочить плотную ткань и обернуть в несколько слоев, а сверху обернуть шерстяным одеялом.

Продолжительность 1—1 1/2 часа. Это обертывание очищает почки, печень, живот. Помогает при болезни сердца и желудка.

МОКРАЯ РУБАХА

Одеть мокрую длинную рубашку, лечь в постель и укрыться теплым одеялом.

Продолжительность 1—1 1/2 часа. Действует успокаивающе, вытягивает болезненные соки.

ИСПАНСКИЙ ПЛАЩ

Длинный широкий халат намочить, выкрутить, надеть и укрыться теплым одеялом. Продолжительность 1—1 1/2 часа. Расширяет поры и способствует выводу из организма вредных веществ.

Питье воды

Организм человека нуждается в жидкости. Это необходимо для работы желудка и жизнеобеспечения. Применять воду следует умеренно. Полезны для человека настои целебных трав, экстракты, масла и т. д.

Экстракты

Из трав или ягод выбрать самые лучшие и спелые, сушить на доске на открытом воздухе в тени. После сушки измельчить, положить в бутылку, налить в нее хлебного вина (спирта, водки), закупорить и поставить в теплое место. Принимать по каплям.

Настои

Из высушенных трав нужно взять столько, сколько можно захватить тремя пальцами, положить в чашку и залить кипящей водой. Через несколько минут слить и готов настой.

МОЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

ИСТОРИЯ МОЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Мочевая терапия не является чем-то новым. Это не фантазия мошенника и не мистификация. Наоборот, это проверенный временем метод лечения болезней, передававшийся из поколения в поколение.

Люди с незапамятных времен знали о целебных свойствах мочи и следы этих знаний сохранились в народной медицине.

В начале прошлого столетия в Англии, Шотландии и Ирландии была одновременно издана книга "Тысяча замечательных вещей". Вот некоторые причудливые выдержки из нее:

- универсальное и отличное средство от всех внешних и внутренних расстройств здоровья — по утрам пей свою собственную воду в течение 9 дней и она вылечит цингу, сделает тело легким, радостным;

- она хорошо помогает против водянки, желтухи; пей, как указано выше;

- теплой мочой мой уши: она хорошо действует против тухлости и других нарушений в области уха;

- мой и массируй ею руки, и она снимет онемение, удалит трещины и ссадины, расправит суставы;

- мой глаза своей собственной водой, и она излечит больные глаза, очистит их и укрепит зрение;

- обмой ею свою рану — удивительно хорошо помогает;

- обмой любое место, которое свербит, и она снимет зуд;

- мой нижнюю часть тела, хорошо помогает от геморроя и других болячек.

Эти высказывания говорят о том, что нельзя признать правильным обычный взгляд на мочу, как на грязный и ядовитый продукт, который нельзя принимать как лекарство.

Даже в настоящее время можно встретить случаи применения мочевой терапии в глухих деревнях. Старые бабушки дают пить детям их мочу в случае лихорадки, поноса и т. д.

Сохраняя здоровье своим детям, не имея лекарств, они сослужили полезную службу в том смысле, что позволили сохранить знания, которые при других обстоятельствах были бы утеряны.

Не только люди, но и животные инстинктивно применяют мочевую терапию. Если бык или собака нездоровы, они обычно лежат на одном месте и время от времени пьют свою мочу. Через несколько дней они здоровы.

В Индии широко употребляются коровак и моча коровы. Индусы принимают внутрь коровак и коровью мочу для самоочищения перед выполнением важных ритуальных процедур, а также если им приходится есть что-то плохое и грязное. В медицине аюрведов (индийские врачи) моча коровы считается очень сильным средством для лечения тяжелых болезней, особенно печени. Аюрведы признают мочу человека также сильнодействующим средством для лечения многих болезней.

Согласно Вагбаатте: "В мире нет ничего, что нельзя было бы использовать для лечения. Необходимо только использовать это разумно". Человеческая моча — противоядие. В Индии есть много йогов, которые регулярно употребляют мочу. Они выглядят молодыми даже в очень пожилом возрасте. Они считают мочу священной жидкостью. Они ее называют Шивамбу, что в переводе означает — вода Шивы, вода здоровья.

У секты Капаянка, поклоняющейся Богу Шиве, эта йоговская техника называется Амароли.

Наиболее древним и, пожалуй, наиболее полным источником а лечебном аспекте является глава из Дамара Тантры, озаглавленная "Практика использования мочи для восстановления тела". Она включает первую ступень амароли, поскольку физическое здоровье является непременным условием для любой духовной практики.

Дамар Тантра была написана около 5000 лет назад и носит форму диалога между Шивой и Парвати*. Ниже следуют некоторые из самых важных высказываний данного текста.

"...О, Парвати! Теперь я расскажу тебе, какая утварь подходит для достижения успеха. Сосуд должен быть изготовлен из золота, серебра, меди, железа, цинка, глины, бамбука, кости, кожи или листьев. О, деви, глиняные горшки лучше всего для этой цели". "Практикующийся должен воздержаться от соленой и острой пищи, должен есть немного, не переутомляться, работая, и избегать лишнего данжения. Он должен владеть своими чувствами и должен спать на земле".

"Практикующийся должен вставать рано утром (а именно, между 3 и 4 часами утра) и испускать мочу, стоя лицом к Востоку".

"Начальная и конечная порции мочи должны выбрасываться, а средняя порция собирается. Это лучшая порция мочи для питья".

"Необходимо принимать свою собственную мочу, она называется шивамбудхара".

"Шивамбу (мочу) как божественный нектар, она рассеивает болезнь и старость. Мистик должен сначала выпить свою мочу, а затем приступить к своим священным упражнениям медитаций".

"Встаа с постели, прежде всего приведи а порядок рот, испраа свои естественные нужды, а затем выпей свою мочу. Если делать это в течение месяца, то не только исчезнут болезни, но и тело очистится анутри".

"Путем втягивания мочи через нос каждое утро можно избавиться от всех болезней, вызываемых вата, питти и кафа (аюрведические элементы тсла — газы, желчь, слизь). Пищеварение улучшится и организм становится сильнее".

"Тот, кто атирает мочу во все тело три раза в день и три раза ночью, долго живет. Все суставы его тела укрепляются, он освобождается от болезней и остается жизнерадостным".

"О, Парвати, тот, кто пьет мочу раз в день и втирает ее а тело в течение трех лет, обретает тело, полное силы и блеска, знание а искусствах и науках, обретает дар краскоречия и живет до тех пор, пока существуют на небе звезды и луна". Если мы даже оставим а стороне гиперболы и упоминания о сверхъестественном, одна вещь остается совершенно ясной: моча

* Шива — Бог, Парвати — его жена.

несомненно очень эффективное и безвредное средство для укрепления тела и лечения болезней.

Итак, мочева́я терапия имеет старые и прочные традиции. Были времена, когда люди использовали мочу без колебаний в качестве лекарства. Но потом появилась медицинская наука, аллопатия, индийские аюрведы. Много важных исследований провели алхимики. Были детально изучены свойства трав и минералов и их воздействие на тело и мозг. Люди были поражены этими открытиями. Они решили, что растения и минералы, а также другие искусственно созданные вещества более пригодны и действенны для лечения различных заболеваний. И в то же время люди отдалились от природы, и идея о том, что моча — грязный продукт (иными словами — отходы жизнедеятельности организма), отложилась в их сознании. Так мочева́я терапия стала устаревшим видом лечения, и во многих частях света практически немыслимой.

К счастью, всегда находились люди, стремившиеся любой ценой установить правду. Такими людьми были Джон Армстронг в Англии и Раоджибхай Манибхай Пател в Индии. Они установили и доказали, что моча прекрасное и целительное средство. Можно легко себе представить, каким надо было обладать мужеством и какой убежденностью, чтобы исследовать на себе и применить на практике мочева́ю терапию, несмотря на резко отрицательное общественное мнение.

ДЖОН У. АРМСТРОНГ

Трудно найти более преданного делу человека, чем Джон Армстронг. В 1944 году Джон Армстронг написал свою знаменитую книгу по мочева́й терапии "Вода жизни".

Книга написана очень кратко, но содержит столько материалов, что заставляет действительно поверить в целительное действие мочи. Сначала Джон У. Армстронг испытывал это средство на себе, а затем вылечил тысячи людей. Его успехи были поразительными.

В книге сказано, что родители Армстронга были простыми людьми. Его отец лечил домашний скот, давая им их мочу. Это занятие было его хобби, а не профессия. Основываясь на этих воспоминаниях, Армстронг описывает метод мочева́й терапии для животных и птиц. Затем опыт мочева́й терапии Армстронг испытал на себе. Первым пациентом был он сам. Во время первой мировой войны, когда автору было 34 года, он был освобожден от службы в армии комиссией из 4-х врачей, которые признали у него туберкулез. Врачи рекомендовали свежий воздух, солнце и обильную питательную диету. За год Армстронг прибавил в весе 28 фунтов. В конце концов он стал страдать от диабета, пришлось перейти на совершенно иной режим питания, вследствие чего стали болеть зубы, ротовая полость, а язык сильно опухал. Вдобавок к этим неприятностям появилась еще бессонница, нервная раздражительность.

В конце концов, Армстронг почувствовал себя очень слабым и больным. И тогда, в одно утро, автор вспомнил текст из Писания: "Пей воду из своей собственной цистерны". Этот текст напомнил ему, как один отец вылечил свою дочку от дифтерита за три дня, напоив девочку ее собственной мочой. Првшли на память и еще случаи заболеваний, которые были изле-

чены тем же путем. Армстронг был уверен, что надо пить свою мочу для восстановления здоровья. Армстронг постился 45 дней и только пил свою мочу и воду из-под крапа. И это несмотря на уверения врачей, что человек не может продержаться без еды более 11 дней! Также втирал в кожу мочу (весьма важный фактор лечения). Наконец, Армстронг нарушил пост, съев бифштекс с кровью, это вызвало приступ дикого голода, ел он некоторое время с осторожностью. В это время он продолжал пить свою мочу и при этом заметил, что она меняется по температуре, количеству и вкусу и т. д. почти в полной зависимости от еды, питья и от степени физической нагрузки. В конце лечения Армстронг чувствовал себя действительно новым человеком. Весил 140 фунтов, был полон энергии, выглядел 25-летним, т. е. на 11 лет моложе своего тогдашнего возраста, и стал обладателем девичьей кожи. Армстронг писал свою книгу в 60 лет, но был совершенно здоров и выглядел намного моложе своих лет.

Армстронг лечил своим методом 40000 пациентов и полностью вылечил большинство из них. В своей книге он описывает успешные случаи лечения таких тяжелых болезней, как гангрена, туберкулез и рак.

РАОДЖИБХАЙ МАНИБХОЙ ПАТЕЛ

Манибхой Пател Раоджибхай был выдающимся исследователем XX века. Он был искателем правды, служил обществу и своему народу. Он приобрел эти качества, работая в тесном контакте с Ганди. Раоджибхай родился в 1888 году в штате Гуджарат. В 1907 году присоединился к движению Конгресса. Вскоре по семейным обстоятельствам переехал в Южную Африку, где поддерживал связь с Ганди, жившим в то время также в Южной Африке. С тех пор активно участвовал в движении ненасильственного сопротивления, с 1915 года снова проживая в Индии. Он был в первых рядах борцов, много раз сидел в тюрьме.

Но наиболее важным делом его жизни стало возрождение в Индии мочевого терапевии. С молодых лет, будучи еще в Африке, он стал твердым последователем натуропатии, вдохновляясь и этим идеями махатмы Ганди. В 1954 году у него был сердечный приступ. Обычно лечение давало лишь временное улучшение состояния здоровья. В это время ему попала книга Армстронга "Вода жизни". Он успешно испытал это средство на себе, затем по его совету, таким образом вылечилось много из его друзей. Затем он описал свои исследования в печати, пропигандировал метод мочевого терапевии по всей стране, несмотря на первоначально крайне отрицательное отношение большинства медиков. Впоследствии ряд известных врачей, непредубежденно изучивших факты, признали эффективность мочевого терапевии и поддерживали Раджиобхая.

1. Сущность мочевого терапевии

Вначале проанализируем составные элементы мочи с точки зрения химии и биологии.

Моча — продукт выделительной системы человека, ее химический состав и биологические компоненты сложны. Почки — наиболее важный ор-

ган, ответственный за "производство" мочи. Но химические вещества, обнаруживаемые в моче, выделяются в различных частях тела и важны сами по себе.

Химический состав мочи. Согласно биохимии, 100 см³ мочи нормального человека содержат:

Компоненты	Кол-во в миллигр.
1. Мочевина N (азот)	682.00
2. Мочевина	1459.00
3. Креатин N	36.00
4. Креатин	97.20
5. Мочевая кислота N	12.00
6. Мочевая кислота	36.00
7. Амино N	9.7
8. Аммиак N	57.00
9. Натрий	212.00
10. Калий	137.00
11. Кальций	19.50
12. Магний	11.30
13. Хлориды	334.00
14. Общие сульфаты	91.00
15. Неорганические сульфаты	83.00
16. Неорганические фосфаты	127.00
17. Кислота N/10	27.89
18. PH мочи	6.40

Следует помнить, что эта таблица непостоянна и содержание компонентов мочи у разных людей разное, а у отдельных людей зависит от времени. Если человек болен и принимает лекарства, состав мочи меняется. Это помогает врачам в диагностике болезни. Если употреблять много специй, особенно красный перец, то моча вызывает раздражение. Люди, принимающие поливитамины, имеют красноватую мочу. У тех, кто принимает много сахара, его можно обнаружить в моче, хотя это не означает, что эти люди диабетики. Изменение времени года влияет на цвет и количество мочи. Летом она темнее и ее меньше. Зимой выделяется больше мочи, следовательно, состав мочи зависит от многих внутренних факторов.

Существует множество аргументов как за, так и против использования мочевого терапевта. Однако множество взглядов "за" и "против" часто развиваются без рациональной основы и без обращения к реальной действительности. Мы, человеческие существа, имеем тенденцию скорее верить в то, во что мы хотим верить, чем верить в истину. Возможно, мы подвергаемся влиянию друзей или рекламы. Мы остаемся верными нашим взглядам, защищая их до конца. Если мы хотим подвергнуть ценность мочевого терапевта научному анализу, мы должны собрать все "за" и "против" применения мочи, затем мы должны скоррелировать все эти факты, взвешивая все "за" и "против", а потом выбрать возможный путь теоретизирования и проведения экспериментов.

Теперь необходимо рассмотреть два аспекта влияния рассудка и диеты на мочу и ее состав. Например, мы знаем, что состояние нашего ума влия-

ст на нервно-эндокринное равновесие. Когда мы волнуемся, мы вырабатываем большое количество адреналиновых гормонов и, таким образом, с мочой выделяется больше адреналина. Аналогично этому, когда мы возбуждены, мы вырабатываем большое количество природного гормона (гормона щитовидной железы) и, следовательно, в моче будет обнаружено больше этого гормона.

Исследователи утверждают, что рассудок является важным фактором в нашей жизни, определяющим каждое наше действие, каждую мысль и, следовательно, стиль жизни. Таким образом, мы должны определить влияние разума в мочевой терапии по двум критериям:

- 1) влияние разума на тело, посредством этого на состав мочи.
- 2) роль разума в исцелении, т. е. исцеление за счет веры.

Разум влияет на тело и меняет составные части мочи. Различные аспекты разума — спокойный в волнении, невротический, психостенический, — и различные аспекты сознания должны оказывать влияние на тело и таким образом на соотношение и природу веществ, выделяемых мочой.

Немаловажное значение имеет в период применения мочи диета. Следует придерживаться строгой вегетарианской диеты. Это означает воздержание от всех молочных продуктов, а также от мяса и других продуктов животного происхождения. Это правило особенно важно при длительном лечении с периодическими голоданиями, а также в тех случаях, когда потребляется большое количество мочи.

2. Техника мочевой терапии

Вначале следует подчеркнуть тот факт, что мочева́я терапия всегда подразумевает авто-мочева́ю терапию, т. е. пациенту дается всегда его собственная моча. Только в особых случаях, когда мочи пациента нет, ее можно заменить мочой других людей.

Применение мочи можно разделить на две основные категории:

- I. Внутреннее применение, которое включает прием мочи внутрь от одного стакана в день до всего количества, выделяемого во время голодания.
- II. Наружное применение от втирания свежей мочи в порезы и синяки до массажа и примочек со специально приготовленной мочой.

Мы представим несколько практических программ и правила для каждой из них. Эти программы дают только основные направления, и вы можете изменять их в соответствии с требованиями своего организма. Каждый человек лучше, чем кто-либо другой, знает потребности своего организма и это является лучшим критерием для определения времени приема и количества принимаемой мочи.

Основные правила

- 1) Следует использовать среднюю порцию мочи, за исключением случаев голодания, когда мочеиспускания происходят каждые 10—15 минут. Из первой мочи (утренней) всегда следует брать только среднюю порцию.

2) Мочу следует прихлебывать, как чай, а не пить залпом, как воду. Это поможет предотвратить дополнительные проблемы, такие, как появление очищения организма (жидкого стула).

3) Первая дневная моча (утренняя) является наиболее важной, и лучше всего принимать ее между 3 и 4 часами утра, особенно, если вы занимаетесь йогой.

4) Выпивайте по крайней мере один литр воды в день.

5) Пряной и соленой пищи, а также избытка белка следует избегать.

6) Мочу, полученную ночью до 3 часов утра, использовать не следует.

7) Что касается количества мочи, то этот вопрос решается каждым индивидуально.

Первоначальная фаза привыкания

В течение этого периода необходимо преодолеть несколько препятствий.

Для некоторых смелых людей, лишенных предрассудков, этот первый шаг может быть легко выполнен, в то время, как другим, все-таки стремящимся поверить в терапевтическую ценность мочи, может понадобиться на это больше времени. В любом случае процесс привыкания необходим и лучшим способом приступить к фазе привыкания является следующий:

1) Подготовка себя морально, приняв решение, по крайней мере попробовать осуществить этот процесс и изучить свои реакции, мысли и ощущения.

Когда вы почувствуете себя морально подготовленными к практической попытке, соберите небольшое количество свежей мочи и начинайте втирать ее в кожу рук. Ощутите ее текстуру, запах, посмотрите, действительно ли она может очищать кожу, как утверждают некоторые. Примерно через пять минут смойте мочу холодной водой и посмотрите, оказала ли моча какое-либо воздействие на кожу. Не применяйте мыла.

Следующая фаза приспособления тела и ума состоит в том, что вы наносите одну каплю мочи на язык. Вкус и запах играет важную роль в постижении ее природы.

В дальнейшем следует увеличивать количество выпиваемой мочи до тех пор, пока вы не выпьете полный стакан средней порции мочи и при этом не ощутите нейтрального состояния тела и ума. Тогда вы будете готовы приступить к следующим программам, приведенным ниже.

Практика внутреннего применения

Данную практику можно разделить на три основные программы:

1) Один раз в день.

2) Три раза в день.

3) Голодание.

Вы можете изменить эти предложения, например, выпивать два или четыре стакана в день. Однако эти основные правила и предложения, сложившиеся из опыта, должны оставаться для вас путеводной звездой.

ОДИН РАЗ В ДЕНЬ

Используйте среднюю порцию первой мочи, выбросив первые и последние 10 мл. Остальное соберите. Лучшее время приема с 3 до 4 часов утра. Прежде чем принимать мочу, совершите свой утренний туалет, т. е. почистите зубы и т. д. Мочу следует прихлебывать, как чай.

Это следует выполнять каждое утро, так что это станет частью ваших повседневных забот. Вы можете попробовать делать это либо в течение одной или двух недель в связи с каким-нибудь заболеванием, либо неограниченно долго, чтобы, как предлагают некоторые, добиться еще более крепкого здоровья.

Диета

Для данной программы не существует ограничений в пище, однако, низкосолевая диета с пониженным содержанием белка сделает вашу мочу гораздо приятней на вкус и на запах.

ТРИ РАЗА В ДЕНЬ

Средняя порция мочи принимается:

- 1) Первая моча дня (предпочтительно от 3 до 4 часов утра).
- 2) В полдень или через час после обеда.
- 3) Через час после ужина.

Диета

Эта форма является более эффективной и требует низкосолевой диеты с пониженным содержанием белка. Говорят, что моча, полученная через час после еды, содержит больше ферментов и ценных веществ организма.

ГОЛОДАНИЕ

Голодание уже само по себе является мощным средством борьбы с болезнями. Сочетание приема с голоданием является еще более мощным средством, поэтому к этой практике следует подходить медленно и поэтапно:

1) Подготовка к голоданию, во время которой следует приучить себя к моче и почувствовать себя готовым к ее приему и период голодания.

2) Предголодание: за два дня до начала настоящего голодания необходимо сократить количество потребляемого белка и тяжелой пищи, особенно жареного и жирного. Большое количество фруктов и сырых овощей помогает очистить кишечник и делает начало голодания легким и управляемым. Кроме того, в этот период можно также увеличить количество принимаемой мочи.

3) Настоящее голодание — это прием только мочи и воды. Никакой другой пищи или жидкости принимать нельзя. Во время голодания не следует работать, т. е. полный отдых способствует беспрепятственному процессу очищения.

Начиная с раннего утра, следует собрать среднюю порцию мочи и выпить ее. Затем нужно выпить чистой воды. Как только начнется голодание

и моча будет выделяться очень часто, можно выпивать ее полностью. Последнюю мочу дня следует выбросить, чтобы можно было хорошо выспаться и отдохнуть, давая возможность действовать восстановительным процессам организма. Если на каком-то этапе появится тошнота, прекратите практику на некоторое время, пока тошнота не исчезнет, а затем вновь приступите к ней.

Продолжительность голодания зависит от типа излечиваемой болезни. Некоторые энтузиасты утверждают, что иногда необходимо продолжать голодание неделями под наблюдением, чтобы достичь желаемых результатов. Они говорят, что моча избавляет от чувства голода, обычно связанного с голоданием, и приписывают это щелочной реакции организма. Скорее всего, это связано с воздействием на мозговые центры голода и насыщения.

Во время голодания как терапевт, так и практикующийся должны внимательно следить за тем, чтобы все протекало нормально. Надо избегать крайности, необходимо обладать определенным запасом здравого смысла. Лучше предпринять несколько коротких голоданий в течение более продолжительных периодов времени, чем одно длительное голодание, которое требует гораздо большего напряжения. Большинство авторов настойчиво рекомендуют применять во время голодания массаж старой или кипяченой мочой.

4) Этап после голодания требует большой осторожности в возобновлении нормальной диеты. По крайней мере в течение одной недели необходимо соблюдать большую осторожность, постепенно возобновляя и контролируя все привычки и аспекты диеты.

Лучший путь выхода из голодания — это полностью прекратить прием мочи и воды, предпочтительно во время ужина. Через час после этого следует выпить стакан апельсинового сока или лимонного сока, стакан сока из черного винограда или бульон из фасоли, слегка подсолоненный. В полдень следующего дня можно снова выпить виноградный сок или что-либо другое из вышеупомянутого. Вечером можно съесть папайю или какой-нибудь другой сочный фрукт.

На третий день можно съесть чечевичный суп, а вечером — вареные овощи с рисом. Таким образом, постепенно вы должны восстановить свою нормальную диету минус старые дурные привычки.

Альтернативное голодание

Если полное голодание на моче и воде слишком трудно для вас, то хорошей альтернативой будет голодание с одноразовым приемом пищи. При этом режиме используются те же основные правила, что и при полном голодании, но имеются следующие различия:

1) Можно съесть легкое блюдо, состоящее из трех лепешек (без дрожжей) или небольшое количество риса с вареными овощами, или свежих овощей и фруктов. Желательно принимать пищу между 17 и 18 часами, перед заходом солнца.

2) В течение часа до и после еды ни моча, ни вода, ни какая-либо другая жидкость или твердая пища не должны приниматься. Затем можно вновь приступить к мочевой терапии.

Такой режим можно соблюдать в течение длительного времени, особенно при лечении.

Практика наружного применения

Мочу прикладывают почти на все наружные порезы, синяки, укусы насекомых, опухоли, отеки, ожоги, инфекции, грибковые поражения и т. д. Если приложить сразу же после травмы, то это, как утверждают, предохраняет от инфекции. Говорят, что компрессы с мочой заживают пораженные участки кожи. Этот аспект мочевого лечения легко проверить путем эксперимента. В следующий раз, когда вас укусят какое-нибудь насекомое, сразу же вотрите мочу в место укуса и посмотрите, принесет ли это облегчение. Если вы начнете с таких экспериментов, то это вселит и вас веру в практическое использование мочи.

Техника смазывания тела мочой

За исключением порезов, ран, больших нарывов и опухания кожи лечение болезни начинается со смазывания тела мочой. Для этой цели лучше некоторое время выдержать мочу, а не использовать свежую. В "Шивамбу Калпа" рекомендуется выдержка — 36 часов, Армстронг использовал мочу, выдержанную 5—7 дней. Последний совет выглядит более убедительным, так как в старой моче высвобождается больше аммиака, что помогает быстрому поглощению мочи через кожу. Человеку среднего сложения для смазывания ежедневно требуется примерно 1/4 литра мочи. Мочу надо заранее собирать в бутылках и закупоривать их, чтобы не проникли насекомые. Ввиду бактерицидных свойств мочи, микробы в собранной моче не размножаются. Бутылки, для удобства, надо пронумеровать. Перед употреблением, особенно зимой, мочу лучше немного подогреть. Половину мочи, предназначенной для процедуры, вылить в стеклянный сосуд и смазать половину тела. Стекающую мочу удалить, так как она в ходе процесса загрязняется. Затем другую порцию мочи использовать для смазывания остальной части тела. При смазывании применять легкие поглаживания рукой так, чтобы пациенту было удобно и приятно. Если смазывание проводится раз в день, то идиальная продолжительность — 2 часа. Если процедура проводится два раза в день, то достаточно — 75 минут для одного смазывания. Наибольшее внимание надо уделять голове, шее, лицу, подушечкам ног.

Если лечение болезни начать со смазывания мочой, то выздоровление обеспечено. Иногда после 4—5 дней яды начинают выходить из организма в виде кожных болезней или маленьких волдырей. В связи с этим не нужно беспокоиться или лечить эти кожные проявления с помощью лекарств. Надо спокойно продолжать процедуры смазывания мочой. Чесотка, стригущий лишай и экзема проходят через 10—15 дней в результате процедуры. Однако другие упорные и длительные болезни требуют дополнительно голодания на воде и моче. Такое голодание бывает особенно желательным для очистки тела, если пациент длительное время принимал много лекарств.

После одного-двух смазываний мочой необходимо принимать ванну с прохладной или теплой водой, не используя при этом мыло. Армстронг придавал очень большое значение смазыванию мочой. Если во время голодания на моче и воде не применять смазывания, то положительный эффект голодания реализовать не удастся. Во время лечения голоданием на моче в воде почки нагружаются больше обычного и в результате сердечный пульс учащается. Это испытал на себе Армстронг во время своего первого голодания. Когда же тело смазывается мочой, кровообращение улучшается и пульс нормализуется. Смазывание мочой делает кожу мягкой и блестящей.

Применение влажных повязок с мочой

В случае пореза, раны, волдыря на любой части тела требуется наружное лечение. Для этого надо взять кусочек чистой материи, сложить вдвое и хорошо смочить мочой, чтобы повязка оставалась влажной. Лечение продолжается столько, сколько понадобится для заживления. Эта процедура применяется и в случае длительных кожных заболеваний, и при глазных болезнях (инфекция).

Предупреждения и предостережения

1. Смазывание мочой в течение 5—6 дней приводит к зуду кожи. Это проходит само по себе при дальнейшем смазывании.

2. Иногда по всему телу появляются маленькие волдыри с белой сердцевинкой. Это признак очищения тела. Тело надо смазывать мочой и проводить втирание энергично, чтобы волдыри вскрылись и моча проникла в сердцевину и там поглотилась. Через два часа принять теплую ванну без мыла. Через 1—2 дня волдыри исчезнут.

3. Яды из организма выходят посредством рвоты, жидкого стула, или сыпи на коже. При этом надо сохранить спокойствие и дать возможным природным силам делать свое дело.

4. При недостаточном мочеиспускании у пациента в теле образуются вздутые отеки. Прикладывание увлажненных мочой повязок к области таза устранит это явление.

5. Человек, применяющий мочевую терапию, должен внимательно изучать свои привычки, особенности и возможности. В этом методе лечения он должен быть своим собственным врачом.

6. Все другие лекарства и процедуры необходимо отменить не позднее чем за 4 дня до начала мочевой терапии; во время мочевой терапии прием лекарств не допускается.

7. Если у человека давление понижено и сердце слабое, то пациент должен придерживаться альтернативного голодания.

8. После излечения пациенту следует вести естественный умеренный образ жизни и помнить, что законы природы едины для всех и самое лучшее — подчиниться этим законам.

9. Не следует слушать тех, кто будет вас отговаривать от применения мочевой терапии. Надо спросить, какие у них основания для критики, пробовали ли они сами этот метод? Если нет — то зачем их слушать.

Армстронг в своей книге "Живая вода" перечисляет следующие заболевания, которые, как утверждают, можно излечить с помощью мочевой терапии: рак, лейкомия, туберкулез, легочные, сердечные заболевания, а также болезни мозга, возникающие в результате тромбоза или эмболии; гангрена, лихорадка, простуда и кашель; ожирение, глубокие раны, катаракты, ожоги, астма, нефрит, глаукома, язва желудка, колит, экзема, псориаз, проказа.

Приведем некоторые примеры.

АСТМА

1) Чтобы предотвратить приступ астмы в зимний или дождливый сезон, или в весенний период, если вы реагируете на пыльцу, вам следует выполнять следующее, прежде чем начнутся ваши проблемы. Хорошо подходят для этого теплые осенние дни. В течение 2—7 дней принимайте только мочу и воду. Затем медленно возвращайтесь к обычной диете, но продолжайте принимать, по крайней мере, один стакан мочи ежедневно, предпочтительно утренней. Массируйте грудь и спину старой или кипяченой мочой. Регулярно выполняйте промывание носоглотки мочой.

2) При остром приступе важно как можно скорее выполнять следующую программу.

Прекратите прием пищи и приступайте к голоданию на воде и моче. В этот период разрешается выпить горячего черного кофе. Массаж мочой может снять напряжение в груди и спине.

АТЕРОСКЛЕРОЗ

Это заболевание требует длительного применения мочи, чтобы она обратила вспять процесс дегенерации. Голодание и ежедневный прием мочи в сочетании с диетой разорвут прочный круг разрушения тканей умственного напряжения.

ДИСПЕПСИЯ

В этом случае мочу следует принимать утром натощак и за час до еды. Количество потребляемой пищи следует сократить и лучше пережевывать ее.

ЭКЗЕМА

Следует применять и внутренне и наружно.

а) Утреннюю мочу принимать внутрь.

б) Старую или кипяченую мочу следует втирать в пораженные участки дважды в день, после душа без мыла.

ГЕМОРРОЙ

Прием мочи внутрь и голодание помогают в случае болей, воспаления и сильного кровотечения. Хорошо действует также прием внутрь от 1 до 3 стаканов мочи в день. Мочу, которая является хорошей смазкой, следует втирать в геморроидальные шишки.

ГЕПАТИТ

Когда моча становится темной из-за присутствия желчи, ее очень трудно пить. В этом случае, для того, чтобы моча лучше циркулировала через почки, требуется больше жидкости. В соответствии с полученным опытом, после начала приема мочи она быстро приобретает более приятный вкус.

Приступайте к мочевого терапии, втирая мочу в ступни и ладони, давая возможность привыкнуть к ней. Затем попытайтесь выпить ее в небольшом количестве, запивая, если необходимо, водой. Если первая утренняя моча очень концентрированная, то выбросьте ее и используйте следующую мочу, полученную после обильного питья или фруктового сока.

ОЖИРЕНИЕ

Регулярный прием внутрь снижает аппетит, и поэтому он оказался полезным для страдающих ожирением. Вначале рекомендуется выпивать один стакан мочи в день, желательно утренней мочи, а затем дозу постепенно увеличивать до 3 стаканов в день с соответствующими ограничениями в диете. Один день в неделю следует проводить полное голодание с мочой. Как правило, прием пищи ограничивают до 2-разового питания. 1-й прием пищи между 9—12 часами утра, а 2-й — между 5—7 часами вечера.

РЕВМАТИЗМ

Больные ревматизмом получают облегчение уже только от диеты, принимаемой в мочевого терапии. Голодание и прием внутрь мочи, перемежающиеся с периодами ежедневного приема мочи от 1 до 3 стаканов в день и специальной диетой.

Мы перечислили лишь немногие терапевтические применения мочи, однако вы можете исследовать эту область сами и попытайтесь найти еще другие, более практические применения. Испытайте на себе все различные аспекты мочевого терапии и реакции на нее вашего организма, а затем сами решите, что верно, а что неверно, что помогает, а что нет. Это единственный путь достичь истинного знания.

ГОЛОДОТЕРАПИЯ

ЛЕЧЕНИЕ ГОЛОДОМ (по доктору М.О. Гартэну)

Одним из самых важных и наименее понятных путей к сохранению здоровья и его восстановления является продолжительное добровольное голодание. История указывает, что голодание, т.е. полное воздержание от пищи, издавна рекомендовалось и является частью обрядов великих религий: Христианской, Ислама, Буддийской.

Библия говорит нам, что Христос постился 40 суток, а у мусульман ежегодный пост "Рамадан" продолжается целый месяц полного воздержания от пищи от восхода и до захода солнца. Даже теперь многие племена Востока придерживаются строгого поста.

Медицинская наука Запада осудила постничество на том основании, что оно было нужно только для чисто религиозных целей, как содействие очищению души, но никакой пользы для тела не давало. На самом же деле голодание, без сомнения, может восстановить здоровье больному телу быстрее всего. Возможно, что идея воздержания от пищи для борьбы с болезнью так проста, что правверные медики относятся к ней отрицательно.

Рассмотрим так называемые "неизлечимые" болезни. Голод совершенно вылечил проказу в 21 день, а такие болезни, как рак и сердечные заболевания, часто совершенно излечиваются голодом (хотя это относится к несильно застарелым болезням). Малокровие и Брайтова болезнь, т.е. различные виды нефрита, детский паралич, язва желудка, пиорея, синуситис и катаральный состояние — все облегчаются и совершенно излечиваются голодом... Было сказано, что "простуда, если ее лечить, пройдет в 14 дней, а если ее не лечить, то в 2 недели". Но это положение ошибочно, что доказали мне мои клинические наблюдения. Полный голод от 1 до 4 дней достаточен для того, чтобы вылечить обыкновенную простуду, если позаботиться о гигиене толстой кишки и других оздоравливающих мерах, указанных в этом курсе.

Конечно, перспектива голода многих пугает. "Как же я смогу работать?", — спрашивает один, или: "Как я смогу устоять на ногах, если перестану есть?" — беспокоится другой. В таких случаях, конечно, каждый ощущает приступы голода, пропустивши 2—3 еды, но такое состояние продолжается недолго. Фактически "муки голода" человек чувствует только первые 2 дня, а после появляется чувство легкости и обострение всех органов чувств. Желание покушать иногда приходит на 5-й день голодания, но после этого, обыкновенно, постящемуся бывает даже неприятно смотреть на пищу. Были случаи, когда постящегося тошнило при виде пищи. После первых дней голодовка становится совершенно легкой и таковой остается до самого конца, когда возвращается нормальный аппетит.

Обыкновенно, плохой вкус во рту и толстый налет на языке сопровождается дурным запахом изо рта. Часто учащается биение пульса до 120

или падает до 40. Случаются даже тошнота, головокружение, накопление слюны, слабость, перкота в горле, небольшая простуда и понос, появляющиеся на самое короткое время. Хотя все эти симптомы и неприятны, настоящей опасности они собою не представляют, потому что они являются вспомогательными процессами очищения организма.

Естественно, что дальше следует потеря в весе. Такая потеря очень быстра в начале голода и постепенно уменьшается: тучные люди гораздо быстрее теряют вес, но средняя потеря бывает 360-720 г в день.

Отдых крайне желателен во время голода. Поэтому для такого процесса омоложения санатории являются наиболее желательным местом. Но это совсем не значит, что нужно сохранять и экономить энергию. При кратком голодании можно продолжать легкую работу, но не переутомляться.

Главное, что нужно при голодовке — это держать тело в тепле. Ни в каком случае вы не должны чувствовать холода: это не только неприятно, но и опасно. Рекомендуется пользоваться бутылками с горячей водой у ног в холодную погоду, чтобы избежать холода.

Часто возникает вопрос: "Сколько воды нужно пить во время голодания?" — Существует несколько школ по этому поводу: одни советуют голодаю без воды, другие рекомендуют пить не меньше 4,5 л воды в день. Практически опыт показал, что жажда пациента подскажет, что именно нужно ему в данном случае. Как только пациенту захочется пить, он должен выпить стакан свежей чистой воды.

В связи с этим возникает и другой вопрос: "Можно ли при голоде пить фруктовые соки, бульоны и прочее в добавление к воде?" — Голод означает воздержание от пищи, это не значит — воздержание от воды, но также не значит, что с водой можно пить и фруктовые соки (это составляет особый ряд диеты). И ни в каком случае это не означает, что пациенту можно пить молоко.

В некоторых местностях трудно достать хорошую чистую и свежую воду. В таких случаях рекомендуется пить дистиллированную воду. Для улучшения вкуса к ней можно добавить немного минеральной воды. Минеральную воду можно приготовить дома, прибавляя к дистиллированной воде "вершки" корневых овощей, как-то: морковь, свекла, сельдерей и др. По традиционной глупости, эти вершки от овощей выбрасываются, хотя во многих случаях они содержат больше минералов, чем та часть, что продается.

Возвратимся к нашей минерализованной воде. Мы накрошим "вершки" овощей кусочками в 4 см шириной и опустим их в дистиллированную воду на ночь. За ночь вода проглотит определенные магнетические силы, поглощенные растениями из солнечных лучей. Вкус такой воды будет освежающим. Кроме того, в воде растворятся также минералы и частицы элементов от растений.

Возникает также вопрос о промывании желудка во время голода. Наблюдения укрепили в убеждении, что время от времени промывание толстой кишки не только не принесет вреда, но и очень поможет общему процессу очищения. Это особенно полезно в самом начале голода. Нааряд ли промывания сильно ослабят пациента или же впоследствии ослабят мускулы кишечника настолько, что могут повлечь за собой закрепление желудка.

Где кончается голодовка и начинается настоящий голод? — Когда человек больше не принимает пищи, его тело просто питается своими запасами.

Когда истощаются эти запасы, мы обыкновенно находим, что организм избавился от токсинов, заражающих нашу кровь, которых было много в организме до начала голодовки. В этот момент голодовка окончилась и начинается истощение голодом. Голодовка кончилась, ибо очищение организма и его омоложение уже закончено: теперь тело может снова строить новые здоровые клетки. Как долго должна продолжаться голодовка? — Это всецело зависит от здоровья пациента, его образа жизни, а самое главное — от свойства его заболевания.

Разумеется, что истощенные и ослабленные болезнью пациенты не должны прибегать к длительной голодовке, хотя люди, не закончившие голодовки, не достигнут благоприятных результатов. В случае застарелой болезни, обострявшейся годами и вылившейся в тяжелую форму, ясно, что кроме законченной голодовки, ничто в мире не поможет.

После конца голодания всегда возвращается здоровый нормальный аппетит, налет на языке исчезает вместе с неприятным вкусом во рту и плохим запахом изо рта. Моча, которая могла быть цветной, снова становится чистой, а температура и биение пульса возвращаются в нормальные рамки.

Весьма важен переход от голода к нормальному питанию. Известно о случаях, когда голодающий человек вчера обедался — на следующий же день, был его последним днем, как и следовало ожидать.

Меня часто спрашивали, почему голоду придается такая исключительная важность. Ответ очень прост. Голод является самым радикальным способом для возвращения больного тела в состояние вибрирующего здоровья. Тело человека можно сравнить с машиной окисления. За 24 часа в нем сгорает топливо, равное 360 г жира. Если мы прекратим подачу такого топлива, организм сразу же меняет процесс своего снабжения. Процесс окисления должен продолжаться. И снабжение этим топливом происходит за счет запасов внутри тела. Из чего же они состоят? Экономика, созданная природой, употребляет в топливо частицы, наименее нужные организму. Сперва идут на топливо совершенно ненужные и лишние ткани, такие, как наросты, струпы, сращения, которые накопились и только мешают правильной работе организма. Человек, весящий 57 кг, в среднем теряет около 360 г в день во время голодовки. Как просто и эффективно можно отделаться от болезни, только прекратив прием пищи на короткое время!

Как чувствует себя человек во время голодовки? Какие впечатления получены от среднего пациента? Обыкновенно, чувство голода в 1-й день сопровождается и нервной раздражительностью. Можно подумать, что природа подготавливает человека к искуплению той громадной пользы, которую он должен как-то заслужить. Обыкновенно, самым трудными бывают первые два дня голодания. После этого, к великому удивлению пациента, наступает период легкости, и чувство голода совершенно исчезает. Часто пациенту бывает неприятно даже смотреть на еду. Во второй и третий дни голодания чувствуется иногда слабость, иногда легкое головокружение или чувство лени, такой период редко продолжается до 5-го дня голодания. После наступает период, когда пациент чувствует себя сильнее и бодрее, и мысли его становятся ясней. Потеря в весе у пациентов колеблется между

180 г и 1,5 кг а день, но средняя потеря равна 360 г в день, как говорилось уже ранее.

Как ни странно, голодание вылечивает одинаково такие противоположные состояния как чрезмерную тучность, так и чрезмерную худобу. После законченного голодания тело человека приобретает свой нормальный вес. Чрезмерно полные люди после правильного голодания не возвращаются к их прежнему весу, а слишком худые люди обыкновенно прибавляют в весе через несколько дней.

СУЕВЕРИЕ И БОЯЗНЬ

Лечение голодом сопряжено с известными опасностями. Первая и самая действительная — это страх. Никто не должен приниматься за 2 недельное голодание, если не убежден, что именно это ему нужно. Поэтому лучше длительное голодание проводить в санаториях, где этот метод лечения практикуется. Голодовка дома осложняется тем, что наши родственники, друзья и домашний доктор обыкновенно протестуют против нее. Они уверяют, что вы выглядите, как покойник, что ваш пульс очень слаб и ваше сердце может перестать биться в любой момент. Страх охватывает мнительного человека и мешает лечению. Суеверие, что человек без пищи может погибнуть, очень сильно, но практика показывает совсем обратное.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСТА

Голодать ли 3 дня? 13 дней или 45? Как долго человек может оставаться без пищи?

Большинство людей не знает разницы между лечением голодом и изнурением в результате вынужденного голода. Некоторые думают, что не посв 2—3 обедов, они уже начинают голодать. В действительности же дело обстоит иначе. Человек может оставаться без пищи месяцами. Истощение от голода начинается тогда, когда все лишние ткани и все запасы исчерпаны и деятельность организма продолжается уже за счет нужных ему тканей. Но в организме имеется значительное количество ненужных тканей в форме жира и употребление этого жира в топливо совершается без всякой для здоровья опасности. Освобождаясь от лишней тяжести, организм ничего не теряет из того, что могло бы помешать нормальному действию организма в его жизненной деятельности.

Голод был одним из древнейших практических явлений в жизни человека, и применение его как метода лечения также старо, как само человечество. Лечение голодом не является прерогативой только человека. Низшие животные руководствуются инстинктом. Что делают собака, кошка или лошадь, когда они заболевают? Продолжают ли они есть? Конечно, нет? Животное прежде всего перестает есть, оно начинает лечение голодом. Это делается инстинктивно, и животное не станет есть, пока болезнь не пройдет, и сама природа подскажет ему, что теперь можно возвратиться к нормальному питанию. И животное выздоравливает. Единственное, что больное животное станет есть, — это какая-нибудь слабительная травка. Это тоже делается инстинктивно, но все это является лечением голодом, а не истощением от голода.

Обратим внимание на животных, погружающихся в зимнюю спячку, как медведи, барсуки. За лето они нагуливают обильные запасы жира. С наступлением холодов они удаляются в пещеры, закапываются в норы и спят всю зиму. Они голодают месяцами, расходуя излишки накопленного жира, но совсем не истощаются. С наступлением весны они выходят из своих логовищ в великолепном состоянии и ищут пищу, чтобы начать снова накопление для следующей голодовки. Осенью они были слишком жирными и неповоротливыми, ленивыми; теперь же стали поджарыми, бдительными и энергичными.

Продолжительность голодовки должна быть от 3 до 45 дней. От 3 до 7 дней голод рекомендуется людям, занимающимся тяжелым физическим трудом; такая голодовка может быть повторена с промежутками от 1 до 3 недель, пока, наконец, не будут достигнуты желаемые результаты.

Бесспорно, что длительный голод дает более решительные и эффективные результаты. Но для этого необходимы: обстановка, опытное наблюдение и, главным образом, содействие самого голодающего. От него требуется понимание процесса лечения и искреннее желание улучшить свое здоровье.

ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ?

Фактически существует только один род болезни: нервное истощение и токсемия, т.е. отравление организма. Чем вызывается оно? Обыкновенно, причиной болезни является употребление возбуждающих наркотиков, вроде кофе, чая, шоколада, газированных вод, алкоголя, табака. Эмоциональная неустойчивость — страхи, ненависть, волнения, ревность и жадная погоня за деньгами — все это вместе выматывает нервную систему и ослабляет запасы нашей нервной энергии. В результате, функции наших желез и пищеварительные соки не могут соблюдать необходимый метаболический баланс, и следующей стадией болезни является токсемия. Большинство из нас питаются городским меню. Недостаток в нем минералов заставляет нас есть гораздо больше, чем это нам необходимо. Излишек пищи откладывается в тканях организма в форме жира, в то время как часть принятой пищи остается непереваренной в организме и ложится на него тяжелым бременем, которое порождает токсины, и в результате появляется заболевание.

Весь вопрос в том, как освободить организм от этих токсинов. Принимать ли лекарства или медикаменты? Очищают ли они наш организм? Ответ очевиден: нет такого лекарства, которое могло бы очистить наш организм от токсемии. Единственный путь освободиться от ядов, образовавшихся вследствие неправильного питания или от излишков в пище, это — голод. Голодание — самый сильный и радикальный способ и скорейший метод победы над болезнью.

Кровь наша совершает свой полный кругооборот в среднем в 24 секунды. Это значит, что наши органы извержения и очистки имеют возможность очистить кровь механически и химически. Число таких кругооборотов нашего кровоснабжения за сутки легко вычислить. Когда пища не поступает в нашу систему, вся энергия тела устремляется на очищение крови, которая, между прочим, находится все время в контакте со всеми клеточками нашего тела. Все пути освобождения, таким образом, действу-

ют наиболее производительно. Наше дыхание приобретает неприятный запах, т.к. масса отбросов выводится из организма через легкие. Слизистая оболочка дыхательного тракта тоже засоряется, и язык покрывается коричневым налетом. Моча становится цветной, и в ней появляются осадки. Усиленные выделения проходят также через толстую кишку: вот почему рекомендуют ежедневную клизму в первые дни голодания.

ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ ГОЛОДОМ

Не только Христос, но также и Моисей и Илья голодали 40 дней. Давид часто постился, и один период его поста в 12 дней нам известен. Иосафат узаконил голодание как средство оздоровления во всей Иудее. Как мы знаем из притчи о Мытаре и Фарисее (Евангелие от св. Луки), Фарисей гордился тем, что он постился дважды в неделю. Более двух тысяч лет тому назад лечение голодом было предписано философам природы Аскрепидом. Плутарк однажды сказал: "Вместо лекарства лучше поголодай день-два". Во многих древних писаниях, индусских и китайских, часто рекомендуется то же. Древнехристианские монахи зачастую отказывались от пищи, главным образом, по религиозным соображениям. Среди древних народов можно найти много похвал лечению голодом как одному из ценнейших даров жизни, до включения его в их верования и религиозные обряды. Вот почему лечение голодом часто упоминается и рекомендуется в Библии.

Каббала — секретная наука и мистическая философия евреев — тоже предписывает голодание. У всех почти древних народов отказ от пищи считался способом очищения тела. Со времени, когда человек научился записывать историю, мудрость религии распространилась на всю Азию, а оттуда и на Европу. Тысячи лет она процветала в Египте, Греции, Риме, Вавилоне, Иудее, Персии и в Скандинавии, как и среди кельтов так и готов. Каждый желающий принять звание священнослужителя проходил долгий период моления и поста. Друидские жрецы кельтов должны были проколоть через продолжительный пост, првготовляясь к посвящению в следующую степень их культа. Солнцопоклонники Персии подвергали себя 50-дневному посту. То же практикуется в Индии и по сей день. Махатма Ганди, знаменитый духовный вождь Индии, часто постился, иногда подолгу. В его записках, которые, между прочим, могут быть названы образцовой литературой современности, Ганди неоднократно предписывает голодание не только для исцеления тела, но и как средство умственного и духовного развития человека.

Правда, более древние предписания голода были связаны с какой-либо формой покаяния и обыкновенно являлись частью определенного религиозного обряда, но несомненно, что должна была существовать какая-то цель в умах законодателей, предписавших его. Вероятно, это было результатом суммы наблюдений над благотворным влиянием голодания поневоле. В X и XI веках великий лекарь арабов и Востока Авиценна часто предписывал голодание своим пациентам, особенно больным оспой и сифилисом.

Во время французской оккупации Египта были зарегистрированы многие случаи излечения сифилиса в арабских госпиталях путем голодания. Это было в 1822 г. Немного позже нам известны такие знаменитые докто-

ра, как Сильвестр Грахам, который положил начало "грахамской науки", и другие, которые рекомендовали голод как средство лечения от многих болезней. Точно изучено лечение голодом только благодаря д-ру Э. Хоккару, который определял голодание как особый отдел новой науки. Не только при острых, но в случаях хронических болезней он предписывал голодание и весьма с большим успехом. Приблизительно в то же время вперед продвинул значение лечения голодом д-р Г. Таннэр. Он сам голодал дважды по 40 дней, чтобы только показать другим, что человек может без всякого ущерба для своего здоровья оставаться без пищи такой срок.

В совсем недавние времена было сделано очень много, чтобы увеличить наши знания о голоде. Тысячи случаев голодания от 1 до 90 дней были наблюдаемы, и в каждом случае, когда голод был применяем для борьбы с болезнью, получались только благоприятные результаты. Многие тысячи людей восстановили свое здоровье, следуя этому простому и рациональному методу лечения.

ДЕЙСТВИЕ ГОЛОДА НА ОРГАНИЗМ

Большинство медиков согласно с тем, что по законам природы отжившие частицы организма первыми выбрасываются из тела. Это более всего заметно в отношении ногтей, заусенец и волос, и в особенности ясно демонстрируется у змей, когда те сбрасывают свою старую кожу. Во время голода процессы освобождения и очищения происходят гораздо быстрее, и жизненная сила, которая обыкновенно тратится на процесс пищеварения, употребляется тогда на выбрасывание из организма нежелательных тканей.

Вот коронная мысль, которую рекомендуется усвоить пациенту при лечении голодом. Каждый раз, когда вами пропущен обычный прием пищи, ваш организм настолько же очищается от нечистот. Иначе говоря, мы сжигаем около 360 г тканей, жиров, наростов, слизи и прочего, если мы не едим, что легко можно сравнить с уничтожением болезни. Средний обыватель не отдает себе отчета в том, что для процесса пищеварения наш организм употребляет громадное количество энергии. Это становится еще более очевидным, если принять во внимание, что помимо пищи, также и токсины должны быть удалены из организма, не говоря уже о том, что вся пища должна быть протолкнута через 9 м кишечника. Кроме того, нормально и излишне усвоенные элементы должны быть пропущены сквозь каждый кровеносный сосуд в теле снова и снова, много раз. Работа сердца должна быть увеличена, а также и работа печени, селезенки, почек, кожи и многих желез: все они участвуют в процессе полного усвоения пищи.

Многие люди изнуряют свой организм, тратя свою энергию (нервную) на чрезмерный пищеварительный процесс.

Самоотравление является прямым результатом излишнего пищеварительного процесса, ибо непрерывно частицы подвергаются своего рода загниванию и отравляют ткани и нервные сосуды во всем теле. Многие из нас замечают этот процесс отравления, когда чувствуют себя усталыми и вялыми, особенно, просыпаясь утром, несмотря на ночной отдых. Вот почему, между прочим, существует такое привычное для большинства людей желание выпить чашку кофе, которое создает ложное ощущение бодрости и силы, а фактически парализует некоторые контролирующие нервные сосуды. Совершенно очевидно, что если мы воздержимся от пищи на некото-

рое время, то громадная доля энергии, которая бы тратилась на новый процесс пищеварения, окажется высвобожденной для процесса очищения организма.

Мы теперь знаем, что во время голода ненужные и мертвые частицы всегда выбрасываются первыми, оставляя здоровые ткани для нормальных функций. Д-р Дюн очень метко выразился: "Отнимите пищу у больного, и вы начнете морить голодом не больного, а его болезнь". Гиппократ много столетий тому назад сказал: "Чем больше вы кормите больное место, тем более ухудшается его состояние".

Наше тело можно сравнить с цепью, которая только постольку крепка, поскольку крепко его слабейшее звено. Многие думают, что желудок является самым главным органом пищеварения. В действительности же все органы тела играют важную роль в процессе обмена вещества, называемом метаболизмом. В больном теле функции всех органов ослабляются. Как и в случае поломки всякой машины, для того, чтобы начать ее починку, машину нужно прежде всего остановить. Больное тело является испортившейся машиной. Не лучше ли довести ее работу до возможного минимума, пока происходит процесс починки-оздоровления? Этот процесс оздоровления требует от организма большой затраты энергии. Ясно, что всякая ненужная работа должна быть приостановлена настолько возможно, пока происходит процесс оздоровления.

Во время лихорадки мы наблюдаем, что разрушительный процесс гораздо сильнее созидательного. Несмотря на количество потребляемой пищи (больше пищи поступает — больше ее выбрасывается), видно ясно только одно: мы морим голодом пациента и отравляем а то же самое время. Самой грубой ошибкой считаю — кормить пациента, больного лихорадкой. Без сомнения, миллионы жизней были потеряны благодаря заблуждению, что больного надо усиленно кормить, чтобы "поддержать его силы". Во всех случаях повышения температуры мы должны помнить самое главное: не пытаться кормить больного.

КРОВЯНЫЕ ШАРИКИ

Интересно отметить, что во время голода улучшается качество крови и увеличивается число красных кровяных шариков. Зарегистрирован случай, когда после 12-дневного голодания у пациента количество красных кровяных шариков увеличилось на 2,5 миллиона на 1 кубический мм крови, количество гемоглобина поднялось с 50 до 85%, а количество белых кровяных шариков упало с излишне высокого до нормального. Другими словами, тут был типичный случай острого малокровия. Число красных кровяных шариков повысилось более, чем на 100%. Ясно, что и качество самой крови пропорционально улучшилось.

МУСКУЛЫ — СЕРДЦЕ — СИЛА

Нужно ожидать, что при продолжительном голоде будет происходить и потеря в объеме мускулов, хотя самая незначительная. Мы уже знаем, что больные ткани употребляются в топливо первыми, потом сгорает мускульный сахар (гликоген) и жиры, а затем уже следует сгорание протеннов. Потеря жира и части мускула никакого вреда здоровью не причинит.

Непродолжительный голод не влечет за собой уменьшения числа мускульных клеток. Уменьшение же мускулов в объеме объясняется сокращением мускульных клеток. Что же касается мышц сердца, то сокращение их не превышает 3% ибо питание организма всегда происходит за счет наименее важных клеток. Голодание снимает большую тяжесть со всех органов, так что им остается преодолевать гораздо меньше сопротивления для того, чтобы накачивать больше крови для внутреннего омывания всего тела. Пониженная напряженность помогает сердцу ремонтировать себя и усилить свою работу. Вот почему и функциональные и органические заболевания облегчаются и даже излечиваются голоданием. Одновременно и кровообращение улучшается в высокой степени.

ЖЕЛУДОК И КИШЕЧНИК

На голод сказывается прежде всего: они получают отдых. Они были перегружены работой, а во время голода отдыхают и восстанавливают свои силы. Ненормальные выделения удаляются из них, и когда голодовка окончена, их пищеварительная способность бывает сильно повышена. Язвы и воспаления заживают, и расширение желудка исчезает, т.к. он принимает свой нормальный объем и занимает свое нормальное место. Болезненные ощущения и ненормальный аппетит исчезают. Голод является самым быстрым и верным способом очищения от бактерий разложения в пищевом. В недельный срок тонкие кишки очищаются от бактериального сукна и становятся стерильными. Немного больше времени требуется для тяжелой очистки толстой кишки, хотя и в ней процесс разложения сильно сокращается.

Почему принято думать, что нужно набивать желудок пищей до отвала; что он должен работать все время, днем и ночью, чтобы не "ослабеть", оставшись на минуту пустым - это трудно понять. Желудок представляет собой мускульный мешок, и, как и все мускулы тела, он тоже нуждается в отдыхе. Основной закон природы требует отдыха для каждого органа. Единственный способ дать отдых желудку - это не принимать больше пищи. Немедленно же он приступает к ремонту клеток и исправлению повреждений, а затем оправляется от чрезмерной работы, ранее на него наваленной. Это приводит нас к другому важному соображению. Желудочный сок во время голода не выделяется. В нормальных условиях желудочный сок и особенно хлористо-водородная кислота, выделяются в пропорции не к количеству поступающей пищи, а сообразно с требованиями организма на вещества из данного химического ее состава. Например, принимая протейны (яйца, мясо и пр.), желудку нужно больше этой кислоты, чем понадобилось бы для освоения крахмалов (хлеб, макароны и пр.). Во время голода эти выделения совершенно прекращаются, и нет никакой опасности, что стенки желудка будут разъедены этой кислотой, или что в результате перепроизводства этой кислоты могут образоваться язвы.

В моей практике было много случаев, когда язвы желудка были излечены именно голодом. Как только последний кусочек пищи переварен, желудок освобождается, и начинается процесс ремонта, ибо отжившие клеточки заменяются новыми здоровыми, а чем заключается система оздоровления организма, самообновление.

Не следует смешивать диету фруктовых соков с голоданием. Я имею и

виду диеты апельсинового, виноградного или иного фруктового сока или однородной жидкости. Диета - не голодание. Диеты полезны в борьбе со многими болезнями, но в случаях желудочных заболеваний мы должны быть крайне осторожны и не вызывать выделений хлористо-водородной кислоты из стенок желудка такой фруктовой диетой.

При желудочных заболеваниях мы не должны ни в коем случае заменять свежую воду фруктовыми соками. Причина этого запрета проста. Когда фруктовые соки поступают в желудок, они вызывают обильное и постоянное выделение кислоты из стенок желудка, и т. к. и желудке при такой диете нет достаточного количества твердых веществ, особенно протеинов, которые должны быть растворены, то кислота может действовать непосредственно на слизистую оболочку, и через несколько дней может появиться язва. Во время голода желудок быстро перестает вообще выделять хлористо-водородную кислоту, и в результате через 2 дня или 4 всякое раздражение исчезает, и желудок получает возможность начать омоложение.

Ясно, почему в результате голодовки желудок сокращается до нормальных размеров и почему организм не требовал больше пищи, чем следовало. Сразу же процессы пищеварения и усвоения пищи улучшаются и потребность в пище падает, часто до половины прежней. Самым главным объяснением такого сокращения является то, что раньше желудок был ненормально расширен. Таким образом, голод возвращает желудку его первоначальную эластичность и нормальный размер.

Печень и почки также очищаются в процессе голодания, несмотря на то, что вначале на них возлагается двойная работа. Расширенная селезенка тоже возвращается к нормальным размерам. Нарывы и гнойники печени неоднократно были вылечены голодом. Это легко понять, потому что эти органы, на которых лежит главная работа по очистке организма, совершенно освобождаются от нее во время голода. Легкие тоже поправляются самым радикальным образом, т. к. на них лежит работа по очистке крови. Всякое накопление "отбросов" в легких исчезает в самом начале голода, и воздух получает свободный доступ к кровеносным сосудам. При бронхитах, воспалениях легочных полостей, простудах и гриппе даже непродолжительный голод дает блестящие результаты.

ИСТОЩЕНИЕ ПРИ ГОЛОДАНИИ

При голодании происходит потеря в весе, и разумеется, истощенному пациенту продолжительный голод не рекомендуется, хотя есть свидетельство поразительных результатов при лечении туберкулеза голодом. В Швейцарии, где так много санаториев, которые гордятся результатами лечения голодом, зарегистрировано много таких случаев.

Мозговая и нервная системы заметно поправляются при голоде, что было неоднократно доказано научными исследованиями. Надо видеть самому, чтобы поверить поразительным результатам голодания в случаях ментальных и нервных болезней. Паралич и даже психоз были излечены голодом. У большинства пациентов мышление проясняется. Это объясняется тем, что вторгнувшиеся "цементирующие" частицы изгоняются из нервных тканей путем процесса очищения. В результате большее количество кле-

точного мозга сопрягается с очищенной кровью и производит больше мозговой энергии. Мышление обостряется и появляется склонность к оптимизму.

Д-р А. Хзг так говорит об этом действии голода: "Я верю, что в результате рациональной, естественной и правильной голодовки, дающей лучшее кровообращение в громадной машине человеческого организма, мы не только освободимся от бремена болезни, но мы также разовьем наши душевные, духовные и умственные способности, а также повысим нашу мораль и здоровое суждение, которые в будущем будут так же отличаться от прежних, как свет от тьмы. И я верю, что в будущем будет больше согласия, силы, красоты, бескорыстия, любви; одним словом, будет больше истины и здравого смысла".

Все умственные способности обостряются от голода. Внимание, ассоциация идей и способность мышления улучшаются. Память укрепляется, синтез, интуиция и другие духовные способности усиливаются. Это, между прочим, является самым ценным даром голода. Мы не только становимся физически крепкими, не только освобождаем наше тело от болезни; голод поможет нам жить в созвучии с вибрациями мира Божьего. Поэтому голод приближает нас к Богу. В Евангелии сказано: когда ученики спросили Христа, что они должны делать, чтобы получить Его силу, он ответил, что этого можно достигнуть только путем поста и молитв.

Благотворное влияние голода на наши пять чувств удивительно. Часто зрение необычайно обостряется. Я лично наблюдал несколько случаев катаракта, который буквально растворился во время голода. Голодом были совершенно излечены многие случаи глухоты. Может быть, это объясняется тем, что евстафиева труба, соединяющая внутреннее ухо с носовой полостью, тоже освобождается от загрязнений и катаральных отложений. Обоняние сильно обостряется, о чем свидетельствуют многие мои пациенты. Приглушенные вкусовые ощущения становятся в большинстве случаев обостренными.

Ничто в мире так не восстановит острый слух, как продолжительный голод. Короче говоря, мы можем суммировать, что зрение улучшается, обоняние возвращается, удовольствие вкусовых ощущений восстанавливается, как и удовольствие от обостренного слуха.

Возникает вопрос: в чем же заключается механизм этого процесса, который является результатом голода? Что же, собственно говоря, происходит в организме человека? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, возвратимся к самому организму. Мы уже знаем, что наша кровеносная система самым сложным образом переплетена со всеми органами и тянется на 1500 км, проникая во все ткани настолько плотно, что если удалить все наши мышцы, кости и нервную систему, то мы все-таки получим в остатке полный контур тела человека. Нужно помнить, что эта замечательная сеть вен, артерий и лимфатических сосудов утончается в бесконечное количество мельчайших капиллярных сосудов, видимых только под микроскопом. Микроскопическое исследование показывает, что самые мелкие капилляры, в свою очередь, бесконечно разветвляются на еще более мелкие и окружены меридианами мельчайшей сети — нервов. Эта-то сеть нервов и контролирует мельчайшие кровеносные сосуды.

Жизненный процесс обмена веществ, называемый метаболизмом, состо-

ит в циркуляции основной жидкости, такой процесс ни в какой степени не влияет на форму капиллярных сосудов. Но такая абсолютно чистая жидкость теоретически может находиться и абсолютно здоровом теле. Это, конечно, не относится к телу современного человека. Наш образ жизни, потребление консервов, суррогатов и наше невежество в вопросах правильного питания дают совершенно другую картину. Нужные нам минералы, витамины и энзимы не изобилуют в нашей пище, а всякие химические вещества, прибавленные для ее сохранения, представляют собой яды для окислительного процесса пищеварения. Таким образом, становится явным, что избыток крахмала в лимфатической плазме постепенно затрудняет правильные функции околотитовидных желез, контролирующих подачу кальция в плазму. Клеточки кальция собираются в сгустки и засоряют капиллярную сеть. Со временем эти сгустки в соединении с раздражителями (лекарства, кофе, никотин и др. наркотики) образуют отложения на стенках лимфатических каналов. В результате такого накопления получается высокое давление крови, затверждение артерий и то состояние изнашивания организма, которое мы называем старостью.

Вопрос теперь в том, как избежать этого цементирующего материала, отложение которого на внутренней поверхности сосудов останавливает питание сосудов и всего организма. Есть один только путь, не совсем приятный — голод. Возможно, что в этом проявляется мудрость Творца, что всякое благо нужно заслужить. Может быть, идея "борьбы за существование" тоже сюда относится?

Я глубоко убежден, что это так. Здоровье не продается в лавочке. Если бы продавалось, то богатые люди поражали бы нас своим пышным здоровьем. Дело обстоит иначе.

Вернемся к восстановлению нормальной деятельности наших пяти органов чувств. Мы знаем, что сильный поток крови постепенно засоряется и выделяет известковые отложения на стенках кровеносных сосудов. Мы знаем, что нет лекарства, которое могло бы остановить этот процесс, цементирующий сосуды.

Голод и только голод исполняет эту работу. Мы должны помнить что поток крови разносит питание по всему телу. Во время голода питание прекращается. Кровь и плазма инстинктивно регулируют процесс питания. Это-то и является благословением Божиим. Возможно, что с потерей сознательного инстинкта человек выжил только благодаря бессознательному. Этот инстинктивный процесс и заставляет клеточки моментально реорганизовать процесс питания для сохранения жизни.

Кровяной поток сейчас же должен найти другой источник снабжения горючим для процесса окисления. Он начинает "разрабатывать залежи" цемента, добывая его в внутренних стенах сосудов. В случаях высокого давления крови я с большим удовольствием констатировал у пациента понижение артериального давления до нормального, иногда всего в недельный срок голодания. Удаляемые потоком крови частицы идут на топливо или отбрасываются. Процесс очищения не ограничивается только кровообращением, хотя жидкая плазма проникает во все мельчайшие клеточки тела. Вот почему взбухшие суставы человека, страдающего суставным ревматизмом, уменьшаются, и вспухшие железы приобретают первоначальную эластичность, избавляясь от цементирующих и жировых покровов.

В результате растворения засорений глазные мышцы и зрительные нервы освобождаются для нормальных функций. Вот почему так много зарегистрировано случаев, когда после 10-дневного голода пациент не нуждался больше в очках, которыми пользовался годами. Нужно иметь в виду, что зрительные восприятия глаза принимаются в большом мозгу, в тыльной его части. Засорение в мозговых тканях происходит так же, как и в кровеносных сосудах. И таким же благотворным действием в клеточках мозга является очистительный процесс голода, результатом чего является обострение зрения.

Из предыдущего мы знаем, что в отравленном организме носовые перепонки служат для выбрасывания вредных для организма веществ. Голод освобождает от загрязнения все ткани обонятельной слизистой оболочки, обонятельных волосков и тканей и обостряет самым эффективным образом обоняние. То же самое происходит и с органами синуса.

То же самое происходит и в ухе человека. Звук воспринимается барабанной перепонкой и передается путем вибрации там маленьким косточкам позади нее. Известные отложения в больном организме цементируют этот деликатный аппарат и замедляют взаимодействие перепонки и самих косточек (стремя, молот и наковальня, которые перестают действовать в унисон. Во внутреннем ухе улитка, полукружные каналы и особенно пузырек преддверья еще больше страдают от засорения, и человек перестает слышать. Голод возвращает ухо в нормальное состояние. Зацементированные полукруглые каналы дают себя знать, когда человек теряет чувство равновесия.

Голод не только самым эффективным способом восстанавливает физическое здоровье, но и обостряет четкость и ясность мышления. Я так ярко помню наш разговор с великим Бернардом Шоу за несколько месяцев до его кончины. Вряд ли кто станет оспаривать, что Бернард Шоу был одним из выдающихся умов нашего века, он сам приписывал успех своих литературных трудов благотворному влиянию голода. Ведь так ясно, что по удалении засорения вокруг серого мозгового вещества, усиленная подача крови к мозгу проясняет мышление.

И, наконец, голод необходим для нашего духовного и душевного здоровья. Мне это стало ясно, когда я посетил Учителей Востока и Индии. Голодание требуется от всех аспирантов на посвящение в высшую степень. Это еще раз доказывает, что голодание — лучший путь к контролю над телом и душой. Некоторые степени посвящения требуют 50-дневного поста.

Голод приближает человека к Богу. Может быть поэтому люди племени Хундза в северной Индии известны своим душевным равновесием и спокойствием. Они голодают по несколько недель подряд в июле месяце, пока не настанет время сбора урожая. Они живут в полной гармонии с вибрациями природы и не знают страха, болезней и сумасшествия; они бодрь и приветливы.

Разрушительные привычки цивилизованного человека: жадность, ненависть, зависть... — все они покажутся совершенно в другом свете человеку, освеженному голодом. Эти дары доступны каждому. Лучший мир, населенный лучшими людьми, так легко осуществим! Отдадим должное голоду.

ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ГОЛОДАНИИ

Каждый, решившийся на лечение себя голодом, должен знать о нескольких предосторожностях. В некоторых случаях естественной реакцией голодающего в первый раз бывает страх. Тучный пациент, пропустивший несколько обедов, часто жалуется на головную боль и подавленное состояние духа. Иногда это сопровождается тошнотой и головокружением, раздражительностью. Все это надо знать заранее, чтобы противопоставить этому решительность и силу воли.

Благотворное перерождение всего человека физическое и духовное, так велико, что было бы неразумным бояться небольших затруднений на пути к нему. Совершается сложнейший процесс и миллиард клеточек, очищающий все тело и возвышающий человека как духовное существо. Голодающий испытывает общение с вибрацией высшего порядка, какую испытывали гиганты духа в прошлом.

Ничто в жизни не дается даром, каждое "достижение" покупается определенной ценой. В этом непреложный закон природы. Без твердого желания и затраты усилий было бы неразумно ожидать больших благотворных результатов. И победа над привычкой обжорства и комфорта необходима для их достижения.

В Писании сказано, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, и голод является лучшим способом, чтобы пробудить в человеке эту "искру Божью". Христос доказал истинность, воскрешая мертвых и исцеляя больных.

Нужно ли напрягать наше воображение, чтобы понять всю громадную пользу голодания? Конечно, гораздо легче жаловаться и находить предлоги, почему мы "не можем" голодать. В борьбе побеждает более сильный, а в человеке постоянно борются два начала — Божеское и человеческое.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Почему так мало докторов предписывает лечение голодом? — Отчасти потому, что голодание недостаточно и не всесторонне изучено, а отчасти потому, что доктор боится, что голод является слишком сильным потрясением для больного организма.

Клинический опыт показал, что доктору нетрудно убедить пациента в необходимости голодания. Нужно только, чтобы он всесторонне понял этот сложный процесс. Нужно, чтобы он верил, что только голод может освободить его от недуга и вернуть его здоровье в цветущее состояние. Нужно также, чтобы пациент знал и об умственном и духовном здоровье, которое следует за физическим.

Если пациент был тучен, весил слишком много и страдал от несварения желудка, сперва прописывали 3 дневную диету фруктовый или овощных соков, чтобы освободить его кишечник. В эти 3 дня прописывали слабительное рано утром. После этого пациент пьет апельсиновый, помидорный, ананасовый, виноградный или другой фруктовый или овощной сок. В случае небольшого воспаления кишечника фруктовый сок нужно заменить только овощным.

После 3 дней жидкой диеты пациент может перейти к голоданию и ему разрешается пить только чистую, свежую, "мягкую" воду, свободную от хлора (т. е. не городскую воду из водопровода). Дистиллированная вода в количестве 7—8 стаканов в день рекомендуется, но только по мере жажды у пациента.

Такой пост продолжается от 3 до 50 дней, смотря по состоянию здоровья пациента, роду болезни и в зависимости от обстановки, его окружающей. В связи с этим необходимо предупреждение: продолжительный голод должен происходить под наблюдением врача, знакомого с этим процессом и всеми его симптомами. Вот почему голодание дольше 10-дневного должно происходить не в домашней обстановке, а в специальном учреждении. Голодающий должен воздержаться от утомляющей активности, отдыхать и держать ноги в тепле. Усиленно рекомендуется днем лежать на солнце,* что помогает процессу очищения через поры кожи.

В серьезных случаях сердечных заболеваний и при болезни почек у пациента наблюдается прилив воды к ногам, вокруг надпяточной кости и лодыжек, что заметно по опухолкам вокруг суставов конечностей. В таких случаях "сырой" мед (нагретый), принятый внутрь с водой, очень помогает деятельности сердца и почек преодолеть это затруднение. В таких случаях мед является единственной пищей, разрешенной, кроме воды, пациенту в размере от 2 и до 10 столовых ложек в день.

В большинстве случаев такое скопление воды в конечностях наблюдается у пациентов, которые были подвергнуты лечению лекарствами и вприскиваниями. К таким медикаментам относятся дигиталис, адреналин и др., что очень затрудняет лечение. Я убедился, что организм таких пациентов нужно постепенно отучить от привычки лечиться лекарствами, на что иногда уходит несколько месяцев. Во всех случаях практика показала, что при голодании очень помогает правильный массаж и "разминание" суставов по системе хиропрактики.

Многочисленные примеры из практики доказывают правильность изложенного выше. Интересный случай из своей практики я хочу привести ниже.

52-летний мужчина, исхудалый и истощенный постоянной кровавой рвотой и кровавым стулом. Кровь темно-красная и видом напоминает кофейную гущу — указание на язву, кровоточащую толстую кишку.

В таком состоянии голодание можно начать только после того, как кровоизлияние остановлено и восстановлено производство новой крови. Пациент начал жидкую диету на морковном соке. Вдобавок ему давали молоко из сырых индийских орехов "кашшо", подсолнуха и кунжута с медом. Поразительно, что кровотечение остановилось на 2-й же день этой диеты и через 10 дней не было никакой боли. Дальше следовала специальная диета, куда, кроме морковного сока, входила и твердая пища в виде моркови, орехов, лука, яиц и миндаля. Кунжутное семя, миндаль, протертая морковь и орехи, в равных порциях измельченные, смешивались с сырыми яйцами и образовывали однородную массу, которая слегка запекалась в духовке. Эта диета продолжалась еще месяц, и пациент выздоровел, прибавив в весе 5,8 кг.

* Если это позволяет здоровье пациента (от составителя).

**ДИЕТОТЕРАПИЯ
(И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ)**

Многие опасности окружают здоровье человека в повседневной его жизни. Одна из этих опасностей, если не главная, это неправильное питание. Поэтому правильная организация питания является одним из важнейших условий здорового образа жизни.

Знаменитый диетолог Эвенштейн З. М. в своей книге "Популярная диетология" говорит: "Пищевой рацион человека практически постоянно должен содержать более шестисот веществ, или, как их сейчас принято называть — нутриентов. Примерно 96% из них обладают теми или иными лечебными свойствами. От того, сколько их в продукте, и каких пропорциях они сочетаются, и зависит его диетическое действие".

Для правильного питания и, следовательно, чтобы правильно использовать эти свойства продуктов, надо знать их химический состав, пищевую ценность и правильную обработку продуктов (приготовление еды), и правильно составлять рацион питания, соблюдая благоприятный для течения болезней и профилактики режим питания.

Для диетотерапии необходимо грамотно приготовить пищу, поскольку она является неотъемлемой частью комплексного лечения многих заболеваний.

В последние годы в ходу многие диеты разных авторов, разные направления, среди которых находим полезные предложения, но и часто неправильное сочетание пищи, а также бесполезные рационы, даже иногда вредные для той или иной болезни.

Поэтому рекомендуются специально разработанные, апробированные и рекомендованные в диетологии пищевые рационы.

Министерством здравоохранения СССР утверждена групповая номерная система диет, обязательная для всех лечебно-профилактических учреждений. Эти диеты разработаны институтом питания АМН СССР.

Ниже читатель найдет наиболее распространенные диеты*.

Диеты № 1, 1а, 1б, 1д.

Это специальное лечебное и противорецидивное питание при болезнях желудка, иногда — тонкого кишечника. В зависимости от остроты и тяжести болезненного процесса оно включает жидкую, полужидкую или пюреобразную протертую еду, которая должна обеспечивать механическое, химическое и термическое щажение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

По набору продуктов (пшеничный хлеб, сухари, вермишель, нежирное мясо, нежирная рыба, овощи, кроме капусты и бобовых, крупы, протертые или цельные, куриное яйцо, молоко, сливки, нежирный творог, некислая сметана, слабый чай, плодовоовощные соки, несоленое сливочное масло) эти диеты полноценны. Однако и них ограничиваются пищевые волокна,

* Эвенштейн З. М. "Популярная диетология", Москва, 1991.

экстрактивные вещества мяса, рыбы, грибов. При обострении заболеваний необходимо также ограничить употребление поваренной соли, питание частое, небольшими порциями. По наиболее строгим диетам № 1а и 1б отварное мясо лучше давать только протертым.

Кулинарная обработка — все блюда отварные или приготовленные на пару.

Диета № 2.

Назначается несколько реже, чем диеты № 1, 1а, 1б, 1д, главным образом для нормализации моторной и секреторной функции желудочно-кишечного тракта при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью. В частности, она показана при выраженных бродильных процессах в кишечнике и при запорах. Это также физиологически полноценное питание, но с ограничением в рационе цельного молока, поваренной соли, пряностей, грубых пищевых волокон. Отварное мясо перед употреблением можно слегка обжарить. Жареные котлеты из говядины готовят без панировки. И все же предпочтительнее пюреобразные и протертые блюда, что и является главным в кулинарной обработке.

Диеты № 4, 4б, 4в.

Эти диеты преимущественно показаны при заболеваниях тонкого кишечника — энтеритах, когда необходимо обеспечить щажение его слизистой оболочки. Такое питание содержит сравнительно мало углеводов и соответственно менее калорийно. Грубые растительные волокна, цельное молоко, первые и вторые блюда на молоке, поваренная соль и пряности в зависимости от состояния больного существенно ограничиваются или исключаются вовсе. Кроме того, исключаются также очень холодные и горячие блюда. По набору продуктов диета № 4 — полноценная.

Кулинарная обработка — все блюда отварные или паровые.

Диета № 5, 5а, 5п.

Все они — эффективное средство в лечении многих заболеваний печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, толстого кишечника. Эти диеты сдерживают ожирение печени (липоотрапная функция), способствуя одновременно накоплению в ней гликогена, и вместе с этим стимулируют желчевыделение, перистальтику кишечника. Отличают их также достаточное количество белков, пищевых волокон, жидкости и легкоусвояемых углеводов. А вот содержание тугоплавких жиров, продуктов, богатых холестерином, поваренной соли и азотистых экстрактивных веществ в этих диетах ограничивается, и даже существенно переохлажденная еда нежелательна.

Кулинарная обработка — все блюда отварные или паровые. Первые блюда — вегетарианские или на очень слабых бульонах.

Диеты № 7, 7у, 10, 10н, 10а.

Как правило, это особо строгие диеты, которые должны обеспечивать щажение сердечно-сосудистой системы, почек, и вместе с этим всех органов пищеварения. Они способствуют созданию и поддержанию благоприятных условий для кровообращения, удаления из организма

недоокисленных продуктов обмена веществ и азотных шлаков. Считают, они также полезны для профилактики воспалительных процессов.

Главное требование ко всем этим диетам — отсутствие или резкое ограничение на тот или иной период веществ, которые возбуждают нервную систему и способствуют удержанию в организме лишней жидкости. Поэтому они не включают соленья, копчености, маринады, натуральный кофе, шоколад, какао, крепкий чай, грибы, жареные вторые блюда и первые блюда на мясных, рыбных и грибных отварах, колбасные изделия, капусту белокочанную, бобовые овощи, газированные воды. Строгость и длительность таких ограничений зависят от характера, тяжести заболевания, возраста, общего состояния больного и во всех случаях регламентируются лечащим врачом. Полезна курага, урюк, изюм, яблоки, черная смородина, некрепкий зеленый чай с молоком.

Наиболее строгая из этих диет — № 7у, которая назначается при тяжелых формах почечной недостаточности и предусматривает исключение из рациона не только соли, но и белковых продуктов.

Кулинарная обработка — все блюда отварные, паровые и готовятся малосолеными или несолеными вовсе. Первые блюда — только вегетарианские или молочные.

Диета № 8 и 8а.

Они в равной мере и лечебные, и профилактические, поскольку способствуют снижению избыточной массы тела. Чтобы именно так воздействовать на обмен веществ, эти диеты бедны углеводами, содержат меньше, чем обычно, жиров и несколько больше физиологической нормы белков. Поваренная соль, жидкость, пряности, азотосодержащие экстрактивные вещества мяса, рыбы, грибов, копчености резко ограничиваются. Калорийность суточного рациона диеты № 8 обычно не должна превышать 1900 ккал, но только с разрешения врача.

Кулинарная обработка — в зависимости от общего состояния и наличия сопутствующих заболеваний — обычная или вторые блюда готовятся отварными на пару.

Диета № 9, 9а.

По набору продуктов и кулинарной обработке они мало чем отличаются от диеты № 8, так как в основном предназначены для больных сахарным диабетом. При этом заболевании вреден избыток углеводов, жиров, поваренной соли и азотосодержащих экстрактивных веществ. Легкоусвояемые углеводы, и в первую очередь сахара, из рациона исключаются.

Диета № 15.

В больницах ее также называют общим столом. Это полноценное питание для многих выздоравливающих больных, например, после инфекционных заболеваний, пневмонии, неврозов, перенесенных повреждений и травм опорно-двигательного аппарата. Назначается такая диета и как переходное питание от больничного к домашнему.

Кулинарная обработка — обычная, но желательно с ограничением поваренной соли, жареных мясных и рыбных блюд, колбасных изделий, копченостей, специй.

Существует еще много узкоспециализированных лечебно-профилактических, лечебно-реабилитационных диет. Одни из них входят в комплекс лечебных мероприятий по выхаживанию тяжелых больных. Другие — предназначаются для профилактики и лечения какого-то одного заболевания или его осложнений.

Одна из таких диет — диета Ф. К. Карелля. Основана она на свойствах снятого коровьего молока предупреждать и устранять отеки при недостаточности сердечно-сосудистой системы.

Профессор В. М. Дильман совсем недавно предложил питание, способное предупреждать злокачественные новообразования. Так например, установлено, что если у кого-либо в роду из женщин был рак молочной железы, то всем девочкам из этой семьи следует опасаться ожирения. Кроме того, им до полового созревания показаны ежедневно достаточно большие физические нагрузки. Если же кто-то из ближайших родственников лечился по поводу рака желудка, кишечника, печени, то пищевой рацион остальных членов этой семьи должен быть больше, чем обычно, содержать витаминов А, С и пищевых волокон.

Большинство людей, которым показано после перенесенной болезни реабилитационное диетическое питание или же питание, имеющее целью предупредить осложнение излеченной болезни, как правило, завтракают и ужинают дома. Следовательно, основная нагрузка на диетические столовые в обеденное время. Поэтому именно в обед в каждой из них должен быть в первую очередь набор блюд по диетам № 1, 5 и 9.

В диетических столовых промышленных предприятий для рабочих с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта считается также целесообразным готовить диету № 2.

Пищевая биологическая ценность и калорийность диетических рационов в столовых промышленных предприятий, разумеется, должны соответствовать энергетическим затратам и нервно-эмоциональным нагрузкам на рабочих местах. Так, по рекомендациям Института питания АМН СССР калорийность основного варианта унифицированной диеты (по схеме диеты № 2) для больных гастроэнтерологического профиля составляет 3455 ккал, а калорийность дневного рациона щадящего варианта (по схеме диеты № 1) — 3499 ккал.

Применение унифицированной диеты, по мнению специалистов, сокращает сроки психической медико-биологической адаптации рабочих и служащих к диетическому питанию, в целом повышает эффективность комплекса мер, обеспечивающих полное выздоровление человека, для которого это питание организуется столовой.

Только диету № 5 надо готовить несоленой, тогда она будет отвечать и требованиям диеты № 10.

Чтобы диета № 9 соответствовала требованиям диеты № 8, она должна включать паровые и отварные блюда, а часть первых блюд должна готовиться не на мясных, рыбных и грибных отварах. Кроме того, все первые и вторые блюда должны быть недосоленными.

Теперь несколько подробнее рассмотрим диеты № 1, 5 и 9.

Оптимальная пищевая ценность диеты № 1 (в г): белков — 100, жиров — 100, углеводов — 400—450. Калорийность рациона — 2030—3130

ккал. Поваренная соль — 10—12 г, кальций — 0,8, фосфор — 1,6, железо — 15 мг, магний — 0,5 г. Хлеб — вчерашней выпечки или подсушенный.

Супы: молочный с протертой крупой; пюреобразные из моркови, картофеля; молочный с вермишелью. Мука для заправки супа с жирами не пассеруется.

Вторые блюда из мяса и птицы: сваренные или приготовленные на пару котлеты из говядины (нежирной, нежильистой и нестарой); бефстроганов из отварной такой же говядины; отварная курица.

Вторые рыбные блюда: отварные судак, окунь, треска, серебристый кек; паровые котлеты из тех же рыб.

Гарниры и вторые блюда из овощей: пудинги из протертых овощей; пюре из отварных ранник кабачков, тыквы, из картофеля с морковью.

Вторые блюда из круп: каша, пудинги, вермишель, лапша отварные. Крупы (кроме манной) перед варкой измельчаются.

Яйцо куриное всмятку или омлет паровой.

Из молочных продуктов используются молоко цельное пастеризованное, молоко сукое, сгущенное, сливки, свежая не кислая сметана, свежий не кислый протертый творог.

Соусы разрешены только молочный или молочно-яичный.

Из плодов а рацион акляются спелые сладкие яблоки, груши, земляника, черешня, бананы и цельные доброкачественные соки из сладких плодов.

Яблоки — предпочтительнее запеченные, а если свежие, то без кожуры.

Третьи блюда: кисели, муссы, желе, в том числе и молочные. Чай — слабый с молоком или сливками. Масло сливочное несоленое, подсолнечное, обязательно все свежее.

Оптимальная пищевая ценность диеты № 5 (в г): белки — 90—100, жиры — 80—100, углеводы — 350—400. Калорийность суточного рациона — 2800—3000 ккал. Поваренная соль 5—10 г. Кальций — 0,8 г, фосфор — 1,6 г, магний — 0,5 г, железо — 15 мг. Витамины: С — 100 мг, В₁ — 4, В₂ — 4, РР — 15, А — 2 мг (без учета провитамина А).

Первые блюда: вегетарианские супы с крупой, овощами, макаронными изделиями. Мука и овощи для первых блюд не пассеруются.

Для приготовления вторых блюд используются: говядина нежирная, нежильстая, нестарая; кролик, нежирная курица, индейка, рыба с содержанием не более 5% жира (треска, пресноводный и морской окунь, навага, корюшка, серебристый кек, щука, судак). Мясные блюда предпочтительнее порционные, отварные, как и рыбные. Но допускаются и паровые котлеты, кнели, фрикадельки.

Овощи для гарниров: практически все варенные, в том числе и лук репчатый. Можно закуска из тертой или шинкованной моркови со сметаной или растительным маслом, свежий огурец, мелкошинкованную белокочанную капусту, винегреты без уксуса и свежего лука.

Блюда и гарниры из круп: любые каши на молоке.

Яйцо куриное всмятку — одно а день или омлет из одного яйца.

Все спелые и сладкие плоды и цельные соки из них.

Молоко и практически все молокопродукты, кроме брынзы, соленых сыров, кислых сметаны и творога.

Соусы ко вторым блюдам только молочные, сметанные, на овощных отварах и фруктово-ягодные подливки. Мука для соусов с маслом не пассеруется.

Чай обычной заварки, с молоком и со сливками. Какао противопоказано, кофе натуральный — очень слабый или исключается совсем.

Масло сливочное несоленое, масло подсолнечное (все обязательно свежее).

Хлеб пшеничный из муки второго сорта, хлеб ржаной из муки сеяной, хлеб из муки обойного помола — все вчерашнее или подсушенное. Разрешена в небольшом количестве несдобная выпечка. Блины и оладьи не рекомендуются. Специи не показаны.

Оптимальная пищевая ценность диеты № 9 (в г): белки — 100, жиры — 80, углеводы — до 300. Максимальная калорийность суточного рациона — 2200 ккал. Как уже упоминалось, основное ее назначение — способствовать нормализации углеводного обмена при лечении сахарного диабета с использованием или без применения препаратов инсулина. Нормализация углеводного обмена является также одной из главных задач в профилактике и лечении элементарного ожирения. Поэтому важнейшее отличие диеты № 9 — исключение сахарозы и замена ее (с разрешения врача) небольшими количествами натурального меда или чистой фруктозы. Очень часто приходится включать в эту диету сахарозаменители — ксилит или сорбит. Избыток поваренной соли для больных сахарным диабетом также нежелателен, как и при ожирении. Поэтому вся еда по диете № 9 должна быть недосолена. В остальном диета № 9 включает разнообразные продукты животного и растительного происхождения. Только манную и рисовую каши употреблять не рекомендуется.

Если используются препараты инсулина, то в завтрак и ужин включают рекомендованные врачом определенные количества гречневой, овсяной каши или картофельно-морковного пюре.

Первые блюда и гарниры ко вторым мясным, рыбным блюдам в обед готовятся из отварной моркови, капусты, брюквы, кабачков, зеленого горошка, иногда — репы.

Хлеб к диете № 9 лучше подавать ржаной или из пшеничной муки 2-го сорта. Тот и другой — вчерашний. Больше 275 г хлеба включать в рацион не рекомендуется.

В 1981 г. доктор медицинских наук В. А. Оленева предложила следующее меню по диете № 8, которое вполне подходит и для питания больного сахарным диабетом. Особенно, если у этого больного избыточная масса тела (табл. А).

Таблица А

Наименование блюд	Выход готового блюда, г	Пищевая ценность блюд, г			Калорийность, ккал
		белки	жиры	углеводы	
1	2	3	4	5	6
Первый завтрак Творог кальцини- рованный	100	13.8	11.8	8.8	174.6

1	2	3	4	5	6
Морковь тушеная	200	4.2	11.9	16.4	189.5
Кофе суррогат без сахара или чай с молоком	200	1.4	1.7	2.2	33.7
Второй завтрак					
Салат из свежей капусты со сметаной без соли	155/15	2.6	5.6	8.4	94.4
Обед					
Щи вегетарианские со сметаной без соли	200/100	1.8	6.8	9.5	106.2
Говядина тощая отварная	90	13.6	8.9	-	134.5
Зеленый горошек	50	1.3	0.1	3.4	19.7
Яблоко свежее	100	0.3	-	11.5	47.2
Полдник					
Творог кальцинированный	100	13.8	11.1	8.8	174.6
Отвар шиповника без сахара	180				
Ужин					
Треска (морской окунь, серебрястый хек, судак, щука) отварная без соли	100	16.0	4.6	0.1	105.8
Рагу из овощей	125	2.6	6.8	15.2	130.4
За два часа до ночного отдыха					
Кефир	180	5.0	6.3	8.1	109.1
Хлеб ржаной	150	8.4	1.7	69.9	328.5
Хлеба ржаного к столу на весь день	50	2.7	0.6	23.3	109.5
Всего		87.8	70.5	197.1	1557.7

К сожалению, не всегда есть возможность строго и систематически следовать в домашних условиях диете № 8. Как исключение в таких случаях можно снизить объем привычного питания. Если в целом уменьшить массу блюд завтрака, обеда, ужина на четверть, треть, а иногда и наполовину, то ожидаемое действие редуцированного таким образом питания не сразу, но обязательно скажется. Только надо набраться терпения, быть убежденным в необходимости "сбросить" лишние килограммы и верить, что это обязательно случится. Некоторые диетологи, психологи считают, что отказаться от больших порций еды помогают неглубокие тарелки для первых блюд, небольшие тарелки для вторых

блюды, небольшие стаканы, чашки. Кроме того, лучше взамен столовых ложек использовать десертные, а хлеб нарезать тончайшими ломтиками. Конечно, эти ухищрения не лишены здравого смысла, но только на них полагаться желающим похудеть, пожалуй, не стоит.

Было бы несправедливо не упомянуть мнения Оганяна М. В. о роли питания в жизни человека и его здоровье с точки зрения современной науки. Может быть специалист диетолог или просто читатель найдут ряд противоречий между диетой, предложенной институтом питания АМН СССР, и высказываниями Оганяна М. В. в своей лекции*, прочтенной в клубе им. Горбунова в июле 1982 г. Необходимо подчеркнуть, что много интересного и поучительного найдем и упомянутой лекции, которая приводится с некоторым сокращением.

РОЛЬ ПИТАНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Роль питания в жизни человека огромна.

Биохимия питания связана со здоровьем людей. Примеры для подтверждения этого многочисленны.

2000 лет назад ГИППОКРАТ определял медицину как искусство подражать лечебному воздействию природы и пищевые вещества называл нашими лекарствами, а лекарства — нашей пищей.

От качества продуктов зависит весь комплекс метаболизма в организме, весь комплекс обмена веществ.

Аутотрофия — наука о правильном питании.

Организм и пища — одна система. Нельзя воздействовать на одно звено системы, если болен весь организм.

Пища — независимая переменная величина, а организм — функция от независимой переменной. Пищу мы можем менять по желанию, а состояние организма меняется строго в зависимости от пищи. Тип реакций, происходящих в организме, зависит от того, каковы исходные продукты, входящие в реакции. Каждый продукт питания обладает фармакологической активностью. Но активность бывает разная: положительная (полезная) и отрицательная (вредная).

С 1948 года и течение 25 лет в столице, в НИИ психиатрии, существовало отделение лечебного голодания, возглавляемое Ю. С. НИКОЛАЕВЫМ. Сейчас проф. Ю. С. Николаев — руководитель Отдела разгрузочной диетотерапии.

В 1975—1976 годах состоялась конференция по лечению методами разгрузочной диетологии (РДТ). В 1978 г. Министерства здравоохранения СССР и РСФСР издали методические письма по проведению РДТ.

Во второй половине жизни снижается чувствительность гипоталамического центра к перееданию. Переедание вреднее, чем неправильное питание, и само по себе является следствием заплакованности организма из-за неправильного питания.

Регулятор биохимических процессов — пища. Из-за нарушения качества пищи нарушается обмен веществ. Нарушения функциональные

* Оганян М. В. "Биохимия, биоритмы и питание". Лекция, прочтенная в клубе им. Горбунова с добавлением информации из ее лекции в клубе "Факел", Дворец культуры АЗЛК и филиале Московского городского клуба туристов в г. Москве в июне 1982 года.

ведут к нарушениям морфологическим, а последние, закрепившись в поколениях, переходят в генетические, наследственные. Человеку известны 5 видов энергии: биохимическая, физическая, химическая, тепловая и механическая. Самые качественные виды энергии — первые два.

Мертвое от живого отличается понижением всех видов энергии и сведением их до энтропии, то есть до тепловой энергии, которая рассеивается в пространстве.

Живое насыщено экзэнтропией. Растения в своих белках, жирах и углеводах содержат экзэнтропийную солнечную энергию.

Белка растений распадаются до аминокислот, идущих на построение наших собственных белков; жиры — на жирные кислоты; углеводы — на моносахариды, накапливающие макроэргические связи.

Пищеварение совершается неправильно, если человек питается животной, вареной и смешанной пищей.

Мы не можем использовать солнечную энергию непосредственно. Мы используем не тепловую, а химическую и фотохимическую энергию растений. Получая энергию непосредственно от растений, мы приобретаем энергию на порядок выше, чем энергия, взятая от животных, съевших растения раньше нас. Хищников мы в расчет не принимаем, так как практически их не едим. Макроэргические соединения растений, чтобы усвоиться животными, должны распасться и окислиться, то есть претерпеть длительные превращения. Только тогда медленно, квантами, выделяется энергия, необходимая животному.

Структура сырой растительной пищи — носитель фотохимической энергии. Разрушая варкой и дроблением структуру пищи, мы обеспечиваем энергетику, которую несет эта структура.

Наше питание не обосновано научно, а обусловлено нашими извращенными вкусами и привычками, унаследованными от недалеких предков. Но мы забываем, что очень давно человек питался по-другому.

В ледниковый период человек вынужден был перейти почти на абсолютную мясную пищу. Возник ряд ферментативных надстроек для обезвреживания мясных продуктов. После того как ледник отступил, возможности питания резко расширились, но привычка к мясу закрепилась.

С употреблением мясной пищи началось систематическое перераздражение рецепторов и появились вкусовые извращения. Мясо стало матерью всех наркоманий.

Живая или сырая растительная пища содержит минеральные ионы, микроэлементы, органические кислоты, витамины и другие соединения. В вареной пище ионизированные минеральные вещества выпадают в осадок. Ионы кальция, например, без которых невозможна работа сердца, выпадают в осадок в виде солей кальция. В результате развиваются геморрой, васкулит, полиартрит, остеопороз и т. д.

Вареная пища теряет витамины, выщелачивается и становится пресной, — поэтому нуждается в добавлении соли и пряностей.

Энзиматическое, ферментативное пищеварение и переваривание продуктов в желудочно-кишечном тракте — разные понятия и процессы.

При варке распадаются 3 структуры продуктов: четвертичная, третичная и вторичная, несущие биологическую энергию. Остается мертвая первичная аминокислотная цепочка, которой снова надо придать энергию Солнца. Мы делаем это, расходуя и уменьшая энергию своих мышц, и тем самым в неблагоприятных условиях очень быстро подвергаемся заболеваниям.

Купая вареную пищу, мы выбрасываем валюту — солнечную энергию. Понижается наш энергетический потенциал. Это очень дорого обходится государству. От того, какого вида пищу мы употребляем, зависит производство и экологическое будущее нашей планеты.

Мы говорим о фермент-субстратной специфичности. Фермент подходит к субстрату, как ключ к замку.

Каждый фермент имеет свой субстрат и хорошо знает тот субстрат, на который он действует.

Сырая растительная пища — это тот субстрат, к которому подходит ключ ферментов человеческого организма.

Болезни тесно связаны с качеством пищи. Питаясь животными продуктами, мы вводим в организм много токсических веществ. Кроме того, микроэлементы, образующиеся при термической обработке пищи, попадая в организм, не выводятся, а оседают в тканях в виде различных солей.

У людей нет фермента птиц уриказы, способного растворять кристаллические соединения мочевой кислоты. Поэтому люди должны заботиться о том, чтоб избежать прежде всего поступления с пищей кислотообразующих животных продуктов, провоцирующих появление мочевой кислоты.

Если человек перегружен мочевой кислотой, желудок его тоже начинает выделять много кислоты, чтоб излить ее избыток через какой-нибудь канал. Истечение кислоты через желудок называется ацидорея.

Наибольшее количество мочевой кислоты образуется при употреблении мяса.

В древности на Востоке существовала казнь, в процессе которой человека кормили только вареным мясом в неограниченном количестве, и на 28-й—30-й день он обязательно умирал.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

— При нагревании до температуры $+42^{\circ}\text{C}$ и выше начинается денатурация белков, теряется вода продуктов. Трудно сказать, что ценнее: структура белков, жиров и углеводов или структура воды фруктов и овощей. Если есть фрукты и овощи в достаточном количестве, не надо вообще пить воду.

Одна из причин старения — старение соединительной ткани. А без естественной нативной структурированной жидкости — кисломолочной сыворотки, соков фруктов и овощей — соединительная ткань стареет гораздо быстрее.

Сыворотка — это та же структурированная вода. Из молочных продуктов она предпочтительнее всех.

Вода родниковая, как правило, если она в горах, — ледниковая. В ней много солей. Самая биологически ценная вода — талая. Это и есть та структурированная вода, которая лечит атеросклероз. Основная причина атеросклероза — белковое гниение в кишечнике. Творог вызывает атеросклероз именно по этой причине. МЕЧНИКОВ вводил микрофлору из толстого кишечника больного животного в толстый кишечник здоровому, и получал атеросклероз. Если нет гниения, брожения в желудке и кишечнике, не будет при встрече с инфекционным агентом и болезни.

— Перерожденные гнойные миндалины у массы детей — результат повсеместного неправильного кормления. Можно пить только грудным молоком и в 6 месяцев заболеть ангиной, потому что неправильно питается мать: ест мясо и мало зелени.

Пища не должна быть дефицитом по отношению к организму. Она не должна быть энтропийной.

— Молоко нельзя с чем-нибудь смешивать. Молоко — это еда, а не питье. Молочные продукты относятся к белковым и употреблять их можно в небольшом количестве. В желудке молоко створаживается. Когда оно до конца переварится, можно съесть хлеб.

Ягоды с молоком не сочетаются еще больше, чем хлеб с молоком.

— Вместо резкого стимулятора кофе лучше есть мягкие стимуляторы — фрукты, зелень, огурцы, арбуз. Кофе — ядовитое растение. Как и чай, кофе — источник мочевой кислоты. Лучше пить настой мяты, чабреца, душицы...

— Овощи сочетаются с кислыми молочными продуктами. Известно, что капусту лучше сквашивать кислым молоком.

— Если нет гниения в желудочно-кишечном тракте и не есть мясо, можно съедать ежедневно с хлебом немного масла. То же относится к невареному сыру и творогу.

— Говорят, что свиное сырое сало, как и сливочное масло, не так уж вредно. Но его недостаток в том, что оно для хранения засаливается. Мясо свиньи не может быть хорошей пищей. — Свинья питается отбросами, поэтому свинья располагает к гниению и другим неприятностям.

— Мясо — источник витамина В₁₂. Когда человек не ест мясо, собственная микрофлора его кишечника способна вырабатывать этот витамин. Теперь понятно, почему при переходе на сырую растительную пищу нельзя питаться дрожжевым хлебом. Термофильные дрожжи, на которых пекут хлеб, подавляют кишечную микрофлору, и мы очень просто получаем гарантию иметь малокровие. Деревенские хмельные дрожжи не подавляют кишечную микрофлору, и ими вполне можно заменить при выпечке хлеба термофильные дрожжи. Не обязательно хлеб печь. Можно смешать с маслом свою муку (из раздробленных цельных зерен), разбавить горячей водой. Получается мучной кисель — ценный белковый продукт.

— Геркулес — полностью убитая пища. Лучше использовать сырой ячмень и овес.

— Каши с сухофруктами не сочетаются, потому что в размоченных сухофруктах — низкомолекулярные быстроусвояемые сахара, а в кашах

— высокомолекулярные вещества. Каши лучше употреблять размоченными в сырой воде или маловареными.

— Мед и орехи не совместимы. Орехи лучше сочетаются с овощами, в крайнем случае — с кислыми фруктами.

— Картофель лучше мяса, яиц, но лучше его есть мало. Сырой картофель — не пищевой продукт, но картофельный сок вполне приемлем. Баклажаны и картофель лучше всего готовить запеканием.

— Яйца — то же мясо. Если уж очень хочется, лучше есть только сырой желток. В нем много витаминов, лецитина. А сырой белок — страшный яд.

— Мясо с хлебом — недопустимая смесь. Хлеб можно съесть не раньше, чем через час после употребления мяса.

— Творогом, молоком и простоквашей не увлекитесь.

— Яйцо, мясо и рыба — это ядовитые продукты.

— Яблочный уксус, рекомендованный ДЖАРВИСОМ, очень полезен.

— Диетический сахар — денатурированный продукт.

— Соду лучше не использовать совсем. Но ее вместо дрожжей можно смешивать с простоквашей и зерном для выпечки хлеба. Простокваша нейтрализует соду.

— Соки не надо замораживать, чтоб не нарушить их структуру. Нужно пить свежеприготовленные соки.

— Конский щавель содержит в листьях полноценный белок, который очень насыщает. В Армении его супят в тени косичками, зимой крошат, замачивают на ночь в воде, а утром настоей смешивают с размоченной гречкой и с небольшим количеством лука. Едят его также самостоятельно.

— Кислые фрукты дают организму щелочной резерв. Не надо смешивать фрукты с медом. Мед можно есть в небольшом количестве (1—2 чайные ложки), ни с чем не сочетая, только на голодный желудок.

— Все грибы очень токсичны. Бески грибов неадекватны белкам человека.

— Из изюмов самый лучший — черный изюм с косточками. Косточки надо жевать. Пережеванные косточки растворяются, и никогда от них не будет аппендицита. Аппендицит возникает от накопления продуктов гниения мясной пищи.

— От вина возникает брожение. Вино понижает энергетику организма. Лучше есть виноград, изюм, в крайнем случае — пить виноградный сок. Из консервированных соков он самый лучший. Алкоголь — токсин, яд. При употреблении натуральной пищи снимается проблема алкоголизма и курения. К табаку, вину, морфину влечет мясо — мать всех наркоманий.

АКИМУШКИН И. в книге "Чудо природы" описал попугаев, которые не были агрессивными, пока питались вегетарианской пищей. Как только их стали кормить отбросами овец, они превратились в хищников.

То, что к мясу в ледниковый период люди не сразу привыкли, говорит судьба изолятов — народов, до сих пор оторванных от цивилизации. Они живут долго и безболезненно, не питаясь животной пищей.

Племя ХУНЗЫ, например, проживающее в горной долине на севере Пакистана, питается в основном абрикосами, пророщенным зерном и овечьей брынзой в небольшом количестве. Абрикосы у них величиной с персик. Ядра абрикосовых косточек сладкие и содержат очень ценное

масло. У хунзы удивительная ясность ума, средняя продолжительность жизни — 120 лет, и совсем нередкое среди них явление, когда прабабушка кормит грудью правнучку. С виду они европейцы, — с европейским типом лица. Говорят, что это потомки солдат армии Александра МАКЕДОНСКОГО.

— Бобовые вызывают большое гниение, потому что их белки сконцентрированы. Не мешает напомнить, что самые полноценные белки находятся в зеленых листьях растений.

— Система ОЗАВЫ — это восточная философская система макробиотики. Мы много и ней не понимаем, поэтому лучше пока ее не касаться, а пользоваться тем, что ближе к нам. Когда мы научимся глубоко понимать понятия ИНЬ и ЯНЬ и многие другие, мы сможем конкретно поговорить и об этой системе.

— Меньше есть более целесообразно, чем много. Но при выборе пищи нужно еще учитывать сочетание твердого и жидкого в человеческой клетке. Концентрация белков в растительных клетках очень сходна с концентрацией белков в клетках человека.

— Лук и чеснок нужны, чтобы избавиться от гниения в результате неправильного питания.

— На зиму не надо заготавливать пастеризованные и другие консервы, если даже они из растительных продуктов. Лучше обеспечить себя разнообразными сухофруктами, а упешшую из них при сушке структурированную воду восполнить кисло-молочной сывороткой. Правильно сушить фрукты полагается не на солнце, а в тени.

— Детей до года надо обязательно кормить грудным молоком, а с 6 месяцев и раньше — давать фруктовые и овощные соки: морковный, апельсиновый, яблочный, потом абрикосовый, виноградный, лимонный, томатный, гранатовый. После года ребенок уже самостоятельно может есть цельные ягоды.

— Не давайте детям мясо и хаши. Мясо, вызывая гниение в желудке беременной и кормящей матери, делает то же в тканях плода и грудного младенца.

Не заставляйте детей есть, если они не хотят.

— Еду запивать водой нельзя. Если так делать, то смываются соки, железы работают с нагрузкой, замедляется пищеварение и продукты сбраживаются.

Сладкий чай очень вреден. Он вызывает также замедление пищеварения и сбраживание. Ощущение сытости наступит только тогда, когда пища задерживается в желудке, но не вымывается.

— Что касается температуры питьевой воды, то лучше пить сырую воду комнатной температуры.

Горячая вода не нужна. А холодная вода не так уж вредна, как кажется.

Воду для питья лучше предварительно замораживать, а потом оттаивать.

Не надо пить дистиллированную воду. Она не структурированная. Периодически ею можно пользоваться накануне голодания, поскольку она вымывает шлаки.

— Дневной режим питания можно представить следующим образом:

Если вы встали в 5—6 часов, позавтракайте фруктами в 11 часов. Помните завет древних: не смешивать прием пищи с дневной работой. Энергетика организма расщепляется по нескольким каналам, и перегрузка едой во время работы дает состояние стресса.

В 16—17 часов пообедайте печеным картофелем, овощным салатом. К салату можно добавить семечки и любые орехи. Арахис не ешьте, так как он содержит много токсических веществ и к орехам не относится.

Ужин при таком распорядке можно приурочить к 19—20 часам. III прием пищи, когда основная работа уже закончена, имеет право быть белковым и более насыщенным, чем завтрак и обед. На ужин ешьте каши, творог с овощами, хлеб с маслом, простоквашу, траан, орехи... — ужин позволяет большой выбор продуктов.

Фруктовый завтрак дает энергию, а обед и ужин в основном идет как строительный материал клеток.

В древности в Вавилоне, Греции и других государствах люди ели один раз в сутки вечером после работы.

— Голодание — это микрохирургия клетки, но клетки больной. Когда человек здоров, а голодании нет необходимости. При голодании распадаются патологические структуры организма.

При газах и других признаках несварения полезно голодать по 3 дня каждый месяц. При этом начинать голодание надо с приема слабительного и встречной клизмы; после голодания сначала принимать только фрукты, потом добавлять овощи и только после этого — молочные продукты.

При голодании более длительном рекомендуется 2 раза в неделю или накануне принимать английскую соль.

Голодание можно заменять соками: несколько дней пить фруктовые соки, потом несколько дней — овощные (из зеленых листьев).

Массаж и водные процедуры аполне сочетаются с голоданием.

Практикуется также голодание 3-дневное голодание, за ним 3-дневный прием только фруктов и овощей, потом — 5-дневное голодание, и за ним — 5-дневный прием фруктов и овощей.

Предварительным голоданием и сыроедением можно вылечить склеродермию, бесплодие и дисфункцию яичников, аллергический ринит, сенную лихорадку, эпидермофитию, мастопатию, простатит, мигрень.

При рините первое голодание может быть восьмидневным. Во время голодания лучше пить воду с лимонным соком. На 3—4-й день начнутся гнойные выделения.

В клинике Б. Беннера небольшим предварительным голоданием лечили диабет.

— Некоторые утверждают, что от растительных белков может быть аллергия. Аллергия здесь, как и простуда, — разрешающий фактор. Если организм очищен, растительная пища не вызывает аллергии. При наличии аллергии надо начать лечение с голодания. Голодание подавляет избыточное образование иммунных тел. (Для борьбы с иммунными телами в клиниках назначают иммунодепрессанты и кортикостероиды).

— Из-за неправильного питания возникают разные симптомы — проявления какой-нибудь одной болезни. Паралич и полартрит, например, — классический пример авитаминоза В. Японцы страдали

параличом и полиартритом, когда их долго кормили очищенным рисом. Наши неврозы — это тот же авитаминоз В. Его длительно лечат в клиниках, а больным надо дать всего-навсего цельное зерно.

Бронхиты, пневмонии, ангины — это проявление авитаминоза С. Авитаминоз С чреват тягой к алкоголю, и наоборот, — алкоголь вызывает авитаминоз С.

— Мясо, кофе и чай — провокаторы накопления мочевой кислоты, проявляющейся и мигрени, пародонтозе, полиартрите. Мочевая кислота разрушает цитоплазму клеток и вызывает диабет, болезни щитовидной железы и т. д.

Мигрень часто выступает предшественником диабета или подагры.

При многих болезнях мы назначаем индометацин, золото кортикостероиды. А надо перевести человека на правильное питание, и болезнь зачастую отступает. Надо, однако, помнить, что переход должен быть осторожным. Растворяясь, мочевая кислота и другие аммонийные соединения в хлопьевидном состоянии выводятся в кровь, потом в почки потом наружу. При большом их скоплении происходит закупорка капилляров и наступает криз: часто повышается температура, появляется головная боль, воспаление суставов, т. е. обостряются болезни, которыми человек страдал раньше.

— У здорового человека реакция мочи должна быть слабокислой. Это проявление естественного распада собственных белков организма. Щелочная реакция мочи говорит о воспалительных процессах.

— Сырая растительная пища излечивает многие болезни. Например, худоба, — это тоже болезнь, следствие интоксикации организма. Очень помогают в этом случае овощи и орехи. Изжога лечится шпинатом, соком сельдерея, морковным и свекольным соками, щавелем.

Сыродением лечат наследственные болезни.

Остеохондроз можно вылечить сыродением за 2—3 года. При остеохондрозе, заболеваниях почек и костной системы помогает почечный чай.

— Человек — испьющее млекопитающее. Ему не показано вино, подавляющее нервную систему, точнее, нервную энергию. Но виноградоление, напротив, очень полезно и помогает при туберкулезе, сердечно-сосудистых кризах. Во время лечения ничего, кроме винограда, не надо есть.

— Проросшее зерно лечит хронические бронхиты (за 0,5 часа до еды 3 раза в день есть кашу с небольшим количеством сливочного масла).

Детям с болезнями дыхательных путей 2 раза в день дают проросшую пшеницу, а в перерывах между этими приемами — овощи.

— Если у человека злокачественное новообразование, орехи исключаются из диетического питания. Но не орехи — причина болезни. Опять-таки, если каналы очищены, орехи пойдут только на пользу.

— Не употребляйте слишком горячую или слишком холодную пищу. Лучше всего пища комнатной температуры.

— Грязи можно принимать только с исправленным обменом веществ.

— Для перехода на правильное питание потребуется примерно полгода.

— Дочь АТЕРОВА, тегеранского армянина, пропагандирующего сыродение, — 25 лет от роду, замужем, имеет ребенка. Она ничем никогда не

болела, хороше собой. Питается все 25 лет строгой вегетарианской пищей. На вегетарианском рационе ее ребенок. Вегетарианка даже ее собачка.

— Очень важно правильно чередовать время сна и бодрствования. — Самый полноценный сон с 20 час. 30 мин. — 21 часа до 24 часов, в крайнем случае — до 4 часов. Если время начала сна отодвигается на более поздний срок, человек за количество сна то же, но пришедшее на другое время, не успевает отдохнуть, просыпается разбитым и быстро потом утомляется днем.

Зимой меньше солнечной энергии и меньше продуктов, поставляющих солнечную энергию, поэтому зимой надо спать дольше, чем летом.

В. Беннер говорил, что ночной образ жизни не физиологичен для человека.

— Правильное питание, омовение, дыхание, движение не позволяют быть здоровым, если организм находится в состоянии длительного стресса. В 1972 году "Литературная газета" сообщила о том, как погибли олени на одном из островов Благонравия только лишь от того, что резко возросла их плотность. Их застойный стресс вызвал полную атрофию надпочечников. Устойчивый стресс может привести даже к злокачественным новообразованиям.

Чтобы организм пришел в норму, нужен психологический, физиологический и психический покой.

Самые полезные движения — пешие прогулки и плавание.

Наше 3-е легкое и 3-ю почку — кожу надо обмывать водой по меньшей мере 2 раза в день. Помните при этом, что душ отнимает биоэнергетику, и с этой точки зрения полезна ванна.

— В походе дневной рацион питания немного сокращается. Достаточно на один день похода брать с собой, например, 250 граммов неочищенных орехов, 80 граммов меда, 250 граммов сухофруктов, 150 граммов лимона и 150 граммов моркови.

— Член-корреспондент АМН СССР агрохимик Азербайджана ВОЛОБУЕВ разработал учение о биоэнергетике почв в связи с биоэнергетикой растений. Он очень доказательно обосновал, что солнечные почвы наиболее биоэнергетичны.

Несколько слов надо сказать о сочетании пищевых продуктов.

Субстрату белка соответствует один фермент, в субстрату углеводов — другой, и сочетать белки с углеводами недопустимо. Углеводы перевариваются в основном в щелочной среде кишечника, а белки — в кислой среде желудка. Если смешать то и другое, сахара, вместо того, чтобы превратиться в моносахариды: фруктозу и глюкозу, превращаются в спирты и уксусные кислоты, вызывающие брожение.

Фрукты нельзя есть с хлебом. Хлеб — это поли-, а не моносахарид. — Это крахмал, для расщепления которого требуется больше времени. После хлеба с сыром нельзя есть фрукты. Фрукты лучше съесть за 0,5 часа до еды и на голодный желудок. А хлеб лучше есть не с сыром, а с маслом, а еще лучше употреблять отдельно одно от другого, потому что белок сыра приравнивается к животному белку и переваривается сложнее и в иной среде, нежели хлеб. Так же несовместимы мед и изюм с орехами.

Следствие подобных сочетаний — колит и геморрой. Такие продукты — антигены, на которые вырабатываются антитела организма. А для подавления интел активизируются железы, вырабатывающие кортикостероиды. Зачем же создавать условия для выработки антител, и потом их подавлять?!

Не ешьте 3—4 раза в день вареную пищу, не злоупотребляйте иммунными реакциями! А от животных белков откажитесь совсем или сократите их употребление до минимума.

Мы не плотоядны и произошли не от хищников, желудок которых приспособлен переваривать животные белки.

Резюме.

Обмен веществ зависит от метаболизма. (Метаболизм — это совокупность химических реакций). Нельзя его изменить, не изменяя качество исходных продуктов.

Пища должна быть научно обоснована, но не научно приготовлена, то есть искусственно обработана с потерей биоэнергии как следствие.

При варке из продуктов уходит структурированная вода — растворитель белков и других коллоидов цитоплазмы. Это относится и к щавелевой кислоте. Сырая щавелевая кислота, как любая органическая кислота фруктов и овощей, диссоциирует как щелочь с выделением ОН-групп, а не Н-групп, повышает щелочные резервы организма и выводит шлаки. Но при варке она соединяется с ионом кальция и получается оксалат кальция, который откладывается в органах и вызывает холецистит, мочекаменный диатез и другие болезни.

Вода сырых продуктов имеет структуру двенадцатигранника, структуру белков. При ее отсутствии пища становится концентрированной. В результате повышается осмотическое давление, появляется жажда. Это уже признак нитоксикации, и поэтому жажду надо удовлетворять.

Вода, сохранившая кристаллическую решетку льда, — биостимулятор. Она лечит даже атеросклероз.

Структура протоплазмы и льда организована подобно. Пить деструктурированную кипяченую воду, — значит тратить свою энергию на ее повторную организацию в организме.

ДИЕТА, КОТОРОЙ НАДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ЛЕЧЕНИЯ КОЛИТА

Диета при лечении колита составляет нечто первостепенной важности. Многие доктора-травники уверенно заявляют, что даже лучшие в мире лекарства не принесут излечения, если больной не будет придерживаться описываемых диетических правил. Если больной не будет придерживаться данной строгой диеты, то грубые вещества попадут в толстую кишку и раздражат ее. При этом болезнь пойдет на укупшение гораздо скорее, чем она будет излечиваться. Принимайте серьезную болезнь по-серьезному — выполняйте все правила диеты, и только при соблюдении диеты и потреб-

лении настоек из целсных трав каждый больной освободится от этой жсс-токой болезни.

Пища, которая должна быть исключена из диеты

Исключите из диеты отруби в любом количестве: они царапают и режут внутреннюю оболочку больной толстой кишки. Не ешьте очень горячей и очень холодной пищи. Потребляйте все умеренно в теплом виде. Избегайте очень горячих и очень холодных напитков. Не пейте излишне жидкостей (и воды — тоже). Держитесь прочь от неудобоваримых сортов мяса, таких как свинина, телятина и др. темные сорта мяса. Не употребляйте в пищу никаких сырых овощей. Это автоматически исключает все салаты, ибо целлюлоза в овощах будет царапать и раздражать толстую кишку. Не потребляйте фруктовых соков (самых по себе), а съедайте фрукты в их цельном виде. Не ешьте фрукты со шкуркой, ибо шкурка яблока и груши — неудобоварима и содержит целлюлозу, которая будет раздражать больную внутреннюю оболочку толстой кишки. Избегайте пищи со специями, не ешьте с приправами и пряностями, не ешьте овощей и фруктов с семенами, помидоры, винные ягоды (фиги), малину, ежевику и все ягоды, которые в английском языке оканчиваются на "берри". Не ешьте жареной пищи. Не ешьте свежего хлеба. Избегайте кофе.

Что следует кушать

Можно есть все зерновые, за исключением отрубей и отрубистых зерновых. Ешьте куриное мясо и барашка. Годны для пищи все овощи, в которых нет семян, при условии, что эти овощи были сварены, пропущены под паром или приготовлены на огне. Черносливы, яблоки и груши, сливы и все фрукты без семян, при условии, что эти фрукты были сварены или испечены. Торт с фруктами без семян и без специй. Желе и желатин. Йогурт, молоко, пудинги. Чистые и густые супы нормальной температуры. Хлеб для здоровья и хлеб, продаваемый в магазинах здоровья. Хлеб должен быть не свежий, а черствый, получерствый, с минимальным количеством масла. Жиры могут быть потребляемы, но в очень минимальном количестве. Молоко коровье или козье можно пить сколько желательно (однако, помня оговорку, что потребление жидкостей не должно быть большим).

Стакан воды, не совсем холодной, следует выпивать перед завтраком. И еще по стакану воды между завтраком и лечением и между лечением и обедом. Это не значит, что можно потреблять воды неограниченно, но каждый человек должен потреблять столько воды, не считая тех жидкостей, которые поглощаются с пищей.

Если больной точно и неукоснительно будет соблюдать диету и принимать лекарство, то выздоровление наступит полное.

Помните, что ранний диагноз сохранит вас от страданий и мучений позднее.

Помните, что в лечении колита есть 2 очень важных "НЕ".

Не потребляйте слабительных. Помните, что потребление слабительных часто приводит к колиту. Можете принимать часто "низкую" клизму, если

хотите. Будет очень хорошо прибавлять к каждому поллитру воды столовую ложку жидкого экстракта.

В течение всего периода лечения колита не рекомендуется принимать колонии. Не принимайте высокой клизмы. Низкую клизму можно принимать с водой не больше 0,5 литра.

Если больной заметит, что излишняя озабоченность задерживает прогресс лечения, то потребляйте 1 капсулу или 1 таблетку, но только из целебных трав, а не из химических, при каждом приеме дозы лекарств (капсула или таблетка от нервов).

СЕРДЕЧНЫЕ БОЛИ И ВЛИЯНИЕ ДИЕТЫ*

Более 800.000 человек в год умирает в США от болезни сердца. 85—90% из этого числа умирают от заболеваний сердечных сосудов; 1/3 мужчин в США умирает от болезни сердца.

Понятно, почему прогресс в наших знаниях о причинах этой болезни и ее лечении так важен. Основная причина болезни сердца — это артериосклероз "частичный" сердечных сосудов — разнообразность артериосклероза, когда сужение сосудов является последствием отложения холестерина на внутренней оболочке сосудов. Что такое холестерин? Это желто-белое жировое вещество (химически находящееся в избытке в яичных желтках, мясе, сливочном масле, молоке и сыре). Т. к. организму необходим холестерин для построения собственных клеток и выработки важных гормонов, то организм вырабатывает свой собственный холестерин, главным образом, в печени.

Когда жировой обмен вещества ухудшается и усвоение холестерина понижается, то капельки неусвоенных жировых вещества могут оседать на стенках сосудов и постепенно суживать просвет сосудов и делать их твердыми.

55% мужчин в США получают сердечный приступ из-за заболеваний сердечных сосудов. Артериосклероз сердечных сосудов неминуемо ведет к недостаточному кровообращению, а недостаточное кровообращение не может снабжать сердечную мышцу кислородом, который нужен ей для нормальной работы. В результате этого недостатка или кислородного голодания появляются сердечные боли.

Сердечные боли в огромном большинстве случаев являются признаком грудной жабы, которая болезнь весьма серьезная и наиболее часто встречающаяся — это болезнь нашего времени — у мужчин старшего возраста, хотя может поражать и более молодые возрастные группы. 1000 40-летних ежегодно умирают от этой болезни.

У женщин с прекращением менструаций это заболевание так же часто, как и у мужчин.

Такие заболевания, как: 1) повышенное кровяное давление; 2) тучность; 3) сахарная болезнь — предрасполагают к преждевременному развитию атеросклероза и появлению первых симптомов грудной жабы. Характерным признаком грудной жабы является приступ жестокой агонизации

*Из лечебника Куреннова П. М.

рующей боли, которая внезапно дает себя чувствовать в предсердечной области, и как бы на месте сковывает больного необъяснимым страхом и тревогой за свою жизнь. Не всегда, однако, грудная жаба проявляется в виде таких характерных приступов. Иногда боль появляется и в виде сжатия, стеснения в груди, в виде чувства полноты грудной клетки, в виде тупой боли, в виде жжения под ложечкой, в виде удушья. Боли режущие, колющие, стреляющие, продолжающиеся несколько секунд; по большей части эти боли даже не грудной жабы. Больные обычно не в состоянии описать свои боли, и это, пожалуй, является одним из характерных признаков этой болезни. Внезапное появление болей продолжительностью в несколько секунд или минут, проходящих, как только больной отдохнет или примет таблетку "нитроглицерина" — является очень хорошим показателем такой болезни.

По большей части боль концентрируется позади средней части рукоятки грудной кости, отдающей в левую часть сердечной области, в левую руку, или отдает в шею, как бы сковывая ее, отдает в челюсть, в плечо, в спину, в подложечную область, создавая ложное впечатление, что больного распирают газы или что он переел.

Обстоятельства, вызывающие боли, более важны, чем локализация или характер болей. У большинства больных причиной возникновения болей является физическое напряжение или нервное возбуждение. У многих боли наступают после еды, или при прогулке против ветра, или в колодную погоду. Некоторые больные отмечают появление болей и лежачем положении во время отдыха или сна. Независимо от того, где концентрируется сердечная боль и какой характер она имеет, причиной ее является спазм сосуда, который и так уже сужен, благодаря атеросклеротическим изменениям, и неспособности сердечной мышцы справиться с непосильной работой, вследствие недостаточного притока кислорода. Если больные грудной жабой стараются изменить свой образ жизни, избегают лишних движений и волнений, и при первых предвестниках припадка принимают нитроглицерин, который расширяет сосуды, то эта болезнь не так страшна.

Каковы шансы больного на продолжительность жизни? Больной может прожить 15 лет и больше, все зависит от того, как будет прогрессировать атеросклероз и насколько успешно будет развиваться коллатеральное кровообращение.

С целью предупредить и задержать развитие болезни и чтобы дать возможность развиться, расшириться маленьким сосудам и этим самым компенсировать недостаточность пораженного атеросклерозом сосуда и дать достаточный приток крови к мышце сердца необходимо выполнять следующие рекомендации.

1. Изъятие из диеты всех жиров как животного, так и растительного происхождения.

2. Запрещение продуктов животного происхождения, особенно богатых холестерином (мозги, яичный желток, сливочное масло, сметана, сыры, сливки, нечень, почки, икра, устрицы).

3. Ограничение питания, чтобы поддерживать на уровне стандартов, установленных для 20—25-летнего возраста, т. е. удивительно благоприятные результаты наблюдаются при потере веса.

4. Маленькие прогулки 2 раза в день очень хорошо влияют на больных

грудной жабой. Прогулки надо начинать с маленьких дистанций, даже в том случае их выполнять, если нужно положить одну таблетку под язык.

5. Приступы болей нужно предупреждать принятием таблеток нитроглицерина, а также перед всяким физическим, нервным напряжением, вообще перед всяким моментом, который по опыту самого больного может вызвать приступ.

6. Рекомендуется не доводить себя до переутомления и даже до обыкновенной усталости. Надо избегать волнений, сдерживать нервные вспышки. Есть рекомендуется небольшими порциями, чтобы перегруженные желудок и кишечник не давили бы на сердце, не говоря уже о том, что пищеварение увеличивает работу сердца на 30—40%.

7. От курения надо отказаться, т. к. никотин является сильным сосудосуживающим ядом; наблюдается табачная грудная жаба.

8. Запрещается подниматься по крутым лестницам на верхние этажи, совершать прогулки в горы, гулять при холодном ветре, носить тяжелые накеты.

10. Следить за опорожнением желудка; если нужно, прибегать даже к слабительным средствам.

11. Необходимо избегать простуды и энергично бороться со всякими инфекционными болезнями, т. к. это повышает работу сердца.

Теперь сообщим важные для каждого сведения о том, как сохранить свое сердце, и коснемся очень важного для всех взрослых вопроса: имеет ли диета какое-либо отношение к заболеванию сердечных сосудов?

1. Проблема диеты имеет свою историю — 50 лет, когда кроликов держали на диете высокой по содержанию холестерина и искусственно вызвали атеросклероз сердечных сосудов. Эти опыты несколько лет тому назад повторили в Москве и Ленинграде, опыты произвели под другим углом. Правда, обмен веществ холестерина немного отличается у людей от кроликов и немного рискованно выносить итоги. Тем не менее эти опыты обратили внимание ученых на этот вопрос.

Здесь, в Америке, начались наблюдения 12 лет тому назад, когда на голодающих молодых людей сделали исследования содержания холестерина в крови, которое понизилось с голоданием; после голодания содержание холестерина поднялось опять.

Потом пришли наблюдения из Норвегии, Голландии; во время второй мировой войны население было вынуждено было изменить диету, и заболевания сердцем резко понизились в любой стране, где понизилось употребление жиров.

Мировая статистика показывает, что чем больше в стране употребление жиров, тем больше сердечных заболеваний. Япония потребляет 8—10% из всего количества калорий; Италия — 20%; Швеция, Англия — 35%, Канада и Австралия — 37—38%, США — более 40%.

Каждый, кто хочет избежать сердечных ударов от заболевания сердечных сосудов, не должен есть богатую жирами пищу. Это относится ко всем, без исключения, расам, ко всем профессиям, физически активным или сидячим.

2. ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ЖИРОВ В СВЕТЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРОЛА В КРОВИ?

— Когда я говорил о глобальной мировой статистике сердечных заболеваний в связи с употреблением жиров, я имел в виду жиры молочных продуктов и мясо. 2/3 всех жиров, употребляемых здесь, в США, относятся к этой категории. Это жиры животного происхождения.

Некоторые жиры растительного происхождения имеют такое же действие: "коконат ойл" — кокосовое масло — имеет такое же влияние, как и жиры животного происхождения. "Корн ойл" (кукуруза, маис) не увеличивает содержания холестерина в крови. Механизм действия еще не известен: наблюдения показали, что если "кори ойл" был заменен "сан флаур сид" (подсолнечное), уровень холестерина поднимался, "Коттон сид ойл" (хлопковое масло) подобно рыбьему жиру, и "корн ойл" имеет наибольший эффект в понижении холестерина в крови. Это не значит, что к нашей диете мы должны прибавить "корн ойл" для понижения холестерина. Тогда мы должны были бы дойти до 70% жиров в нашей диете и все страдать ожирением.

— Я рекомендую своим больным ограничить общее количество жиров и где необходимо, перейти на "корн ойл". "Пиннат ойл" при питании кроликов давало в результате артериосклерозис.

— Как вы относитесь к "олив ойл"?

— Оливковое масло в умеренных количествах не имеет особенного стимулирующего влияния на увеличение уровня холестерина. Не вижу никакого основания запретить "олив ойл" для салатов. В Италии и Испании, где главным образом употребляют оливковое масло, заболевание закупоркой сердечных сосудов встречается в 2 раза меньше, чем у нас. Объяснение находится в том, что общее потребление жиров в 2 раза меньше, чем у нас.

Маргарин поднимает уровень холестерина в крови.

3. Кроме жиров, на состояние сердца влияют, быть может, другие факторы, как нервное напряжение, перегрузка работой, связанное с войной лишение крова, бомбардировки...

Жители Норвегии и Финляндии во время оккупаций имели нагрузку работой и нервные переживания, связанные с войной, и конечно, диета была пониженная в отношении жиров, заболевания сердечных сосудов резко понизились по сравнению с довоенными нормами.

Данья, которая сохранила свою богатую жирами диету (главным образом, животного происхождения), несмотря на оккупацию страны немцами, нервные переживания, выселение из квартир, перегрузка работой, также на высоте сохранила уровень сердечных приступов.

4. ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТА, ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ИЛИ СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ИМЕЮТ ЛИ КАКОЕ-ЛИБО ОТНОШЕНИЕ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРДЦА?

— Физическая активность не особенно важный момент. Это неправда, что занятые тяжелым физическим трудом редко заболевают коронарным тромбозом. В Японии, где коронарные заболевания сердца редки, преобладающая часть населения ведет сидячий образ жизни, такой же, как у нас в Америке. Наоборот, в Финляндии, где ведутся сейчас наблюдения, коронарные заболевания крайне часты в сельскохозяйственных районах и в речных районах восточной Финляндии. Это население занято тяжелой физическою работой и не имеет тревожения городских жителей.

5. АЛКОГОЛЬ

В больших госпиталях, где умирают алкоголики, почти не находят следов атеросклероза в их сосудах. Это объясняется странностью их диеты.

6. ТАБАК

Табак не является прямой причиной коронарных заболеваний; курят одинаково много в Японии с малым процентом коронарных заболеваний, и в США с большим количеством сердечных заболеваний. Приблизительно 50—60% мужчин — курильщики во всех странах, и конечно, курение может быть углубляющим фактором в жизни людей, страдающих уже атеросклерозом, как сосудосуживающий ад.

7. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Наследственность, несомненно, играет роль. Ясно, что лица, имеющие такую наследственную предрасположенность, должны быть осторожны и разумны в своей диете.

8. КАК В ОТНОШЕНИИ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ?

Мы знаем, что коронарные заболевания сердца преобладают больше у мужчин. Женщины, наоборот, в менструальном периоде почти иммунны, а с наступлением климактерического периода заболевания учащаются. Женщины, которые в молодые годы были оперированы (удаление яичников), болеют чаще, чем те, у которых яичники остались нетронутыми.

9. ПОНИЖЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ведет к увеличению холестерина в крови, и наоборот: уровень холестерина низок у лиц с активной работой этой железы. Кортизон повышает уровень холестерина.

10. АРТЕРИОСКЛЕРОЗ ВЕННЫХ СОСУДОВ

повышает их чувствительность к импульсам, идущим со стороны центральной нервной системы, и вызывает их склонность к спазмам или к извращенным реакциям. Учащение приступов связано с прогрессированием атеросклероза.*

ДИЕТА И ЗДОРОВЬЕ. ФИЗИОЛОГИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ. ОТЧЕГО ЛЮДИ РАНО УМИРАЮТ, ЧАСТО БОЛЕЮТ И НЕ ЗНАЮТ ПРИЧИН СВОИХ НЕДОМОГАНИЙ?

На вопрос читателей, какая диета считается лучшей, Куреннов неизменно отвечает: — ТА ДИЕТА СЧИТАЕТСЯ ЛУЧШЕЙ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ БУДУЩНОСТЬ! — Диету будущего можно назвать также диетой XXI века.

Среди adeptов здоровья есть три самые лучшие диеты:

1. Сырая вегетарианская диета (сырые овощи, сырые фрукты, сырые овощные соки и сырые фруктовые соки и орехи).

2. Та же самая вегетарианская диета, но с добавлением вареных овощей и печеных фруктов. Обе диеты суть бескрамальные и безмолочные.

* Из доклада д-ра В. Х. Чилингарьян.

3. Диета мясная. Это модная диета. Она хотя и для мясоедов, но также как и две предыдущие диеты, безкрахмальная и безмолочная. Автор не предлагает свою диету каждому, ибо организмы разные, и диета может чуть-чуть варьироваться! Самое главное в диете для здоровья, лечения болезней и предупреждения болезней — диетические правила или ПРАВИЛА ДИЕТЫ БУДУЩЕГО.

1-е правило. Нельзя есть протертые (мясо, рыбу, яйца и пр.) за один присест с крахмалами (хлеб, картошка, рис, горох, бобы и прочие крахмалы).

2-е правило. Если есть возможность, избежать жидкой пищи (суп, борщ и все жидкое). Есть много разновидностей жидкой пищи, очень хорошей и желательной для диеты, но весь трагизм в том, что 99% людей проглатывают жидкую пищу, не пережевывая! Это в конце концов приводит к болезням пищеводного тракта, пища поступает в желудок без пищеварительной слюны.

3-е правило. Следует очень долго жевать пищу перед проглатыванием, памятуя, что в желудке зубов нет. Многие больные болезнями пищеводного тракта (диспепсия и мн. др.) не могут никак осознать, что им не помогут никакие специалисты и никакие лекарства, а поможет только САМОДИСЦИПЛИНА. НАУЧИТЕСЬ ЖЕВАТЬ МЕДЛЕННО, и ваши неполадки с пищевым трактом будут покончены (если они были от недостаточного жевания пищи).

Всему миру известен случай с американцем Флетчером. Флетчер в свои 60 лет был так сильно болен болезнью пищевого тракта, что все доктора отказались его лечить. Тогда он решил лечить себя сам очень тщательным и длительным пережевыванием пищи. Он полностью вылечил себя. После этого во всех книгах о здоровье и вообще навык тщательного пережевывания пищи стали называть "флетчеризмом".

Один американский изобретатель изобрел прибор вроде наручных часов для слепых с механизмом для правильного лечения "флетчеризмом". При употреблении этого прибора пациент набирает пищу в рот и ставит стрелку прибора на 0. Когда верхняя челюсть над нижней пройдет 150 раз, то прибор маленьким шпательком колет в руку. Это означает, что пора проглатывать. Обычно публика высмеивает изобретателя, но... хорошо смеется тот, кто смеется последним. Конечно, изобретатель сильно перегнул палку в одну сторону.

Однако, трагично то, что 99% публики перегибает эту же "палку" в диаметрально противоположную сторону, проглатывая пищу после того, как верхняя челюсть пройдет над нижней от 5 до 8 раз!

По исчислениям ученых почти всех стран мира, при жевании пищи верхняя челюсть над нижней должна пройти от 15 до 30 раз (а иногда и больше), в зависимости от рода и твердости пищи.

Нельзя ни в коем случае забывать, что самое главное в пищеварении, или назовем правильно — основа основ здорового пищеварения и в то же время профилактика и лечение болезней пищеводного тракта — жевание пищи.

Один фармацевт в США на вопрос: "О каких болезнях вы здесь в США готовите больше всего лекарств?" Ответил: "95% лекарств мы

приготавливаем от болезней пищеводного тракта и только 5% от всех остальных болезней..." Считаем, что фармацевт несколько преувеличил первую цифру. Вдумайтесь в эти цифры: 95 и 5 и вы поймете, почему диета XX века очень дефективна... Поэтому здесь описывается диета будущего или диета XXI века. Помните: все то, что не имеет будущности, — бесславно умирает!

Опять обратимся к ужасным цифрам 95 и 5. Можно с колоссальной уверенностью сказать, что минимум 40 из 95 приходится на газы в желудке и кишках. Очень не умно пытаться врачевать газы аптекой и химикалиями. Содой, содовой водой и сельтерскими препаратами. Надо знать причину образования газов в желудке и кишках, исправить диету и диетическим путем избавиться от газов!

Газы получаются от приема пищи протеиновой и крахмальной в один присест. Наш организм и пищеварительная энигма устроены так, что когда в желудок поступает протеиновая пища (мясо, рыба, яйца и пр.), то организм организует и направляет в желудок "медиум" характера № 1. Если в это же время в желудок поступает, скажем хлеб и другая крахмальная пища, то организм направляет в желудок "медиум" № 2, который по своему характеру диаметрально противоположен "медиуму" № 1. Эти медиумы предназначены растворить в желудке пищу так, чтобы она вошла в кишки (тонкие) в жидком виде. Но оба медиума, будучи противоположного свойства (кислотность одного и щелочность другого), вступают в борьбу друг с другом и... уничтожают друг друга. Вследствие этого наша пища вместо жидкой входит в тонкие кишки "куском" или вернее, кусочками и... гниет и бродит! Это гниение и брожение начинается еще в желудке. Вот и картина образования газов.

После лекций автора неоднократно слышались возражения и неодобрения диеты будущего. Оппоненты говорят, что и какой бы дом или ресторан вы не зашли, везде кушают мясо и хлеб (за один присест). Приходится отвечать, что это делают по недостатку знания законов физиологии правильного питания в этом нашем XX веке и не будут этого делать в XXI веке. Соединение протеиновой и крахмальной пищи за один присест создает страшные цифры 95 и 5.

Слушатели многочисленных лекций Куреннова задавали часто такой вопрос: "Наши деды и прадеды всегда ели протеины с крахмалами за один присест и доживали до 90 и 95 лет и редко когда болели..." Приходилось отвечать, что мой прадед по матери умер в 107 лет, а его отец — мой прапрадед — умер 114 лет. Но эти Мафусаилы были довольно редким исключением, а как правило, люди умирали в 40, и в 50, и в 60 и редко чуть больше. Огромный процент этих рано умерших приходился на страдавших долгие годы при жизни болезнями пищеводного тракта и почти непременно имевшими газы в желудке и кишках...

Выше мы говорили о двух причинах болезни пищеводного тракта: смешивание протеиновой и крахмальной пищи. Теперь мы укажем несколько причин, от которых получается печальная стадия болезни пищеводного тракта — ДИСПЕПСИЯ (между прочим, с диспепсией надо непременно справиться, т. к. потом она может превратиться в гастрит, язву желудка и язву 12-перстной кишки, болезни тонких кишок, колит и пр.).

Диспепсия от разных причин:

3. От приема пищи в нерегулярное время.
4. От переседания.
5. От быстрого поглощения пищи.
6. От нервного напряжения.

Поясним эти пункты от 3-го до 6-го.

Пункт 3-й. Начать принимать пищу в строго определенные часы дня и диспепсия кончится. Если диспепсия или гастрит появились у рабочего, работающего на 3 разных сменах (каждую неделю другая смена), то единственный выход покончить с болезнью пищеводного тракта — оставить работу на переменных сменах и поступить на работу в одной смене.

Пункт 4-й. Прекратить переседание и довольствоваться минимальным количеством пищи.

Пункт 5-й. Он сходен с пунктом о жевании, о котором мы уже говорили.

Пункт 6-й. Успокоить нервы отчасти самовнушением и самодисциплиной, отчасти правильной диетой и обратиться к врачу-гербаLISTу, который даст препарат из целебных трав от нервности.

Примечание. Все вышеизложенные неполадки с пищеводным трактом требуют лечения самодисциплиной и, конечно, диетой будущего, дистой XXI века, описанной здесь...

О МОЛОКЕ

— Молоко, ты молоко, молоко коровье,

От тебя мне, молоко, только нездоровье...

Читатели книг сего автора и слушатели лекций часто спрашивали: "Почему ваша диета будущего безмолочная?" Чтобы без лишних слов ответить на этот вопрос, сошлемся на утверждение д-ра Вокера, который в своей книге "Диета и салаты" сказал: "Иногда полуправда бывает хуже самой наглой лжи; есть поверье, что коровье молоко — один из самых полезных продуктов нашей диеты... А опыт многих веков ясно доказывает, что коровье молоко служит источником получения слизи и с младенчества до глубокой старости служит причиной заболевания людей простудой, гриппом, астмой, бронхитом, сенной лихорадкой, воспалением легких, туберкулезом и синусом".

После лекции к автору подошла пожилая чета и рассказала такой случай. У их дочери сыновья 2 и 3 лет почти всегда болели, и они не знали, что с ними делать. После прочтения его книги для детей перестали совсем покупать молоко и стали давать детям овощные и фруктовые соки. И с тех пор мальчики ни одного дня не болели.

Уже замечено, что замена коровьего молока овощными и фруктовыми соками дает своего рода иммунитет людям против простудных и многих болезней. Оно и понятно: ни Бог, ни природа никогда не предназначали коровье молоко, да еще пастеризованное, для потребления взрослым людям (да и грудным младенцам). Коровье молоко годно только для теленка и то только в первое время после его рождения, а потом становится негодным для него.

ОБ ОДНОЙ "ЗАГАДКЕ"

Люди, приехавшие в США из восточных стран: Афганистана, Ирана, Ирака и пр., интересуются, почему в их странах много людей преклонного (а зачастую и среднего) возраста умирают в уборных... Само собою разумеется, что причина их смерти — непроходимость их толстой кишки.

На всех своих лекциях Куреннов демонстрировал 4 плаката в рост человека. На каждом плакате изображена толстая кишка, страшно деформировавшаяся настолько, что жизнь при такой кишке или кончилась, или кончится очень скоро. На своих лекциях автор этих строк часто говорит: "Длительность жизни человека зависит от степени деформированности его толстой кишки". Если деформированность толстой кишки достигла предельной степени, то надо считать, что над этим человеком нависла угроза смерти. Такую сильно деформировавшуюся толстую кишку (по-английски "колон") можно до некоторой степени исправить только при помощи "колоник машины". Это — машина для автоматической клизмы. Здесь скажем о маленькой подробности устройства этой машины. В задний прокол вставляются два конца резиновых трубок. Через один рукав вода вливается, а через другой — вода после промывания толстой кишки уходит в канализацию. Вода из машины входит под очень маленьким давлением, примерно в 275 г на кв. см, что соответствует силе нашей перистальтики.

Некоторое время врачи не одобряли промывания толстой кишки "колоник машиной", утверждая, что при этом способе очистки толстой кишки вымывается слизь с внутренней оболочки толстой кишки (по-английски эта слизь называется "интестинал флора").

Авторитеты всего мира блестяще доказали, что эта кишечная флора восстанавливается организмом максимум в 30 дней. Организм человека приспособлен к восстановлению, скажем, новой кожи и других частей тела после болезни или операции, в том числе и "кишечной флоры", как называется слизь по-английски.

Нетрадиционные методы физиотерапии

**Д Ы Х А Н И Е
ПО СИСТЕМЕ БУТЕЙКО**

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ

К болезням глубокого дыхания относятся:

1. Бронхиальная астма, астматический бронхит, эмфизема легких, бронхо-эмпатическая болезнь, пневмосклероз, гипертония малого круга (болезнь сердца).

2. Гипертоническая болезнь, стенокардия, нарушения мозгового кровообращения, облитерирующий эндартерит, болезнь Реймо, старческий диабет, хронический нефрит (склероз сосудов почек), склероз сосудов головного мозга.

3. Исход перечисленных болезней — склероз отдельных органов, завершающийся соответственно инфарктом мозга, инфарктом миокарда.

Ведущим во всех этих заболеваниях является:

1. Повышение тонуса гладкой мускулатуры и их спазм.

2. Конечный результат всех этих болезней — гипоксия тканей.

Следовательно, эти болезни являются следствием нарушения тканевого дыхания. Они составляют приблизительно 70—80% всех болезней А/Д и Т.

Таковы константы болезни.

Отсюда можно сделать вывод, что болезнь — это сдвиг жизненно-важных констант за границы физиологической нормы. Чем важнее константа, тем с большей точностью организм ее поддерживает на неизменном уровне. Цель системы внешнего дыхания поддерживать на должном уровне O_2 и CO_2 в альвеолах.

Какая же константа важнее для организма: O_2 или CO_2 ? В воздухе 21% O_2 , если количество O_2 уменьшить до 15% или увеличить до 80%, то организм практически на это не реагирует.

Если же изменить количество CO_2 на 0,1% в ту или иную сторону, то организм сразу же это замечает и старается вернуть CO_2 к норме.

Следовательно, CO_2 в 60—80 раз важнее для организма, чем O_2 , а функция внешнего дыхания может быть определена по уровню CO_2 в альвеолах. Недостаточная функция внешнего дыхания ведет к увеличению CO_2 в альвеолах, а избыточная функция к его снижению.

У здорового человека объем внешнего дыхания — 5 литров, а у астматика — 10—15 литров. Таким образом, у астматика не ослабленное дыхание, как мы пишем, а усиленное. Бронхиальная астма — это защитная реакция организма на усиленное дыхание, реакция, направленная на то, чтобы удержать CO_2 на уровне 6,5%, в то время, как у астматика CO_2 составляет 4—4,5%.

Симптомы гипервентиляции:

1. перевозбуждение нервной системы, выражающееся в раздражительности, вспыльчивости, бессоннице, необоснованном страхе.
2. Вегетативные нарушения — потливость, приступы слабости, дизэнцефальные симптомы.
3. Истощение или ожирение, связанные с нарушением регуляции жирового и другого обмена.
4. Гипертиреоз.


Все, что у больного было связано с гипервентиляцией, при нормализации дыхания по методу ВНД (волевая нормализация дыхания) вначале обостряется, а затем исчезает (худые полнеют, полные худеют и т. д.). Умные волевые люди вылечиваются. Симптомы бронхоспазма — чувство давления за грудной клеткой: хронические бронхиты, частые простуды, заболевания и т. д. Гипервентиляция — это своеобразное воздушное обжорство! У астматиков дыхание не имеет пауз (не автоматической задержки на выдохе), у них глубокий вдох чередуется с быстрым выдохом, при этом происходит удаление CO_2 из организма, содержание CO_2 падает ниже нормы (норма 6,5%), а гладкая мускулатура бронхов чувствует снижение CO_2 даже на 0,5%, она пытается затормозить удаление CO_2 — происходит очередной приступ астмы.

Нормальное дыхание здорового человека — это медленный неглубокий вдох (2—3 сек.), медленный выдох (3—4) и затем пауза (3—4 сек.), во время которой легкие отдыхают после выдоха. Все внимание должно быть обращено на уменьшение глубины вдоха и увеличение паузы после выдоха. Помимо этого необходимо провести периодические максимальные задержки дыхания. Чем чаще будут задержки (особенно при приступе астмы), тем лучше. Астматикам рекомендуется делать задержки через 5 мин., гипертоникам через 15 минут. Вначале продолжительность задержки небольшая — до 10 сек., затем продолжительность увеличивается. У здорового человека она доходит до минуты и больше. Начинать тренировку надо с 5—8 часов в день с перерывами на 1—1,5 часа.

ЗАДЕРЖКА ДЫХАНИЯ ДЕЛАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫДОХА

Во время тренировок необходимо следить, чтобы вдох был неглубоким, т. е. неполный, чтобы грудная клетка не поднималась и все время оставалось чувство нехватки воздуха.

При проведении задержки дыхания желательно закрывать нос, а после задержки вдох делать небольшой. Женщинам можно сделать грацию, а мужчинам потуже затянуть ремень. Если приступы бывают ночью, то приблизительно за час перед приступом необходимо встать и провести тренировку дыхания. Утром тренировка проводится еще раз. При приступах через каждые 3—4 вдоха делается максимальная задержка на выдохе. (Без большого напряжения). Задержка дыхания быстро снимает приступ.



ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ

Реакция выздоровления (ломха болезни).

Любое заболевание начинается скачками, в виде кризов. Например, бронхиальная астма (хотя она подготавливается годами), гипертоническая болезнь, стенокардия и т. д. Иногда симптомы гипервентиляции начинаются еще с детства (спазмофилия, диатез, пневмония, коклюш, кожный круп и т. д.). Болезнь начинается с криза и должна кончаться кризом. Астма ломается приступом астмы, стенокардия — приступом стенокардии, гипертоническая болезнь подскоком А/Д и т. д. Задержка и частота дыхания — два показателя, определяющие болезнь, и за ними надо постоянно следить. Самочувствие больного здесь ни при чем. Во время ломки при бронхиальной астме приступы легче и короче, и выделяется большое количество мокроты, при стенокардии во время ломки вместо ноющих болей в области сердца появляются ощущения жжения за грудиной. Перед ломкой больной ощущает как бы сопротивление (неприятно тренировать дыхание, отвращение, страх), укорачивается задержка, учащается дыхание, показатели несколько укладываются.

Общие симптомы ломки: бессонница, головные боли, тошнота, рвота, отвращение к пище, слабость, апатия, боли в икроножных мышцах, грудной клетке, боковых поверхностях шеи, шум в ушах, пульсация, нарушение стула — жидкий и даже со слизью — 2 недели.

У астматиков усиливается хашель с обильными гнойными пробочками. Боли разного характера всех участков тела, почечные и печеночные боли, частые мочеиспускания, рези, жажда, слюнотечение. Кожные проявления — кожный зуд, крапивница, отек Квинке. Уменьшается отечность, снижается вес, боли в деснах, глазницах, боли в ладонях, подошвах. Кровотечение из десен, носа, усиливается менструация.

В мокроте кровь (у сосудистых больных в течение месяца), плаксивость, температура до 40°C. У большинства астматиков озноб.

Стул — черный, происходит перестройка капиллярных сетей кишечника. Повышается А/Д, особенно у коронарных больных, у которых была скрытая гипертония. Обострение этих явлений указывает на то, что эти явления связаны с неправильным глубоким дыханием.

Все старые переломы костей начинают сильно болеть. Ломка может начаться через сутки от начала занятий или через месяц.

Время ломки зависит от тяжести и давности заболевания и от того, как больной занимается. Симптомы ломки появляются необязательно в одно время. То, что тянулось годами, исчезает днями. Если больной сменит обстановку или место жительства, то ломка может повториться. Поэтому желательно оставаться на одном месте в течение года (цикл ломки). После ломки болезни состояние больного сразу улучшается. В период ломки можно давать лекарства, но в половинной дозе. Избегать АКГГ и белковые препараты. Если больной шел на гормонки, то в период ломки можно дать кортико-стероидные гормоны, сердечным даются сердечные препараты низкой силы.

При появлении отвращения к пище не забывать есть, не желательно применять питание (молочное), рыбные и куриные бульоны.

Не глотать слюну, полоскать рот обычной водой. Прием жидкости не ограничивать. Избегать минеральные воды. У тучных больных поддерживать голодовку, избегать сахар. Желательно продукты применять в слабо проваренном виде. В течение месяца это питание расширять. Во время ломки болезни обязательно продолжать тренировку дыхания, иначе ломка затянется и может превратиться в обострение. Тяжелым больным, если нет печеночной недостаточности, давать хлористый калий (по 0,5 г три раза в день), поваренную соль уменьшить до 5 г. Давать продукты с фосфором (пшено, гречку). Тренировку дыхания перед сном делать на животе.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ

Утром обязательно делать задержку — проверять себя (так всю жизнь). Если задержка укорачивается, то значит приближается болезнь.

Мировой рекорд задержки — 5 мин. Кашалот — 150 мин.

Йоги — 30 мин. Но это уже вид спорта, а не нормальное дыхание.

Для повторяющихся пневмоний защитная реакция — астма, но пневмония прекращается, а приступы астмы вызывают глубокое дыхание и ведут к легочно-сердечной недостаточности. При появлении легочно-сердечной недостаточности приступы астмы прекращаются (защитный синдром сокращения CO_2), но уже поздно, дело идет к смерти. Смерть наступает не от астмы, а от легочно-сердечной недостаточности.

Если утренняя задержка растет, то количество часов тренировки через месяц можно сократить до 2 часов — один час утром и один час вечером.

БАРЬЕРЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

1-й барьер — 30—40 сек., в течение которых кровь из легких пройдет малый круг и часть большого круга и дойдет до тканей. Если этот барьер будет пройден, то задержка в 50—60 сек. будет легкой.

2-й барьер — 70 сек., в течение которых кровь проходит весь большой круг и возвращается назад в легкие. Его тоже трудно перешагнуть.

Последующие барьеры через 50 сек.

3-й барьер — 120 сек.

4-й барьер — 180 сек.

5-й барьер — 240 сек.

6-й барьер — 600 сек. и т. д.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Земля родилась около 4,5 миллиарда лет тому назад, тогда еще не было атмосферы. И вот тогда началась возгонка газов (дегазация) и летучих элементов на поверхность Земли (азот, водород, углерод).

Этот процесс дегазации мантии продолжается до сих пор. В то время O_2 в воздухе еще не было.

Около 2 миллиардов лет тому назад начала появляться первая жизнь, бескислородная или анаэробная жизнь. Такая жизнь есть и сейчас. Процессы анаэробики продолжались до 1 миллиарда лет в среде, где было много CO_2 , но не было кислорода. Появившиеся земные органические вещества (водоросли) стали выделять O_2 как отброс своего существования, в результате в земной атмосфере стал накапливаться кислород. Уровень кислорода в атмосфере начал повышаться, а уровень CO_2 — снижаться. В настоящее время уровень O_2 составляет 21%, а уровень $CO_2 = 0,03\%$.

Когда содержание O_2 в воздухе и в воде составляло 1%, а CO_2 — 7%, начала появляться живая клетка. Она стала поглощать кислород из воздуха и выделять углекислый газ (растения делают обратное). В результате в атмосфере наступило равновесие, а на Земле появился новый процесс — аэробная фаза дыхания или кислородное дыхание.

Воздух, окружающий нас, содержит в 250 раз меньше углекислоты, чем надо.

Поэтому окружающий нас воздух, если его вдыхать полной грудью становится ядовит для наших клеток. Нас спасает защитный барьер — кожа, непроницаемый для газов и бронхи, имеющие кожистый вид. Тем не менее усиленное дыхание приближает нас к гибели.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КИСЛОРОДА И УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

Кислород вошел в нашу жизнь поздно, он необходим для окислительных процессов с целью удовлетворения энергетических узлов организма.

Если в тканях уменьшить уровень кислорода, то они не погибнут, а уменьшение содержания углекислоты приводит к параличу. Углекислый газ в организме регулируется системой дыхания, сосудодвигательным центром, его содержание связано с обменными процессами. РН крови регулируется содержанием углекислого газа (важный фактор). Если дышать чистым воздухом и то появляется поражение легких — гипоксическая пневмония. В горах кислорода меньше, поэтому там обычно лечат востокков. Вероятно, для востокков достаточно 15% кислорода, а не 21% как в атмосфере.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Эволюция дыхания в патогенезе (плода)

Все девять месяцев внутриутробной жизни в крови плода кислород держится в три раза меньше, чем в крови взрослого человека. Говорят, плод синюшный. Такое нормальное содержание кислорода в крови плода полностью обеспечивает развитие тканей.

Большое содержание кислорода приводит ткани к гибели. В артериальной крови взрослого человека 97% кислорода, в венозной крови — 70%, у плода — 30% кислорода. Система дыхания присоединяется к системе кровообращения уже на третьем этапе эволюции. Эти две системы возникли для того, чтобы обеспечить правильный обмен в организме, определить уровень углекислого газа и кислорода. Содержание углекислого газа регулируется в альвеолах с точностью до 0,1%. Содержание кислорода можно изменить и при этом ничего существенного не произойдет. О важности CO_2 в системе регуляции дыхания можно судить по концепции Анохина. Вся система дыхания регулируется CO_2 . Наиболее важной константой в системе регуляции дыхания является CO_2 . При глубоком дыхании из организма удаляется CO_2 и развивается поражение основных жизненно важных органов. Для предотвращения этого организм вырабатывает механизм защиты (адаптация) от выветривания CO_2 .

ЗАЩИТА ОТ ВЫВЕТРИВАНИЯ CO_2

1. Полипы на слизистой оболочке носа не дают возможности глубокого дыхания.

2. Аллергический вазомоторный ринит.

3. Ларингоскопы.

4. Бронхоспазмы.

Критический уровень CO_2 в альвеолах составляет 4,75%, если этот уровень будет занижен, то наступает бронхоспазм. В неприступном периоде CO_2 в альвеолах — 4,75%. Бронхоспазм до некоторой степени повышает

CO_2 , но не нормализует его. Тонус бронхов является важным фактором регуляции альвеол.

Гладкая мускулатура бронхов регулирует дыхание. Концепция Анохина заключается в следующем: если содержание CO_2 близко к норме, то его дальнейшая регуляция в организме осуществляется дыхательным центром, если же содержание CO_2 уменьшено, то подключается аварийная система — бронхоспазм. Уровень CO_2 воздействует на мускулатуру бронхов уже через 20 сек. Неравномерная вентиляция альвеол дает картину блуждающих крыпов. Если бронха, которая питает альвеолы, спазмирована, то воздух разрывает альвеолу и получается спонтанный пневмоторакс. У больного с бронхоспазмом просвет бронхов уменьшается, наступает не только бронхоспазм, но и повреждение легочной ткани — пневмосклероз.

В процессе жизнедеятельности меняется состав клеток.

Только нервная клетка не меняется, фермент регулирует рассасывание образовавшихся рубцов на тканях.

ЗАНЯТИЕ ПЯТОЕ

Защита от выветривания CO_2 (продолжение)

5-й барьер. Вследствие пневмосклероза уменьшается проницаемость клеточной мембраны, что затрудняет выветривание CO_2 .

6-й барьер. Сосуды малого круга при гипервентиляции у больного сужаются. Загрубевают альвеолы в капилляры, которые ранее омывались кровью, теперь кровь идет в малый круг, минуя альвеолы. Развивается поражение легочной ткани, защищенной от гипервентиляции.

7-й барьер. Функциональный, он связан с функцией сосудов малого круга. Развивается легочная гипервентиляция, появляется спазм артерии, повышается А/Д малого круга и еще больше сбрасывается крови в малый круг, в результате появляются функциональные мунты и кровь, протекающая по ним, не вентилируется.

Симптомы посинения астматика объясняются: спазмом бронхиол, спазмом артерий, повышением А/Д в малом круге. Пронсходит увелнчение количества неокисленной крови в большом круге и человек синее.

8-й барьер. Генодинамический, связан с реакцией большого круга кровообращения. При глубоком дыхании А/Д у гипертоника в первые 3—5 сек. снижается, а потом вновь повышается, а здорового человека глубокое дыхание приведет к гипотоксии и перейдет в шок. Затем может наступить смерть. Гипотония является первой стадией гипертонии.

Смысл гипертонии сводится к тому, чтобы через сосуды проходило меньше крови и тогда CO_2 будет меньше вымываться и станет задерживаться в тканях.

9-й барьер. Спазмы гладких мышц артериальных сосудов. Спазмирует вся артериальная система, особенно в артериалах, т. к. там меньше стенки и они являются как бы кранами, регулируя поступление крови.

ЗАНЯТИЕ ШЕСТОЕ

CO_2 действует на гладкую мускулатуру двояко: а) центральное действие, б) периферийное или местное действие. Эти два действия прямо противоположны. Центральное действие — сужение сосудов, местное — расширение их. Чем дальше от центра, тем меньше влияние центральное и больше периферийное (местное). Местное влияние на сосуды уменьшает их тонус, расслабляет их. Проявляется местное действие длительно и стойко. При гипервентиляции появляется спазм всего тела, а при уменьшении гипервентиляции сосуды расширяются. Глубокое дыхание чистым кислородом хуже, чем воздухом, т. к. быстро наступает гипоксия мозга. Количество O_2 в тканях не зависит от O_2 в окружающей среде. Количество O_2 в тканях прямо пропорционально количеству CO_2 в тканях в крови. Чем больше CO_2 в тканях и крови, тем больше O_2 и наоборот. Определяющим фактором является CO_2 , но нельзя сказать, чем больше O_2 , тем больше CO_2 .

Чем глубже дыхание, тем меньше O_2 попадает в организм и наоборот, чем меньше дыхание, тем больше O_2 попадает в организм.

Воздух портится от ядовитых продуктов, выделяемых производством, а не от того, что где-то больше CO_2 , а где-то меньше. (CO_2 в воздухе всего лишь 0,03%, а в организме человека 4,5% и больше). Незначительные колебания атмосферного CO_2 никакой роли не играют. Чтобы повысить содержание O_2 в тканях, надо повысить CO_2 в крови. Только при острой пневмонии необходимо давать O_2 , т. к. при этом легкие почти полностью не работают и O_2 необходим, но давать O_2 надо не часто, т. к. он повреждает ткани.

При спазме сосудов ни в коем случае не давать спазмолитики (дибазол, ауфиллин и др.), т. к. они мгновенно снимают спазмы сосудов и тем самым усиливают выделение CO_2 , что ведет к инфаркту, инсульту и др. патологии. Чем больше O_2 в крови, тем уже сосуды.

Спазмы сосудов вызывают уменьшение CO_2 и увеличение O_2 . CO_2 является основным сосудодвигательным фактором. Если в альвеолах в крови O_2 меньше нормы, то кислород надо давать, если норма — то не надо, т. к. это увеличивает кислородное голодание.

СОПУТСТВУЮЩИЙ ФАКТОР ВЕРИГО-ВЕРИ

Если в крови уменьшить CO_2 , кровь начинает прочно удерживать O_2 и не отдает его в ткани. Окисленный гемоглобин является слабой кислотой, а восстановленный — слабой щелочью, когда в кровь добавляют CO_2 , угле-

кислота расщепляет окисленный гемоглобин и кровь отдаст свой кислород в ткани.

Чем глубже дыхание, тем меньше O_2 пойдет в ткани — 2-й фактор тканевой гипоксии. 3-й фактор гипоксии — нарушения деятельности дыхательных ферментов. Этот фактор уменьшает CO_2 в тканях, вызывает нарушение тканевого обмена, т. к. вызывается тканевая гипоксия, несмотря на спазм сосудов, понижает содержание CO_2 в тканях. Тканевая гипоксия опасна, она нарушает обмен в клетках, тем самым повреждая их.

Все нижеперечисленные симптомы тканевой гипоксии являются следствием недостатка CO_2 в тканях. Сюда относятся: атеросклероз, нефрит, астма, ринит, эндакрит, мигрень, крапивница, отек Квинке, экзема. Эти симптомы исчезают при нормализации CO_2 .

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Поиск аллергена — неоправданный труд. Сама аллергия является вторичным признаком на гипервентиляцию.

Факторы, связанные с понижением CO_2 и крови (гипокарбия):

1-й фактор — спазм гладкой мускулатуры.

2-й фактор — повреждение сосудистой ткани, увеличение ее проницаемости.

Сосудистую стенку повреждает недостаток CO_2 . При гипервентиляции CO_2 попадает как в артериальную, так и в венозную кровь, отсюда возникает тромбоз.

3-й фактор. Повышение холестерина (гиперхолестерина). Синтез холестерина идет только в печени и только 1/5 его попадает из пищи. Холестерин — это биогенный изолятор для оболочивания клеток с целью сохранения в них CO_2 . При повреждении стенок сосудов, в повреждение проникает холестерин и там откладывается.

CO_2 регулирует отложение холестерина. Уменьшение CO_2 на 1/10 в альвеолах и в крови увеличивает содержание холестерина в крови на 10%.

4-й фактор. Повышение свертываемости крови. Этот фактор является причиной многих болезней.

ГИПЕРТОНИЯ

Повышение А/Д — компенсационный фактор на тканевую гипоксию. Большинство врачей придерживаются мнения, что А/Д повышается с возрастом, но это неверно.

Гипертония и стенокардия исправляются. Средние цифры А/Д не зависят от возраста и равны 130/80 (жизненная константа).

У женщин они ниже на 5 мм. Хроническая гипервентиляция ведет к снижению CO_2 , что приводит ко всей последующей патологии.

ЭТИОЛОГИЯ

1-й фактор — понятие о пользе глубокого дыхания.

2-й фактор — отрицательные эмоции и нервная система. Особенно вредны неотрагированные отрицательные эмоции, они резко усиливают глубокое дыхание.

3-й фактор — отсутствие средств напряжения — гиподинамическая болезнь. Это болезнь отсутствия постоянного физического труда.

4-й фактор — усиление дыхания в горизонтальном положении. Спать лучше в кресле, больше сидеть, ходить, стоять. Во сне дыхание усиливается.

5-й фактор — наши привычки — кофе, чай, никотин, они усиливают дыхание. Сигареты снижают CO_2 за 1—1,5 часа на 0,25%.

6-й фактор — белковые вещества и жиры усиливают дыхание, вегетарианские блюда — уменьшают.

7-й фактор — голодание уменьшает дыхание.

8-й фактор — интоксикация тяжелыми металлами (ртуть, свинец).

9-й фактор — хронические инфекции (стрептококк, стафилококк).

10-й фактор — сон на спине увеличивает глубокое дыхание (нормальный сон на животе или на левом боку).

ЗАНЯТИЕ СЕДЬМОЕ

Уменьшает дыхание — ментол, валидол, мята, бромиды, валериана, препараты раувольфия, снотворное.

Кодеин, диспин, героин повышают тонус гладкой мускулатуры. Отхаркивающее — подорожник.

У здоровых людей дыхание во сне уменьшается. Болезнь гипервентиляции полиэтиологична.

ПАТОГЕНЕЗ ГИПЕРТЕНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

При гипервентиляции CO_2 в крови понижено, отсюда происходит спазм артериальных сосудов. В капиллярах O_2 уходит и клетка больше забирает O_2 . Водные процедуры уменьшают дыхание, при этом температура воды должна быть приятная. Физические упражнения необходимы, но без глубокого дыхания. Загорать рекомендуется в марте, апреле, сентябре и октябре, когда солнце ослаблено.

Угнетать дыхательный центр можно силой воли. Гипервентиляция уменьшает CO_2 в нервных клетках, что приводит к их возбуждению, к усилению их чувствительности, острее воспринимаются эмоции. Усиление дыхания снижает CO_2 — порочный круг.

У астматиков гипервентиляция ведет к поражению легких. В крови уменьшается содержание CO_2 , а это возбуждает дыхательный центр, он усиливает дыхание и приводит к снижению CO_2 в альвеолах, вызывает ги-

поксию крови. Гипоксия крови, непрерывно возбуждая дыхательный центр, усиливает дыхание и в конечном счете ведет к пневмонии, пневмосклерозу, их эмфиземе. Нет астмы без эмфиземы. Первый приступ астмы подготавливается годами.

Задержка после выдоха является основным показателем астмы, гипертонии, стенокардии.

СПОСОБЫ УДЛИНЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ

1. Использование симптома (закатывание глаз вверх).
2. Отталкивание (самомассаж, поглаживание).
3. Лыжные движения.
4. Принятие водных процедур.
5. Задержки на свежем воздухе.
6. Полное расслабление мышц перед задержкой и резкое их напряжение к концу задержки.

ПАРАДОКСЫ ДЫХАНИЯ

1. Глубокое дыхание, считаемое панацеей от всех болезней, наоборот, является источником этих болезней.
2. Чем глубже дыхание, тем меньше кислорода поступает в клетки организма.
3. Чем больше углекислоты в клетках, тем больше кислорода.
4. Чем глубже дыхание, тем сильнее болен человек.
5. Углубить дыхание легко (замыкается порочный круг или, другими словами, возникает положительная обратная связь), а сделать его поверхностным трудно.
6. Знать норму своего дыхания очень важно, но нигде об этом не написано.
7. У здоровых людей во сне дыхание становится реже, у больного, наоборот, углубляется.
8. При физической нагрузке CO_2 у здоровых увеличивается, а у больных уменьшается.

Примечание: в настоящем экземпляре возможны описки из-за неточности конспектирования и размножения.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ*

Для лечения электротерапией из эбонита изготавливается кружок диаметром 110 мм и толщиной 10 мм. Сверху прикрепляется ручка из эбонита или дерева. Марка эбонита "А" или "Б". При трении эбонита о тело создаются биотоки. Биотоки вырабатывает тело. Создается поток биотоков, который действует на болезненное место.

Метод лечения

Идея открытия — "Электромагнитное биостимулирование противоположенного метаболизма при пониженной реакции организма" — заключается во введении дополнительной биоплазменной электроэнергии через кожу с помощью поглаживания по коже в течение 15 минут.

Отрицательные заряды статического электричества кружка эбонита переходят в организменную биоплазму, образуя в организме биотоки 5—8—10 ма, энергия которого через молекулы стимулирует трофические функции клетчатки.

Взять кружок в руку так, чтобы пальцы касались верхней части, приложить к больному месту. Производить легкое трение о тело. Движение по часовой стрелке.

Если процедуру производите не сами, а второй человек, то для создания замкнутой цепи второй человек в одной руке держит кружок, а другой рукой касается тела больного в любом удобном месте, движения круговые. Для хорошего скольжения посыпать тело тальком или детской присыпкой.

Один сеанс лечения — не более 15 мин.

Для детей — не более 10 мин.

Страдающим сердечным заболеванием — 10 мин.

ПРАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

ПАНАРИЦИЙ — нарыв на конечностях. Лечение проводится так: лечащий должен взять в свою ладонь палец, а второй рукой выше кисти больного проводить массирование эбонитовым кружком.

Время — 15 мин. Через 3—12 дней панариция не будет.

Необходимость в операции отпадает. При массировании через 3—5 минут почувствуются легкие удары в ладонь, а больной — подергивание в больном пальце. Боль прекращается. Процедуру проводить 1 раз в день. После процедуры кружок положить на больное место, перевязать полотенцем, платком, одеть и держать всю ночь.

ВОСПАЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УХА. Определено, что самый тепловой палец на руке — средний. Лечащий должен средний палец (предварительно

помыв) вставить в ухо больному, второй рукой водить кружок по кругу: лоб, левая щека, подбородок, правая щека. Время 15 мин. Повторять до прекращения болей (3 — 10 дней).

После процедуры нужно приложить к уху и завязать платком. Во время процедуры дремлет, хочется спать. После 4—7 минут нужно приподнять кружок на 1—2 мм над телом и продолжать движение по воздуху. Почувствуете ощущение легкого покалывания, продолжать 1 мин. Потом снова массировать тело 8—10 мин.

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА. Перед эпидемией гриппа за 2 дня проводить массаж лица (как воспаление уха) по 15 мин., а потом приложить кружок на рот и на нос по 3—5 мин. Если не сделали до эпидемии, то при заболевании делать эти процедуры.

ЗАПОРЫ, КОЛИТЫ. Лечащий проводит кружком движения по животу строго по часовой стрелке, через 2—3 минуты может возникнуть урчание в животе, выделение газов, а через 10—15 мин. позывы в туалет. Вторую руку лежащего можно положить под поясницу или касаться любой части тела. Время 15 мин. Через 10 дней прекратить на 5 дней. Потом по мере надобности. Такие процедуры можно проводить на детях, у которых плохой аппетит.

АППЕНДИЦИТ. Очень осторожно и только при начальных болях. При незначительных болях и в правом боку (паху) можно проводить легкое поглаживание 10—15 мин. Можно оставить кружок на всю ночь. Лечащий держит руку на пояснице.

КАМНИ В ПЕЧЕНИ, ПОЧКЕ, МОЧЕТОЧНИКЕ. Массирование поясницы по 10—15 мин. Движение небольшими кругами. Вторая рука лечащего ниже пупка. Камни рассасываются. Может выделиться песок. Количество процедур — 10—15.

ЯЗВА ЖЕЛУДКА, КИШОК. Движение небольшими кругами. Вторая рука лечащего на пояснице или против желудка. Массирование живота строго по часовой стрелке 10—15 мин.

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ. Помогает выделению мокроты и отхаркиванию. Массирование лопаток (со спины) 10—15 мин., вторая рука на груди.

АСТМА, ОДЫШКА. Как при воспалении легких. Можно изготовить пластинки и носить их как бусы, ниже шеи, толщина 2 мм. Связка по 15 шт. Массаж делать через день со стороны груди и лопаток. День — грудь, второй — лопатки — 10—15 мин.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ. Массаж печени со стороны живота. Вторая рука на пояснице. Полезно ночь поспать с кружком. Сеанс 10—15 минут.

ПОЛИАРТРИТ. Помощник (пол и возраст не имеют значения) гладит кружком, держа его в правой руке, туловище больного, живот или спину

круговыми движениями, левой рукой держит больного за пальцы левой стопы (замыкание электроцепи) — 5 минут. Затем — пальцы другой ноги — 5 минут, продолжая гладить туловище. Замыкая цепь, держит левую, потом правую руку. При отсутствии помощников — самопоглаживание больных суставов по кругу. На ночь прибинтовать кружок эбонита к наиболее болезненным суставам.

РАДИКУЛИТ. Массаж поясницы 10—15 мин. Вторая рука — где удобнее. Хорошо носить пояс из пластин эбонита, толщина 3—4 мм, 10—15 мин. Носить под рубашкой на голом теле. Делать массаж и носить пояс до прекращения болей. На ночь прибинтовать к болезненной области позвоночника.

РЕВМАТИЗМ, РЕВМОКАРДИН. При небольших нагрузках на сердце — массажирование мест 10—15 мин.

ГАЙМОРИТ. Массирование лица, как при воспалении среднего уха 10—15 мин. Положить кружок на ночь на область лба и носа.

ЯЧМЕНЬ НА ГЛАЗУ. При покраснении или не лопнувшем нарыве массаж лица и вокруг глаза 10—15 мин. Когда вскроется нарыв — потереть кружок на ладони и приложить ее к глазу, на глаз наложить марлечку на 10—15 мин.

ФУРУНКУЛЫ. Лечащий должен положить руку на фурункул (предварительно положить марлечку), а другой рукой с кружком массировать часть тела надалеко от фурункула. Можно массаж делать самому, если удобно достать больное место. В начале нагноения или покраснения, когда еще есть затверждение, можно массировать само больное место 10—15 мин. и день, пока не замкнет, не прорвет, а до заживления — 7—10 минут.

МИОЗИТ (продуло плечо). Массаж плеча 10—15 мин., 5—7 процедур. И на ночь прибинтовать кружок к больному месту.

Все нагноительные процессы прекращаются при массировании под действием эбонита.

ПОСЛЕ ИНФАРКТА. Пользоваться эбонитом можно, но очень осторожно. При легком покалывании в области сердца, массирование прекратить на 2 дня, потирание 5—10 мин.

ТРОМБОФЛЕБИТ (заболевание вен). Тромб — воспаленный или покрасневший участок натирать, можно легко поглаживать вблизи участка. Можно одеть эбонитовый пояс на больное место или приложить на ночь кружок и прибинтовать.

ГАНГРЕНА. После 10—15 процедур по 15 минут каждая появится ощущение тепла в больном месте. Само массирование обычное, как сказано ранее.

ГЕМОРРОЙ. Сделать из эбонита свечу. Свечу и анус смазать вазелином и легонько ввести во внутрь. Держать всю ночь, чтобы свеча не выпала.

ла, привязать бинтом за бортик и вокруг тела. При трещинах и болях при введении свечи — положить ее между ягодицами на 2—4 ночи, а потом вводить во внутрь. Процедуры повторять до прекращения болей или кровотечения. Прекращаются запоры, мягкий стул.

ВОСПАЛЕНИЕ МИНДАЛИН, АНГИНЫ. Массируется горло, лицо, лоб по 10—15 мин. Можно изготовить бусы из эбонита и носить на шее.

Таким же образом лечится: ларингит, фарингит, лимфоденит, тонзилит, конъюнктивит, лобные пазухи, гайморит, голосовые связки.

ГИПОТОНИЯ. Массируется верхушка плеча, затылок, затылочная часть головы, лицевая часть головы — до 10 мин. Через 10 дней перерыв.

ГИПЕРТОНИЯ. Легкое поглаживание лица не более 10 мин. При появлении покалывания в области сердца — прекратить.

ОНЕМЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ, ЗАБОЛЕВАНИЕ СУСТАВОВ. Массировать больные суставы. Через 10—15 дней сделать перерыв на 5—7 дней.

Не следует подвергать эбонит прямому солнечному попаданию (освещению), от этого он стареет и зеленеет.

Эбонит при трении на ладони издает запах резины, что подтверждает его эбонитовое происхождение.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, ЗУБНАЯ БОЛЬ, ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ I И II СТЕПЕНИ, РЕСПИРАТОРНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГАЙМОРИТ, ФРОНТИТ И Т. П. Поглаживание по лицу кружком круговыми вращениями (лоб, левая щека, подбородок, правая щека) — по часовой стрелке. Грипп — 2 раза в день по 15 минут. Все остальное — 1 раз в день по 15 минут. При сильном гриппе на ночь прибинтовать к груди или лопатке (при пневмонии) эбонитовый кружок.

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. Помощник по кругу гладит спину правой рукой, левую руку положив на грудь больного ближе к шее.

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДАРТЕРИИТ. Прибинтовать кружок к больному месту.

Лечебный кружок ГОНЧАРОВА для электротерапии

Гладить по коже медленно. Одно движение в секунду по кругу, без лишних усилий, нежно. При появлении неприятных ощущений прекратить.

Процедура 15 минут. Ручку кружка приклеить или прикрепить на винтовой резьбе. Для лучшего скольжения — тальк. Мыть горячей водой с мылом.

Размеры кружка: 110 мм диаметр, 1 см по толщине. Отклонения в мм несущественны.

Курс — 10 дней. Можно потом повторить.

Эбонит на солнце не класть — стареет (зеленеет).

Определение действия — при трении запах жженой резины.

Из опыта — эбонитовый кружок в каждой семье нужен для мобилизации внутренних сил организма и предупреждения извращений в нем.

МЕТАЛЛОТЕРАПИЯ*

* Из доклада Сафоновой Нины Михайловны в Институте курортологии 19.02.82 г.

Последние годы XX столетия характерны поисками неспецифических способов лечения, т. к. современная медикаментозная терапия, особенно седативные гормоны и антибиотики, привели к появлению лекарственной болезни. Возникновение лекарственной болезни заставило медиков обратиться к лечению травами, иглотерапией, точечным массажем и др. способами для повышения сопротивляемости организма. Еще Аристотель и Гелен знали о металлотерапии. Аристотель писал, что прикладывание меди на уши предупреждает синяк и что здесь что-то еще действует кроме меди, что медь лечит отеки и что при лечении язв кладут медные пластины.

В Древней Греции медь применяли для излечения глухоты и при воспалении миндалин. Во Франции в наше время лечат медью расстройство слуха.

Русский врач Григорьев работал над тем, как задержать действие металла при металлотерапии, т. к. если металл долго держать на теле, то образуется жар, боль, краснота, язвы. Несколько десятков лет у нас ведутся работы по изучению влияния металлов на организм животных и человека, но до сих пор металлотерапия недостаточно изучена и практически не применяется, за исключением нескольких врачей в городах СССР, которые используют медь для лечения.

При контакте меди, золота, цинка, свинца с кожей человека ток идет от металла к коже. При контакте серебра и олова идет в обратном направлении, т. е. от кожи к металлу. Металлы способны притягиваться и отталкиваться. Перед медиками встал вопрос: сколько времени можно держать металл на больном месте. Изучение медлечения началось с середины XIX века, но никаких законов выявлено не было.

С 1958 г. Сафоновой, а с 1975 г. другими врачами стали применяться медные диски при кожных болезнях. Они применяли аппликации из меди только когда есть сцепление металла с кожей (присасывание металла к коже), т. к. ими замечено, что организм в больном месте притягивает металл и держит его, а когда не надо, то организм отторгает металл.

Надо прекращать металлотерапию, когда окончательно отторгнется металл. Для установления этого проводится проверка.

При назначении металлотерапии вначале тщательно устанавливают диагноз, причем больные часто обращаются к врачу по поводу вторичного заболевания (например, тромбофлебит), но врач должен найти первичное заболевание (ушиб). Металл сначала накладывается или на два дня, или на ночь для проверки. При этом нужна внимательность к тому, как реагирует больной на металл. Так, например, одному больному приложили металл, сцепления не было с кожей и закрепили его лейкопластырем. Больному стало хуже. Под металлом появилась краснота, припухлость, во рту привкус металла, слабость, головокружение. Поэтому нужно руководствоваться следующим: если в данном месте есть сцепление с металлом, то можно прикладывать, а если нет, не надо. При хронических заболеваниях

особенно важно выявление первичного очага, если он и не беспокоит, т. к. прикладывание меди на вторичный очаг может спровоцировать заболевание или не получится должного эффекта. Первичный очаг будет давать сигналы бедствия при этом. Следовательно, при лечении нужен тщательный диагноз (найти правильно очаг).

Например, одна женщина после безуспешного лечения обратилась для лечения металлотерапией. Было установлено, что 15 лет назад ушибла поясницу и у нее осталась скованность движений. Ей было положено по обе стороны от крестца 7 медных дисков однокопеечных монет 1961 г., МАГ-1, т. е. медно-алюминиевый сплав, через 17 дней она танцевала, однако через 3 месяца ей стало хуже, началось обострение, вновь был проведен курс лечения. Оно повторялось несколько раз до полного излечения. И, вообще, при хронических заболеваниях время от времени нужно прикладывать металлические диски, т. к. центральная нервная система "помнит", что здесь заболевание. Аппликация меди снижает температуру, снимает боль, действует кровоостанавливающе, является сильным бактерицидным средством, активизирует водный и минеральный обмен, улучшает сон, успокаивает центральную нервную систему, активизирует действие инсулина в крови, усиливает лейкоцитные функции. Аппликация меди рассасывает доброкачественные опухоли (уплотнение грудной железы, фибромы матки, маститы и др.), излечивает туберкулез, все воспалительные процессы в организме (хронический отит, хронический бронхит, бронхопневмонию, воспаление мочевого пузыря, воспаление почек, легких, гайморит, воспаление в организме, инфекционные артриты, почечно-каменную болезнь, холецистит, полиартрит, диабет, кожные заболевания и др.). Излечивает радикулит, фолликулярный конъюнктивит, травмы различного происхождения, сердечно-сосудистую систему (сердце, вены, тромбозы), улучшает послеинфарктное состояние, болезни гастроэнтерологические (т. е. болезни желудочно-кишечного тракта, язвы желудка, 12-перстной кишки, гастриты, колиты). Аппликация меди восстанавливает слух, снимает шум в ушах, излечивает тендовагинит, послеоперационные грыжи, геморрой, холодные абсцессы, улучшает послеоперационные состояния, лечит ревматоидный артрит.

В Москве, в поликлинике № 150 (в Черемуховке) отоларинголог ОТРОКО лечит больных медью. Педиатр БЕЛОВА для лечения грудных детей применяет бесконтактный способ лечения медью (через марлевую прокладку). Сафоновой получен из Киева официальный документ от врачей общества "Спартак" об эффективности металлотерапии при ушибах, при травмах, радикулитах.

Больному с удаленной почкой и воспалением мочеточников проводили лечение металлотерапией. На область мочевого пузыря положили 20 монет. На следующее утро температура снизилась. Состояние улучшилось.

В Донецком медицинском институте было установлено, что медь проходит через кожу и при этом дезинфицирует. Медь в организме связывает токсины, склеивает бактерии (агломинация бактерий), при этом медь образует соединения, очень трудно растворимые.

Так, был вылечен от туберкулеза почек больной, которому врач положил медные диски на область, где расположены почки.

При фолликулярном конъюнктивите девочке присосали копеечные монеты в углах глаз, зрение ее нормализовалось.

При воздействии медных дисков в организме происходит активизация лейкоцитов. Медь лечит быстро. Если при воспалении легких наложить монеты на ночь, то температура к утру снижается.

У одного больного болел шов, к нему приложили медь, оттуда вышло уплотнение — забытая врачами нитка.

У женщины болела рука, она не могла согнуть ее до плеч, стали лечить руки (первичный очаг инфекционного артрита), наложили медь на руки, рука после этого распухла, появился жар, но скоро все прошло.

Больная 15 лет страдала почечно-каменной болезнью. В течение 3 месяцев она носила под поясом (только днем) 2 медные монеты, когда уменьшился диурез и РОЭ с 32 снизилось до 4, она прекратила лечение.

Медь хорошо обезболивает, когда в почках оксалатные камни. Если болит сердце, то монету кладут в подключную ямку и пробуют: сидит или нет? Если сидит, то носить ее нужно круглосуточно (закрепив пластырем) 10 дней. Боли пропадают.

В результате ушиба ног часто бывает тромбофлебит, чтобы его не было, нужно в ботинок под чулок положить медную монету. Медь хорошо лечит варикозное расширение вен. Монета должна прилепиться к ноге и носить ее нужно, пока она не станет скатываться под пятку. При ушибах груди появляется уплотнение. На него нужно положить монеты. Также можно вылечить фиброму матки. Монеты прикладываются к низу живота.

Медь снимает вредный эффект радиации при облучении раковых больных. Медные монеты излечивают геморрой. При этом монету надо класть ребром непосредственно на анальное отверстие, а вторую монету зажать выше ягодичными мышцами, но так, чтобы не соприкасались друг с другом.

Медь излечивает послеоперационную грыжу, так как уменьшает прочность соединительной ткани сухожилий.

При хронических заболеваниях нужны повторные курсы лечения на ночь. Медь хорошо вылечивает отит, гайморит, трахеобронхит. При гайморите надо прикладывать копеечные монеты на глаза на ночь. При трахеобронхите прикладывают на шею. Нельзя в начале заболевания применять медь до прихода арча, т. к. она меняет картину заболевания и трудно поставить правильный диагноз.

Медь излечивает глухоту. Для этого одну 2-копеечную монету прилепить на выпуклую кость за ухом, а другую к уху со стороны лица. При лечении монеты накладываются по мере сцепления с кожей.

При стукс а ухах монету прикладывают сзади на шею.

Так как медь снижает действие инсулина, то при лечении диабета можно снижать дозу инсулина.

При болях после перелома костей находящийся в медных монетах 1961 г. алюминий участвует в построении соединительной и костной ткани и снижает боль.

Медь ликвидирует бессонницу, т. к. успокаивает центральную нервную систему, придает днем бодрость организму, снимает головную боль, монету прикладывают к очагу боли.

Существует тренировка на сцепление монет с кожей. У женщины болело колено. Надо было приложить 6 монет. Прилипла только одна, тогда остальные наложили на колено, привязали и они постепенно все присосались и держались 2 недели. Они сами отлетели, когда произошло излечение.

При ушибах при прикладывании меди бывают временные ухудшения, потом все проходит.

При головной боли она проходит через 15—20 мин. после приложения монеты на лоб, виски, затылок 5-копеечных монет в зависимости от того, где болит. Лечение медью облегчает послеинфарктное состояние, а при инфаркте их надо класть в подключичную область (яму).

При меделечении применяются медные монеты выпуска до 61-го года. Такая монета называется МАГ-1 (медно-алюминиевый сплав); и применяются медные пластины шириной 50—60 мм и толщиной в соотношении 1:10. Медь применяется вакуумная МВ, МОБ, МОО, МГ. Лучше всего МВ, но только из листовой меди, а не из прутка. Размер монеты или пластины берется такой, чтобы не было провисания над кожей, т. к. в случае провисания вокруг появляются точечные кровоизлияния, которые потом исчезают, но могут появиться на морозе. Металл при применении периодически обжигают или смачивают соленым раствором.

При болях в пищеводе были наложены две монеты на пищевод, когда они отвалились, состояние пищевода нормализовалось.

Врач ИВАНЧЕНКО проверил метод металлотерапии и находит его очень действенным.

При ишемической болезни сердца нужно делать аппликации медью на воротничковую область в течение 4 дней. При общей слабости по утрам нужно накладывать медные пластины на болеактивную точку ХЭ-ГУ и болевую точку "УЗУ-САН-ЛИ".

Справка: болевая точка ХЭ-ГУ находится у лучевого края основания первой фаланги указательного пальца (в ямке между указательным и большим пальцами тыльной стороны кисти руки), болевая активная точка УЗУ-САН-ЛИ находится ниже коленной чашечки, несколько ниже головки и внутрь от калоберцовой кости, между большой берцовой мышцей и длинным разгибательным пальцем.

Древняя медицина Китая, Японии и индийских йогов утверждает, что в живом организме энергия течет по каналам и задержка ее в каком-то канале и недостаточность в другом приводит к нарушению гармонии в организме и начинается заболевание (нарушения энергии в этих каналах).

Все болезни относятся к 2 типам: болезни положительного типа (воспалительные), болезни отрицательного типа (хронические и образующие злокачественные опухоли).

Медики упустили из виду, что движение электрической энергии в организме идет по каналам.

В старину тромбофлебит лечили ходьбой босиком по росе. Этим спускали электроэнергию в землю.

Воздействие через активные точки на состояние болезни положительно типа увеличивает сдвиг в сторону нормализации. Золото и серебро могут лечить болезни отрицательного типа, медь больше лечит положительного типа. Это происходит потому, что электрический потенциал меди равен электрическому потенциалу тела человека.

Болевые активные точки тела имеют пониженные электрические потенциалы и они пропускают направление тока одного знака. Таким образом, ток меди сам выбирает нужную болевую точку. Это большое преимущество перед иглотерапией, где точно нужно знать активную точку.

У одного больного была травма: двойной перелом голени. На ноге пластырем он закрепил 6 монет по 3 копейки. Они держались 2 недели, потом он их снял, т. е. боль и опухоль исчезли. Когда болезнь возвратилась, он снова привязал 9 монет к ноге и все прошло.

Метод аппликации пластинами может быть использован при лечении людей любого возраста, в том числе беременных женщин, маленьких детей, стариков. Металл накладывают на несколько дней, затем перерыв до 3 недель, потом снова накладывают.

Можно накладывать при повторении курса другой металл. В среднем срок, когда металл находится на теле, 3—5 суток. Накладывать монеты или пластины нужно на активные точки кожного покрова, где ощущается наибольшая болевая чувствительность по данному заболеванию.

МАГНИТОТЕРАПИЯ

Юбилейные заботы не помешали профессору В. И. Классену готовиться к очередному турниру по теннису. Вот уже скоро 40 лет он числится в неизменных участниках соревнований теннисистов-перворазрядников. Летом он тренируется пять раз в неделю, зимой чаще двух раз не получается. Иногда, правда, его беспокоит левое колено. Суставы — это возрастное. Избавляется от болей он за два дня. Берет в руки по обыкновенному подковообразному магниту и водит ими с обеих сторон колена. 15 минут утром и 15 минут вечером. К концу второго дня все неприятности проходят.

Естественно объяснить эти чудеса гипнотерапией, предположить, что чудаковатый профессор убедил себя в целебных свойствах магнитов. Каждый знает, как хорошо влияет на человека любое средство, если человек поверит в него. Но профессору Классену нет нужды убеждать себя верить, достаточно того, что он знает, точно знает оздоравливающее влияние магнитного поля. Ведь омагниченная вода — это его научная специальность.

— Вся жизнь человеческая, — говорит профессор, — связана с водой. Мы сами состоим из нее, общаемся с ней на каждом шагу, но знаем о воде до обидного мало. И вовсе не потому, что не изучаем ее. Исследований во все времена было немало. Однако предмет этих исследований столь непостоянен, столь неожиданно меняет свои свойства, что великий БОРНАЛ воскликнул однажды: "Вода, эта древнейшая из тайн, вечно ставила в тупик физиков и химиков!". Замечу, что удивляться приходится и ученым других специальностей. Во многих лабораториях засвидетельствованы изменения физико-химических и биологических свойств воды, обработанной магнитным полем, ультразвуком, электрическим током, дегазацией, замораживанием и оттаиванием. Изменения эти сводятся прежде всего к активации воды, и любопытны они в высшей мере. Однако нельзя сбрасывать со счетов два неприятных момента: неполную воспроизводимость экспериментов и недостаточную теоретическую обоснованность гипотез о причинах изменения свойств воды.

Тем не менее практика — критерий истины — не желает ждать, пока теоретики обоснуют причины. Она настойчиво стучится в сегодняшний день, требуя срочных мер. Нежелание ждать естественно и закономерно. Оно порождает поток просьб о помощи. Вот одна из таких конкретных просьб: "Расскажите, пожалуйста, об омагниченной воде. Говорят, она очень полезна. Но хотелось бы знать не слухи, а мнение специалистов. Как омагничивать воду в домашних условиях, какова допустимая напряженность поля при омагничивании воды, можно ли пить эту воду? Умельцы сами делают установки для омагничивания воды. Мне показали кустарный чертеж: две магнитные пластины, между ними диамагнитная трубочка диаметром 4 миллиметра. Эта система монтируется на выходе из

водоразборного крана. Проходя через нее, обычная водопроводная вода омагничивается. С уважением Анатолий Кврпукин, город Ялта".

Да, пройдя между магнитными полюсами, обычная вода обретает замечательные свойства. Поле, орошенное такой водой, дает урожай, на 15—20 процентов превышающий стандарты. Бетон, замешанный на омагниченной воде, обретает повышенную прочность и морозоустойчивость. Магнитная вода снимает накипь в паровых котлах. И, конечно, зафиксировано влияние омагниченной воды на человека.

Доктор медицинских наук Евгений Васильевич Утекин в 1971 году переехал из Ленинграда в Сочи по настоянию врача-уролога, считавшего, что ему, Утекину, страдавшему от почечнокаменной болезни, следует отказаться от нежесткой воды. Переезд совпал с некоторой пересориентацией в научных интересах Утекина. Евгений Васильевич заинтересовался воздействием магнитных полей на человека и вскоре возглавил отделение магнитотерапии сочинского санатория имени Кирова. У себя дома он смонтировал с водопроводным краном стандартное устройство для магнитной обработки воды "СО-2", выпускаемое в Ленинграде для садоводов-любителей. Максимальная напряженность поля в этой системе равна 1000 эрстед (100 миллитесл), что полностью отвечает принятым санитарным нормам. "О своей болезни я давным-давно забыл, — рассказывает доктор Утекин. — Песок отошел, камни растворились. У меня дома употребляют только омагниченную воду, другой просто нет. Ни на что не жалуюсь, давление у всех нормальное. Моей маме 85 лет, у нее тоже АД в норме, прекрасная память, короче самочувствие".

Между прочим, профессор В. И. Классен рассказывает, что тоже страдал от камней в почках. 15 лет назад он устроил себе полуторамесячный курс приема омагниченной воды. От камней не осталось и следа. Дома профессор пьет обычную воду, какую пьют и мы с вами, но рецидивов болезни не было.

Профессор осторожен. Он считает, что Утекин несколько рисковал, делая у себя дома постоянную установку для омагничивания питьевой воды. "Свойства этой воды нередко подвержены изменениям, — говорит он. — Один из факторов изменчивости — солнечный ветер, магнитные бури. Кто знает, как они повлияют на воду в этот раз. Пока нет сведений о негативном воздействии такой воды на человека, но исследований все-таки маловато, чтобы рекомендовать тотальное использование омагниченной воды. Я бы ограничился советом проводить двухмесячные курсы приема такой воды внутрь. Здесь полная гарантия безопасности, а польза тоже несомненна".

О свойствах магнитной воды узнали не сегодня, не вдруг.

70 лет назад у нас была переведена книга француза Дюрвилля об этом феномене. Потом об этом, конечно, забыли, а вот сейчас изучают весьма интенсивно. За последние годы в Советском Союзе было проведено несколько научно-практических конференций и симпозиумов по магнитотерапии и свойствам омагниченной воды, вышло немало печатных трудов. Самый замечательный — монография В. И. Классена "Омагничивание водных систем" (Москва, 1982 г.). Научные работы, если они пишутся вдохновенно, порой с интересом читаешь, даже не будучи специалистом. О своей воде Классен пишет словно о живом существе — добром, сильном,

но и канризном, не всегда понятном: "А теперь о коррозионной агрессивности ивской воды. Под влиянием магнитной обработки эта агрессивность по отношению к железу снижается до 50 процентов". Или: "Вода, содержащая примеси, обладает памятью на различные физические воздействия".

Память у магнитной воды не очень долгая. Она помнит воздействие поля примерно сутки. Предполагается, что ее оздоравливающее воздействие связано с повышением проницаемости биологических мембран, бактерицидными особенностями. Растениям она помогает лучше усваивать питательные вещества почвы. Человеку — очищать сосуды от чуждых соединений. А если это так, то магнитная вода должна стать неоценимым помощником при физических упражнениях, резко увеличивая их действенность.

Непостоянство свойств, а также памяти омагниченной воды связывают с тем, что в разных географических точках наша привычная вода имеет самые разные примеси, от которых собственно и зависит степень омагниченности.

Но сам факт оздоравливающего влияния такой воды бесспорен. В Ростовском областном врачебно-физкультурном диспансере применили проверенный способ "плацебо": больным назначали два вида ванн — с омагниченной водой и обыкновенной, но якобы активированной постоянными магнитами. Очевидный эффект дала только омагниченная вода.

Вот лишь ряд примеров, включающий уже имеющийся опыт оздоравливающего воздействия омагниченной воды.

Благодаря курсу ванн из омагниченной морской воды (10 сеансов по 10 минут каждый) Е. В. Утекину удалось снизить артериальное давление (до 30 мм), снимать головные боли, боли в области сердца, нарушения сна, утомляемость.

Кандидат медицинских наук Р. И. Михайлова в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии установила, что орошение (полоскание) омагниченной водой способствует удалению зубного камня, устранению пародонтоза, лечению флегмон. Омагниченная вода предотвращает образование зубных отложений, очищает эмаль от мягкого налета, прекращает кровоточивость десен.

В. В. Лисин и Е. Н. Иванов (Саратов) отметили улучшение состояния больных атеросклерозом при использовании омагниченной воды. Профессор Э. М. Шимкус (Симферополь) получил в клинике весьма обнадеживающие результаты при лечении мочекаменной болезни. С. И. Довжанский (Саратов) достиг значительных успехов в использовании этой воды при различных заболеваниях кожи.

Восхищают не только целебные качества омагниченной воды, но и легкость, с какой обретаются эти качества. Стоит обычной воде в оптимальном режиме пересечь силовые линии магнитов, как она на сутки становится "живой водой". Оптимальный режим — это достаточно сильная струя воды из-под крана, средняя напряженность поля, температура обычного диапазона (от самой холодной до кипятка). "Вода, прошедшая обработку магнитным полем, напряжение которого не превышает 2000 эрстед (200 миллитесл), отвечает санитарным нормам, — говорит доктор

Утехин. — В некоторых городах такая вода поступает из паровых котлов через водопроводную сеть в квартиры жилых домов. В централизованном порядке омагничивают таким образом лишь горячую воду. Насколько я знаю, это делают в Сочи, Саратове, некоторых других городах”.

Хотелось бы поговорить немного еще об одной удивительной разновидности H_2O — о талой воде. Издавна известно, что лучшие луга — альпийские, орошенные талой водой. Именно здесь самые яркие цветы, самые густые и сочные травы. Коровы, вспоенные талой водой, дают рекордные надоя. Куры несутся лучше, чем прежде. После долгой зимы жадно пьют выбивающуюся из-под снега воду воробьи и вороны, олени и лошади, собаки и кошки. Агрономы заселили два равноценных участка: один низкосортными семенами пшеницы, другой — точно такими же, но принявшими а день посева полуторачасовую снегоую ванну. С каждого гектара контрольного участка сняли по 11 центнеров, а с опытного 18,3 центнера пшеницы.

Лабораторные исследования показали, что талая вода отличается от обыкновенной прежде всего своей структурой, сходной с молекулярной структурой льда. Подобной структурой обладает и вода, связанная с клеточной протоплазмой нашего организма. Вода с упорядоченной структурой активно участвует в биоэнергетических процессах клетки. Возможно, талая вода не только повышает физические ресурсы организма, но и препятствует уменьшению содержания воды в клетках, что непосредственно связано с процессом старения. Не в этом ли секрет долгожительства горцев, постоянно пьющих воду, стекающую с тающих ледников и горных снегов?

Нам, живущим в средней полосе, далековато до белых шапок горных вершин. Однако холодильники есть в каждом доме, они помогут получить достаточное количество льда даже в самую жаркую погоду. Следует лишь учесть, что оттаивать воду лучше в плотно закрытом сосуде, нагревать ее надо до температуры не выше комнатной и, кроме того, (согласно данным О. А. Ласткова), память свсжелтой воды со временем слабеет. За 12 часов ее биологическая активность снижается примерно наполовину. Приблизительно с такой же скоростью, с какой падает активность омагниченной воды.

Надо полагать, магнитное поле только начинает свою оздоровительную карьеру. Ленинградец С. А. Фефер создал наборы маленьких магнитиков — манитофоры. Это своеобразные аппликаторы, которые применяют при различных остеохондрозах, сосудистых заболеваниях и других недугах. Они фактически дублируют воздействие магнитной воды и утверждены Минздравом СССР в качестве лечебного и профилактического средства. Свойства этих магнитофоров столь же удивительны, сколь и неожиданны. К примеру, если ловить рыбу на блесну с прикрепленным к ней маленьким эластичным магнитом, то клев увеличивается нередко в несколько раз.

Вот как работает маленький магнит. А самый большой — это наша земля. Изменения в магнитном поле земли связаны прежде всего с солнечной активностью. Создатель гелиобиологии А. Л. Чижевский в своей знаменитой книге “Земное эхо солнечных бурь” насчитал 27 земных явлений и процессов, зависящих от периодической активности солнца. В этом перечис: урожай кормовых трав, качество вина, миграция насекомых,

уровень кальция в крови, распространение психопатических явлений, частота несчастных случаев, нервная возбудимость, ухудшение в течении заболеваний, распространение эпидемий, вековой и годовой ход рождаемости и смертности.

Наблюдения и эксперименты последних лет показали, что человек очень чувствителен к слабым магнитным воздействиям. Эти воздействия не фиксируются нашими органами чувств, и поэтому представляются нам весьма загадочными. Но бесстрастные приборы регистрируют магнитные атаки достаточно четко, а ученые уже умеют нейтрализовать излишнюю солнечную активность.

Доктор Е. В. Утекин оборудовал три палаты с устройством, гасящим воздействие солнечных вспышек. Телстайп, установленный в московском НИИ прикладной геофизики, отстукивает прогноз магнитного возмущения, и за день до бури в эти палаты переводят наиболее тяжелых больных. На них вспышки не повлияют.

Однако не следует думать, что от магнитных полей один вред. Еще Чижевский заметил, что ослабление магнитного поля укорачивает жизнь подопытных крыс. В наши дни знаменитая группа ростовских исследователей (Л. Гаркави, Е. Квакина и М. Уколова) обнаружила, что двухмесячное воздействие магнитным полем на мозг подопытных животных резко омолодило их, увеличило подвижность и бодрость.




Рис. 4 — Магнитный прибор для переломов.

МАГНИТ ПОМОГАЕТ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

Сращивание костей можно значительно ускорить, если на зону перелома воздействовать тороидальным полем постоянного кольцевого

магнита диаметром около 50 мм. Такой магнит вы найдете в старых 1—3-ваттных динамических головках громкоговорителей и в устройствах для магнитной обработки воды типа СО-2, СО-3, которые продаются в хозяйственных магазинах. Необходимо извлечь магнит невредимым.

Найдите чистую пластмассовую баночку из-под обувного крема, прикрепите к ней тоже пластмассовую ручку длиной 120—150 мм. Кольцевой магнит поместите в баночку на клей типа "Момент-1", "Феникс". Устройство готово, остается удалить мелкие частицы магнитного сплава, т. е. они токсичны для кожных покровов.

Воздействие осуществляется круговыми перемещениями прибора по часовой стрелке над зоной травмы (см. рис.) по 20 мин. 2—3 раза в день. Половину времени магнит должен быть обращен к телу одной плоскостью, затем другой. Магнитное поле проникает без потерь через гипс и одежду, что упрощает процедуру. Через 15—25 дней в большинстве случаев исчезают боли и отечность, активизируются регенерационные процессы в мягких тканях и сосудах. Повторные курсы домашней магнитотерапии вы можете проводить в случае необходимости с интервалом 1—1,5 месяца.

Противопоказание: магнитные поля могут быть противопоказаны при гипотонии, инфаркте, инсультах, опухолях, заболеваниях крови и остеомиелите.

МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ

Магнитный браслет считается безлекарственным методом профилактики и лечения путем воздействия высокоградиентного магнитного поля на




Рис. 5 — Проекция органов на запястье руки.

Рис. 6 — Магнитный браслет.



биологически активные точки запястья руки человека. Необходимо отметить, что этот метод разрешен для применения в медицинской практике Минздравом СССР еще в 1988 г.

Такие браслеты травматичны и предназначены для длительного использования. Хорошо сочетаются с рефлексотерапией, лечебной физкультурой и спортивными тренировками.

Необходимо отметить, что магнитотерапия применяется для коррекции состояния сердечно-сосудистой системы, гипертонии ранней стадии, головных болей, болезней органов дыхания, лекарственных токсикозов, персультаний, стрессовых состояний, для повышения адаптационных функций при акклиматизации, гелиомагнитных возмущений и резких колебаниях погоды. Магнитный браслет также создаст хорошее настроение, повышенный тонус организма, стабилизирует артериальное давление.

Браслет надевается на лучезапястный сустав левой или правой руки. Он назначен для длительного ношения при ухудшении самочувствия в дневное время суток.

По данным древнекитайской медицины на лучезапястном суставе расположены жизненно важные точки меридианов, как показано на рисунке.

Ношение браслета противопоказано: при беременности (любые сроки); остром инфаркте миокарда, инфекционных заболеваниях; системных заболеваниях крови, индивидуальной непереносимости.

Очень важно отметить, что не рекомендуется магнитный браслет хранить вблизи от сильных магнитных источников и вместе с точными приборами.

ПОЯС МАГНИТОФОРНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ*

Магнитофорный лечебный пояс может быть эффективно использован для лечения и профилактики болезней опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы.

Назначение и область применения

Пояс с эластичными магнитами может быть использован для лечения и профилактики следующих заболеваний:

АРТРОЗ-АРТРИТ КРЕСТЦОВО-ПОЗВОНОЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ — рекомендуется ношение на позвоночно-крестцовой области 30 минут 3—4 раза в день. Курс лечения 14—21 день.

БОЛЕЗНЕННЫЕ МЕНСТРУАЦИИ — рекомендуется ношение на надлобковой области от 1 до 2 часов в день, 1—2 дня.

ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА — рекомендуется ношение 30 минут в день. Курс лечения 10—15 дней.

РАДИКУЛИТ — рекомендуется постоянное ношение на болевом участке (точка выхода пострадавших корешков) до снятия болевого синдрома, но не более 6—7 дней. После 4—5-дневного перерыва курс лечения можно повторить.

* Разрешен для применения МЗ СССР в 1986 г.

При всех перечисленных заболеваниях дозировка лекарственных препаратов может быть уменьшена на $1/3$ от исходной или отменена полностью.

Противопоказания к применению

- все виды электролечения;
- беременность (любые сроки);
- системные заболевания крови;
- индивидуальная непереносимость.

Уход за поясом

Допускается стирать пояс, предварительно вынув из кармашков-ячеек эластомагниты.

После стирки эластомагниты устанавливать в ячейки гладкой (рабочей) стороной к телу.




Рис. 7 — Пояс магнитный лечебный.

МАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ*

Магнитные клипсы тоже применяются как безлекарственный метод лечения и профилактики путем аурикулярной магнитотерапии и акупрессуры в амбулаторных и домашних условиях.

Назначение и область применения

Клипсы магнитные атравматичны и являются устройствами многократного пользования.

Хорошо сочетаются с рефлексотерапией, лечебной физкультурой и спортивными тренировками.

Аурикулярная магнитотерапия и акупрессура применяются для коррекции состояния сердечно-сосудистой системы, при головных болях, головокружении, при начальных стадиях гипертонии, при болезнях органов дыхания и простудных заболеваниях, лекарственных токсикозах, тошноте,

* Разрешено для применения в медицинской практике Минздравом СССР в 1988 году.




Рис. 8 — Проекция внутренних органов на ушной раковине.

при укачивании, стрессовых состояниях, переутомлении, для повышения адаптационных функций при акклиматизации, гелиомагнитных возмущениях и резких колебаниях погоды.

Клипсы ставятся на точки проекции внутренних органов на ушной раковине, которые показаны на рисунке 9.

Наименование биоточек, указанных на ушной раковине

- | | |
|---|---|
| 1. Пальцы стопы; голеноstopная область; | 27. Селезенка; |
| 2. Матха; | 28. Шейный отдел позвоночника; |
| 3. Седалищный нерв; | 29. Плечевой сустав; |
| 4. Толстая кишка; | 30. Лопатка; |
| 5. Аппендикс; | 31. Шея; |
| 6. Тонкая кишка; | 32. Точка тхан-мон; |
| 7. Диафрагма; | 33. Ягодица; |
| 8. Рот; | 34. Геморрой; |
| 9. Трахея; | 35. Наружные половые органы; |
| 10. Сердце; | 36. Мочеточник; |
| 11. Легкие; | 37. Нижняя часть прямой кишки; |
| 12. Три части туловища; | 38. Пищевод; |
| 13. Зрение I; | 39. Вершина козелка; |
| 14. Язык; | 40. Горло; |
| 15. Глаза; | 41. Нос; |
| 16. Пальцы кисти; | 42. Надпочечники; |
| 17. Запястье; | 43. Носовая полость; |
| 18. Колено; | 44. Зрение II; |
| 19. Почки; | 45. Яичко (мошонка); |
| 20. Живот; | 46. Регулирующая дыхание; |
| 21. Поджелудочная железа; | 47. Лоб; |
| 22. Локоть; | 48, 49. Точки анальгезии: |
| 23. Печень; | 48. Обезболивание при удалении верхних зубов; |
| 24. Плечо; | 49. Обезболивание при удалении нижних зубов; |
| 25. Область груди; | 50. Внутреннее ухо; |
| 26. Желудок; | 51. Миндалины. |




Рис. 9 — Магнитный клипс.

Если в течение 5—10 минут лечебный эффект не наступит, необходимо клипсы развернуть на 180° (т. е. поменять полярность) поочередно.

При длительном ношении клипсы магнитных рекомендуется один раз в час осуществлять 10—15 вращательных движений на 90°—120° относительно оси расположения магнитов.

Эти клипсы долговечные, т. к. уровень магнитной индукции сохраняется более 10 лет.

Не рекомендуется клипсы магнитные хранить вместе с точными приборами и часами.

Противопоказания

Нельзя пользоваться клипсами магнитными при:
беременности (любые сроки);
системных заболеваниях крови;
остром инфаркте миокарда;
инфекционных заболеваниях;
индивидуальной непереносимости.

Такие клипсы выпускаются промышленностью и продаются в магазинах.

МАГНИТНАЯ ВОДА

(Сила магнитных ванн)

Доктор медицинских наук Е. Утехин написал в "Советской индустрии" 14 ноября 1984 г. следующую статью о силе магнитных ванн.

— Омагниченная вода становится биологически активной и поэтому может оказывать терапевтическое действие.

Эксперименты показали, что употребление внутрь омагниченной воды повышает проницаемость биологических мембран тканевых клеток, снижает количество холестерина в крови и печени, регулирует артериальное давление, повышает обмен веществ, способствует выделению мелких камней из почек.

Были отмечены положительные результаты и при лечении омагниченной водой больных, страдающих экземой и различными заболеваниями кожи — дерматитами. В 1990 году на всесоюзной конференции по магнито-биологии и магнитотерапии подробно обсуждалось благоприятное воздействие ванн и турбулентного подводного массажа на больных с затяжными пневмониями, неспецифическими инфекционными полиартритами, ревматоидными артритами и некоторыми другими заболеваниями суставов.

Поскольку омагниченная вода оказывает нормализующее действие на нарушенный холестериновый обмен при атеросклерозе и положительно влияет на течение заболевания, то ряд ученых рекомендует пить ее не только в лечебных целях, но и для профилактики атеросклероза.

Необходимо отметить, что физико-химические свойства при магнитной обработке изменяются в большей степени у воды, в которой растворено больше солей, следовательно, и лечебное действие ее будет выше. На основании этого в санаториях Сочи в 1973 году впервые стали применять метод лечения омагниченной морской водой. Ванны назначались больным, страдающим гипертонической болезнью. После проведенного курса лечения у большинства больных исчезли жалобы на головные боли, шум в ушах, быструю утомляемость и боли в области сердца. Почти у всех пациентов снизилось артериальное давление и нормализовался ночной сон. Сегодня минеральные ванны с омагниченной водой применяются на многих курортах страны. Однако необходимо организовать эти ванны в домашних условиях. Вот что предлагаем для омагничивания минеральных ванн в домашних условиях.

Необходимо купить в хозяйственном магазине устройство для магнитной обработки воды УМОВ — 4008 (Рис. 10).




Рис. 10 — Устройство для магнитной обработки воды. Состоит из корпуса, двух штуцеров и набора магнитов.

Данное устройство, предназначенное для магнитной обработки воды на садовых участках, можно использовать для указанных ванн.

Устройство монтируется на шланг внутренним диаметром 20 мм. И вода при прохождении через устройство омагничивается. Давление воды, пропускаемой через устройство, не должно превышать 2 атмосфер, что вполне подходит для его применения в домашних условиях.

Примечание. Во избежание размагничивания постоянных магнитов устройство не должно соприкасаться со стальными и чугунными деталями, подвергаться ударам.




Рис. 11 — Приспособление для растворения морской соли в воде.

Затем необходимо достать или самому изготовить простое приспособление для растворения морской соли в воде.

На рисунке № 11 показано устройство приспособления. Корпус (коробка) должен быть неметаллическим.

Как организовать ванну.

Необходимо иметь следующее:

1. Устройство для магнитной обработки воды.
2. Приспособление для растворения соли.
3. Шланг с отверстием 20 мм.
4. Морскую соль (продается в аптеках).

Таким образом, когда открываете кран, вода проходит через приспособление: для растворения морской соли, затем проходит через устройство для магнитной обработки воды, после чего выходит соленая омагниченная вода. Необходимо чтобы вода выходила из крана медленно, чтобы соль успевала раствориться. Также вода должна быть не очень горячая. Время от времени открывать приспособление и добавлять морскую соль.




Рис. 12 — Схема ванны.

ЧЕЛОВЕК
И МАГНИТНЫЕ БУРИ

Магнитные бури*, перепады атмосферного давления, смена температур оказывают неблагоприятное действие на здоровье людей.

Большое число людей чувствует предстоящее изменение погоды. Накануне люди с ослабленным здоровьем испытывают боли в суставах, сердце, головную боль, плохо спят и т. д.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ И КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМЫ

Во время магнитных бурь наблюдается ухудшение состояния больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышается артериальное давление, ухудшается коронарное кровообращение. Магнитные бури вызывают в организме человека, страдающего заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обострения (инфаркт миокарда, инсульт, гипертонический криз и т. д.).

Сейчас, когда мы заранее узнаем время наступления магнитных бурь, то можем заранее предупредить эти обострения. Чтобы уберечь организм человека от ухудшения здоровья, нужно еще до наступления неблагоприятной погоды любыми способами укреплять здоровье. Это достигается не только медикаментозными средствами.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Магнитные бури оказывают неблагоприятное влияние на больных, страдающих заболеваниями органов дыхания. Под действием магнитных бурь изменяются биоритмы. Состояние одних больных ухудшается до магнитных бурь, а других — после. Приспособляемость таких больных к условиям магнитных бурь очень мала.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Во время магнитных бурь наблюдается ухудшение состояния людей, страдающих психическими заболеваниями. Увеличивается число несчастных случаев и травматизма на транспорте.

Центральная и вегетативная нервные системы очень чувствительны к геофизическим явлениям.

И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Чем дальше на Север, тем интенсивнее возмущенность магнитного поля во время магнитных бурь. И чем дальше на Север, тем сильнее влияние на состояние здоровья людей в период магнитных бурь.

* Мизун Ю. Г., Мизун М. Г. Магнитные бури и здоровье, Москва, 1990 г.

Возрастает число преждевременных родов, токсикозов, в этот период наибольшая заболеваемость раком, обострение глазных болезней.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Главное правило состоит в том, чтобы повышать резервные возможности организма. Для того, чтобы не реагировать на метеороусловия, необходимо постоянно укреплять здоровье, для чего пользоваться не только медикаментозными средствами, но заниматься физкультурой, правильно организовать режим работы и отдыха, питание.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

У больных, страдающих ишемической болезнью сердца, нарушается адаптация к новым более тяжелым условиям. Таким больным рекомендуется накануне магнитной бури применение медикаментозных средств — психовегетативные регуляторы, снотворные препараты, беллатон и беллюид, дибазол, аскорбиновую и глютаминовую кислоты.

В состав лечебных препаратов включать аспирин и препараты никотиновой кислоты. Больные, страдающие ишемической болезнью сердца не должны пользоваться лечебными физиотерапевтическими процедурами.

Больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется:

- 1) Во время магнитных бурь ограничить физическую нагрузку.
- 2) Увеличить дозировку лекарств, назначенных больным врачами.
- 3) Подключить такие препараты, как: настойка валерианы, пустырника, пиона, седуксен, элениум.
- 4) Больным, страдающим нейроциркулярной дистонией, рекомендуется применение диуретиков.

5) В связи с повышением свертывающего потенциала крови и усиления функции тромбоцитов рекомендуется принимать дезагрегенты (аспирин, трентал, никотиновую кислоту).

6) В связи с тем, что во время магнитных бурь ускоряются процессы окисления, необходимо это компенсировать антиоксидными препаратами (глютаминовой кислотой, аскорбиновой кислотой и т. д.).

Для предупреждения обострений гипертонической болезни и ишемии сердца накануне неблагоприятных геофизических и метеорологических дней рекомендуется:

1) В период магнитных бурь и в весенне-зимний и осенний периоды применять валериану, пустырник, седуксен, мелпробонат, триоксазин, тазепам и др.

2) Для усиления профилактической терапии лицам с выраженной дисфункцией гипоталамуса (вегетативно-сосудистые кризы) целесообразно использовать пирроксан, аминозин, бетаадреноблокаторы.

3) Больным с признаками циркулярной гипоксии мозга и цереброциркулярной недостаточности из-за шейного остеохондроза или атеросклероза

во время магнитных бурь следует использовать препараты, улучшающие кровообращение мозга (кавинтон, компламин, гизентал, эуфиллин, стугерон, циннаризин) в сочетании с анальгином или амидопирином, горчичниками, легким массажем шейно-воротниковой зоны.

4) Больным, страдающим ишемической болезнью сердца, следует увеличить прием пролонгированных нитратов (нитронг, сустак — форте или нитросорбид) до 5—7 раз в сутки, снижая дозу в спокойные дни до 1—2 раз.

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Занятия физической культурой способствуют повышению устойчивости организма к действию неблагоприятных внешних факторов и укреплению приспособляемости организма. Физические нагрузки способствуют улучшению обмена и кровообращения, активизации восстановительных процессов, питанию органов, укрепляется нервная система.

Предлагается комплекс упражнений.

Упражнение № 1. Исходное положение — стоя, руки на бедрах. Сделать медленный, умеренной глубины вдох, втянуть живот, резко и сильно выдохнуть.

Упражнение № 2. То же исходное положение. Сделать резкий и сильный выдох, максимально втянуть живот и задержать дыхание на 6—8 секунд. Свободно расслабить мышцы брюшной полости.

Упражнение № 3. Исходное положение — сидя на полу с поджатыми ногами. Спина выпрямлена, руки на коленях. Голова опущена, глаза закрыты или подняты вверх, мышцы лица, шеи, плеч, рук и ног полностью расслаблены. Сделать медленный, умеренной глубины вдох и вновь задержать дыхание на 1—2 сек.

Упражнение № 4. Медленно вдохнуть 1—2 сек., задержать дыхание — 2 сек. Несколько раз повторить.

Циркулярные упражнения.

1) Ходьба на месте в быстром темпе или бег на месте.

2) Руки с эспандером вытянуть вперед. Растянуть эспандер — вдох, отпустить — выдох. Повторить 15—20 раз.

3) Поставить ноги шире плеч, руки с эспандером поднять над головой. Растянуть эспандер, наклониться вперед — вниз.

4) Лежа на спине, руки за головой. Сесть, достать руками пальцы вытянутых ног, втянуть живот. Сгибание — выдох. Повторять 15—20 раз.

5) Лежа на спине, руки вытянуть вдоль туловища. Поднять выпрямленные ноги, продолжая движение коснуться пола пальцами ног за головой.

6) Ноги на ширине плеч, руки за головой, локти в сторону. Не отклоняя туловища вперед или назад, перенести вес тела на согнутую ногу. Сделать глубокий полуприсед — выдох.

АКУПРЕССУРА

Акупрессура является дальнейшим развитием акупунктуры. Она использует те же точки (и меридианы), что при акупунктуре, однако вместо игл используются большой и указательный пальцы рук. Эффект одинаков.

Нажатие на правильные точки освобождает от многих недугов.

Акупрессура не только утоляет боль, но сокращает также и время болезни, устраняет нарушения функциональной деятельности органов, ликвидирует органические последствия неврозов (тревоги, беспокойства, болезни) и нарушения напряжения (стрессового состояния).

Плакаты, издаваемые миллионными тиражами, поясняют подробности способа лечения. Нижеприведенное фото показывает один из таких плакатов с разъяснениями, каким образом следует применять акупрессуру в лобной части лица и области глаз.

Каждый, кто будет выполнять легко запоминающиеся правила акупрессуры, сможет помочь сам себе.

Знание важнейших точек на теле и лечебные показания — это то, что должны знать больные.

Акупрессура снимает боль и лечит те болезни, которые вызваны недостаточностью нервной системы, а это в наше лихорадочное время — каждая вторая болезнь.

Но прежде всего она является надежным, безопасным и действенным средством против боли и это без какого-либо побочного действия.

Акупрессура не причиняет ни боли укола иглы, ни вызывает кровотечения и исключает внесение инфекции при надавливании пальцами а организм, она ПРОСТА, НАДЕЖНА И БЕЗОПАСНА.

АКУПРЕССУРА является методом САМОЛЕЧЕНИЯ.

Между тем специалистам-экспертам известно уже 1030 точек — мест акупунктуры на теле человека, но в то же время открытие специальных, полных секретности точек, до сих пор не завершено.

Наряду с основными линиями (меридианами) и дано испытанными точками постоянно открываются новые "специальные" точки, которые (при воздействии на них) оказывают положительный эффект при определенных расстройствах и нарушениях функциональной деятельности органов человека. Сюда можно отнести открытие новых наркозных точек, локализуемых воздействием на ушную раковину.

КАКИЕ ИМЕЮТСЯ ВИДЫ ТОЧЕК

Места расположения точек акупунктуры и акупрессуры известны давно. Они расположены на 14 линиях (меридианах), которые давно уже исследованы. Эти меридианы имеют определенные наименования как — "Большой сердечный" (Мастор сердца), "Трехступенный обогреватель" или "Меридиан-гувернер", и при этом всегда указывают три вида точек:

"Гармонизирующие точки" — лежащие в начале и в конце линии (меридиана). При воздействии на них методом акупрессуры наблюдаются гар-

моничные отзвуки этого воздействия во всех органах, относящихся к этому меридиану.

"Возбуждающая точка" — на каждой линии (меридиане) существует лишь одна точка. Ее акупрессура активизирует реакцию и работоспособность относящихся к данному меридиану органов.

"Успокаивающая точка" — также существует лишь одна на каждой линии (меридиане). Подавляет, успокаивает, снимает нервное состояние. Ощущения при ее акупрессуре наиболее благоприятны.

Облегчение приносит успешная акупрессура системы так называемых "сигнальных точек" (тревожных). Каждый основной орган имеет свою сигнальную точку. Правильная, по всем правилам проведенная акупрессура этой точки способствует немедленному улучшению состояния человека (снижению недомогания) и в особенности уменьшению боли (болевого синдрома).

Наконец, в последние годы был открыт целый ряд точек, так называемых "специальных точек", относящихся к строго определенным недугам (заболеваниям).

ЛЕЧЕБНЫЕ ПОКАЗАНИЯ АКУПРЕССУРЫ

Кто хочет (или может) сам себе помочь, не должен знать и использовать всю систему меридианов и точек акупрессуры.

В настоящем разделе совершенно сознательно не приводятся для использования пациентами все производные точки. Для достижения эффективности лечения достаточно знать, какая точка где расположена и продолжительность воздействия на нее. Акупрессура помогает против основных заболеваний современности. К ним не относятся болезни с такими заболеваниями, как оспа, чума, холера, инфекция которых почти побеждена.

В настоящее время человек страдает от перевозбуждения, перенапряжения и стрессов. Следствием этого является истощение организма, подавленное состояние, сердечная недостаточность и недостаточность кровообращения, гипотония и холодность. Ошибочное возмущение бессознательных (вегетативных) нервов может, однако, привести к полнейшему изменению функционирования органов, т. е. к инфаркту, артериосклерозу или язве желудка и т. д. Кроме того, сюда же относятся и более простые, но часто мучительные расстройства — сна, головные боли и зубная боль.

Все это следует предотвратить.

Акупрессура является оружием, с помощью которого человечество защищается от всякого рода стрессов. Она восстанавливает равновесие нервной системы.

КАКАЯ ТОЧКА ОТНОСИТСЯ К КАКОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

Каждая система органов человеческого организма имеет прочную связь с определенными точками акупрессуры. Такими же прочными являются и связи точек акупрессуры с нежелательными функциональными расстрой-

ствами организма (например, с высоким кровяным давлением, одышкой или гриппозным состоянием).

Ниже приведены изображения важнейших точек акупунктуры, влияние на которые, а зависимости от обстоятельств, являются излечивающим при наиболее часто встречающихся заболеваниях фактором.

Это могут быть и "Успокаивающая точка" (при расстройствах сна) и "Возбуждающая точка" (при низком кровяном давлении), и "Гармонирующая точка" (при тревожном состоянии общего невроза), и "Сигнальная точка" (при коликах в суставах) или "Специальная точка" (при импотенции). Однако лечение не применяется вне зависимости от различного происхождения точки.

КАК ПРАВИЛЬНО НАЙТИ ТОЧКУ АКУПРЕССУРЫ

Фотографии и приведенные графические изображения (рисунки) показывают точные места расположения точек только в том случае, когда анатомические сведения содержат лишь основные, общие данные.

Почти всегда бывает так, что искомая точка акупунктуры реагирует на сильное нажатие резким (четким) болевым сигналом (импульсом), что выделяет ее на искомом участке тела.

Ввиду индивидуальности сложения тела, различия его, на практике точки акупунктуры не у каждого пациента расположены в точно указанном на схеме месте. Отклонения расположения могут быть в различных вариантах, поэтому на рисунках (схемах) пунктиром обозначена величина этого отклонения, отражающая индивидуальные особенности.

КАК ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ТОЧКУ АКУПРЕССУРЫ

Китайцы разделяют степени воздействия на лечебные точки трояким образом:

- при острых болях и при первичном лечении показано применение легкого кругового массажа точки, который проводится кончиком указательного пальца руки.

- Продолжительность массажа — от одной до пяти минут;

- при хронических заболеваниях, в зависимости, однако, от общего состояния пациента, лучше всего и надежнее применять точечный массаж средней силы. Рекомендуются многократный массаж в течение дня.

- Продолжительность акупунктуры — до тридцати (в зависимости от обстоятельств) секунд;

- сильная прессура — производится, главным образом, с помощью большого пальца. Однако в частных случаях возможны и другие варианты.

Когда искомая точка найдена на теле, кончиком указательного или большого пальца слегка прикасаются к кожному покрову, затем начинают производить круговые движения пальцем, сдавливающие кожу относительно кожной или мышечной ткани в ритме два оборота в секунду.

При этом следует обращать внимание на то, чтобы палец постоянно оставался на одной (необходимой) точке тела.

При симметричном воздействии на точки акупунктуры следует быть особо внимательным.




Рис. 13 — Места расположения точек акупунктуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Это может быть лишь редкий случай. Акупунктура в своей элементарно упрощенной форме не может заменить необходимого медицинского лечения (например, операция аппендицита и гнойного аппендицита), однако

она может применяться как болеутоляющее дополнительное лечение, а также применяться при оказании первой медицинской помощи.

Противопоказана акупрессура при:

— тяжелых органических заболеваниях сердца и системы кровообращения;

— в период беременности;

— при сильном переутомлении.

Поскольку при акупрессуре противопоказаны какие-либо локальные (местные) изменения кожного покрова, то в таких случаях следует выждать полного излечения кожного заболевания.

При внезапном изменении состояния здоровья пациента, его самочувствия во время проведения акупрессуры, немедленно следует прекратить, хотя это бывает крайне редко.

ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!

СЯДЬТЕ ИЛИ ЛОЖИТЕСЬ НА СПИНУ, расслабьтесь.

Следите за тем, чтобы отсутствовали какие-либо раздражители (разговоры родных, телефонные и другие звонки и т. п.) и **НА ВРЕМЯ ОТВЛЕКИТЕСЬ ОТ ВСЕГО.**

Кончик указательного пальца положите слегка на необходимую точку тела (искомую точку акупрессуры).

Легко надавив на кожу, начинайте одновременно производить круговые движения пальцем, следя при этом, чтобы палец при движении не сходил с данной точки. **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АКУПРЕССУРЫ ОТ ПОЛМИНУТЫ ДО ПЯТИ МИНУТ.**

Действие всегда наступает быстро и опускается всегда долгое время. **АКУПРЕССУРУ МОЖНО МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.**

АСТМА

(одышка, кашель)

(отвыкание от курения)




Рис. 14 — Астма (одышка, кашель).


Свойства — Специальная точка.

Воздействие — прессура проводится указательным пальцем в легкой форме продолжительностью до одной минуты. Прессуру можно повторить в любое время.

В случае отвыкания от курения АКУПРЕССУРА проводится при возникновении желания курить. В данном случае проводится кратковременная, но интенсивная (до боли) акупрессура. Желательно проведение такой терапии при гипотонии (пониженном кровяном давлении).

БОЛЕЗНИ ГЛАЗ

(рябь в глазах, дрожание век, боль глаз)



Свойства — Успокаивающая точка.

Воздействие — легкая акупрессура глазных впадин в последовательности, обозначенной цифрами.

Во время акупрессуры глаза закрыты.

Рис. 15 — Болезни глаз.

ВОЗБУЖДЕНИЕ АППЕТИТА

Свойства — Возбуждающая точка.

Воздействие на точку стимулирует аппетит и обмен веществ.

Воздействие — прессура, в зависимости от обстоятельств, применяется неоднократно в течение дня перед едой, проводится ритмично по 20 секунд средней силы нажатием ногтя большого пальца попеременно на обеих руках (мизинцах).




Рис. 16 — Возбуждение аппетита.

ПРИТУПЛЕНИЕ АППЕТИТА




Рис. 17 — Притупление аппетита.

Свойства — Успокаивающая точка.

Воздействие — прессура. Применяется в виде легкого массажа при возникновении аппетита.

Продолжительность — 30 секунд.

Акупрессура проводится попеременно на обеих руках.

Воздействие на точку притупляет аппетит и регулирует (стабилизирует) обмен веществ.

БОЛИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

(колики)

Свойства — Успокаивающая точка.

Воздействие — легкая акупрессура указательными пальцами обеих рук одновременно.

Продолжительность акупрессуры — до наступления улучшения состояния.

Эффективно применение в качестве предупредительного средства.





Рис. 18 — Боли желчного пузыря.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (боли в затылочной части)



Свойства — Специальная симметричная точка.

Воздействие — ритмичная и синхронная обеими руками сильная акупрессура.

Акупрессура может проводиться как указательными, так и большими пальцами рук.

Рис. 19 — Головная боль (боли в затылочной части).

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (боли в лобной части)

Свойства — Успокаивающая (симметричная) точка.

Воздействие — легкая акупрессура обязательно синхронная с двух сторон с помощью больших пальцев. Во время акупрессуры глаза должны быть закрыты.





Рис. 20 — Головная боль (боли в лобной части).

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (мигрень)



Свойства — Успокаивающая точка.

Воздействие — зажав точку между указательным и большим пальцами массирующей руки, проводить легкую ритмичную акупрессуру (с помощью указательного пальца). Продолжительность акупрессуры — до пяти минут.

Рис. 21 — Головная боль (мигрень).

ГИПЕРТОНИЯ (повышенное кровяное давление)

Свойства — Гармонирующая точка.

Воздействие — легкая акупрессура с помощью указательного пальца. Продолжительность акупрессуры — до пяти минут. Обязательный покой.

При длительном применении следует делать недельный перерыв.




Рис. 22 — Гипертония.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ




Рис. 23 — Головокружение.

Свойства — Гармонирующая точка.

Воздействие — сильная, интенсивная, но кратковременная акупрессура с помощью указательного пальца. При необходимости следует комбинировать с акупрессурой точки (при гипертонии), проводимой с помощью ногтя большого пальца интенсивным нажатием области ногтевого ложа мизинца противоположной руки.

ГРИПП

Свойства:

2 — Возбуждающая точка

3 — Успокаивающая точка.

Воздействие — акупрессура проводится в легкой форме кончиками указательных пальцев рук синхронно с двух сторон. Поочередно каждую точку массируют в течение одной минуты.




Рис. 24 — Грипп.

ДИСТОНИЯ




Рис. 25 — Дистония.

Свойства — Специальная точка.

Воздействие — обхватив рукою ступню, проводят акупрессуру большим пальцем со средним усилием.

Акупрессуру следует проводить утром или вечером с длительными интервалами.

Благоприятное воздействие оказывает проведение дополнительной акупрессуры — легкое покусывание зубами (резцами) кончика языка в ритме — 20x1 секунд.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛИ (расстройства желудка)

Свойства — Гармонирующие точки.

Воздействие — только легкая, но длительная терпеливая акупрессура. Желательно проведение акупрессуры лежа на постели. Акупрессура проводится с помощью указательных пальцев. В случае акупрессуры при поносе обязательна синхронность с обеих сторон.




Рис. 26 — Желудочно-кишечные боли.

ЖАЖДА

Свойства — Успокаивающая точка (единственная точка слизистой оболочки человеческого организма).


Воздействие — акупрессура точки слизистой оболочки, которая расположена на расстоянии примерно одного сантиметра от кончика языка, проводится в форме легкого покусывания языка (в данной точке) передними зубами (резцами) с ритмом 20x1 сек.

Особенность точки состоит в том, что до сих пор в человеческом организме не удалось определить (локализовать) других точек слизистой оболочки.

Поэтому данная точка, расположенная на центральной линии (меридиане) тела, является единственной.

Ни в области носа, полостей рта и гортани (глотки), ни на половых органах или кишечнике не существует зон акупунктуры и акупрессуры, как не проявляют точек акупрессуры и богатые нервами зоны повышенных болевых ощущений. Так, сильное возбуждение (стимулирование) данного региона осуществляется посредством воздействия на нервную систему (управление).

ЗУБНАЯ БОЛЬ



Свойство — Специальная точка.
Воздействие — сильная, интенсивная акупрессура в ритме 10 секунд с помощью указательного пальца (ногтем указательного пальца).

Рис. 27 — Зубная боль.

КАТАР ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Свойства — Специальная (симметричная) точка.

Воздействие — сесть спокойно. Глаза закрыты. Акупрессура проводится с умеренным усилием указательными пальцами обеих рук (большие пальцы подпирают подбородок).

Продолжительность акупрессуры — 64 круговых движения (8 раз по 8 круговых движения).




Рис. 28 — Катар верхних дыхательных путей.

ИНТЕНСИВНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

(коллапс)




Рис. 29 — Интенсивное кровообращение.

Применяется также при пониженном кровяном давлении (гипотония).

Свойства — Возбуждающая точка. Воздействие — интенсивная (до боли), но кратковременная акупрессура (ногтем большого пальца) мизинца противоположной руки.

При пониженном давлении рекомендуется проводить акупрессуру по утрам и постели.

Состояние покоя обязательно.

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

(закупорка сосудов, слабый кровоток и т. п.)

Свойства — Возбуждающая точка.

Воздействие — захватить средний палец одной руки между указательным и большим пальцами другой. Акупрессура проводится нажатием со средним усилием ногтем большого пальца в ритме биения сердца.

Акупрессура проводится одновременно на обеих руках, через минуту меняя средние пальцы рук.




Рис. 30 — Нарушение кровообращения.

ЛЕГОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ




Рис. 31 — Легочная недостаточность.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ только при женских расстройствах (вагинизм, спазмы влагалища)

Свойства — Возбуждающая (симметричная) точка.

Воздействие — легкая акупрессура большими пальцами обеих рук. Акупрессура кратковременная. При женских расстройствах акупрессура произвольная. Обязательно состояние покоя.

НАСМОРК

Все точки симметричные.

Воздействие — акупрессура проводится в легкой форме кончиками указательных пальцев синхронно с двух сторон.

Акупрессура каждой пары точек длится одну минуту.

Последовательность проведения — 1 — 2 — 3 — 4.

Акупрессура помогает так же, как предупреждающее, профилактическое средство.





Рис. 32 — Насморк.

ПОТЛИВОСТЬ



Свойства — Специальная точка.
Воздействие — легкая акупрессура с помощью указательного пальца.
Продолжительность — до трех минут.
Действие оказывается быстро при акупрессуре с правой стороны.
Действие с левой стороны значительно дольше.

Рис. 33 — Потливость.

КРЕСТЦОВЫЙ РАДИКУЛИТ

Свойства — Специальная точка.

Воздействие — проводится сильная акупрессура с помощью больших пальцев одновременно с двух сторон. Продолжительность акупрессуры — до двух минут.




Рис. 34 — Крестцовый радикулит.

ШЕЙНЫЙ РАДИКУЛИТ (прострел)




Рис. 35 — Шейный радикулит (прострел).

Свойство — Гармонирующая точка.

Воздействие — положить указательные пальцы на точки, а большими пальцами зажать тело в этом месте. Акупрессура проводится указательными пальцами синхронно с обеих сторон. Вначале легкая прессура, затем, усиливая. При необходимости акупрессуру повторить.

ВОЗРАСТНЫЕ РАССТРОЙСТВА (переходный возраст)

Свойства — Гармонирующая точка.

Воздействие — проводится легкая акупрессура кончиком указательного пальца, по возможности утром, с соблюдением режима полного покоя.





Рис. 36 — Возрастные расстройства (переходный возраст).

РАССТРОЙСТВА В ПЕРИОД МЕНСТРУАЦИИ



Свойства — Гармонирующая точка.

Воздействие — легкая акупрессура, многократно повторяемая в течение "Критических дней". Продолжительность акупрессуры — до наступления улучшения состояния.

Рис. 37 — Расстройства в период менструации.

ПОЛОВЫЕ РАССТРОЙСТВА

(импотенция у мужчин, холодность желаний у женщин)

Свойства — Специальная точка.

Воздействие — проводится чередованием легкой и сильной (интенсивной) акупрессуры указательным пальцем. Желательно проведение акупрессуры партнером. Состояние покоя необходимо.





Рис. 38 — Половые расстройства (импотенция мужчины, холодность желаний женщины).

ПОЛОВЫЕ РАССТРОЙСТВА (слабая эрекция у мужчин)



Свойства — Специальная точка.
Воздействие — легкая акупрессура указательным пальцем. Желательно проведение акупрессуры партнером. Следует соблюдать требование покоя.

Рис. 39 — Половые расстройства.

РАССТРОЙСТВО СНА

Свойства — Специальная (гармонизирующая) точка.

Воздействие — легкая акупрессура указательными пальцами в состоянии полного покоя. Действие эффективнее с правой стороны, чем с левой.



Рис. 40 — Расстройства сна.

БОЛИ РЕВМАТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА




Рис. 41 — Боли ревматического характера.

Свойства — Успокаивающая точка.

Воздействие — легкая, но продолжительная акупрессура (до семи минут) с помощью указательного пальца. Акупрессура проводится непрерывно на обеих руках.

При хронических болях точка акупрессуры выбирается с больной стороны тела. Следить за состоянием покоя.

БОЛИ СЕРДЦА

Свойства — Успокаивающая точка.

Воздействие — акупрессура проводится большими пальцами, зажав слегка кисть указательным и большим пальцами массирующей руки. Акупрессура легкая, лучше всего в лежачем положении.

Полный покой.




Рис. 42 — Боли в сердце.

СТРАХ (подавленное состояние) ОБЩИЙ НЕВРОЗ

Свойства — Гармонирующая точка.

Воздействие — прессура проводится в сидячем положении указательными пальцами обеих рук синхронно. Акупрессура легкая до пяти минут.




Рис. 43 — Страх.

БОЛИ В СУСТАВАХ

Свойства — Гармонирующая точка.

Воздействие — акупрессура проводится указательным пальцем. При острых болях — только легкая акупрессура. При хронических заболеваниях сильная (интенсивная) акупрессура. Продолжительность — до наступления улучшения состояния.




Рис. 44 — Боли в суставах.





Рис. 45 — Усталость.

УСТАЛОСТЬ, ПОТ (переутомление после бега или длительной ходьбы)

Свойства — Возбуждающая точка.

Воздействие — акупрессура проводится со средним усилием с помощью указательного пальца, не обхватывая при этом голень массируемой ноги. При необходимости акупрессура повторяется.


Рис. 46 — Усталость, пот (переутомление после бега или длительной ходьбы).



УСТАЛОСТЬ

Свойства — Возбуждающая (специальная) точка.

Воздействие — зажать мизинец правой руки между большим и указательным пальцами левой руки. Кончиком большого пальца проводится по возможности сильная (допустимо сильная) акупрессура. Процедура длится в течение часа. Рекомендуется повторение.



УШНАЯ БОЛЬ

Свойства — Гармонирующая точка.

Воздействие — легкая акупрессура проводится указательными пальцами. Действительна лишь в области пораженного уха. Продолжительность — до наступления улучшения.

Рис. 47 — Ушная боль.

**ТОЧЕЧНЫЙ
М А С С А Ж**

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА*

В основу точечного массажа положен тот же принцип, что и в основе иглоукалывания и прижигания, с той лишь разницей, что при массаже "жизненные точки" подвергаются воздействию кончиком пальца без повреждения кожи. Всего таких точек описано около 700, но наиболее часто применяются около 150.

Пальцевым надавливанием на строго определенные точки можно дозированно, избирательно и направленно воздействовать на функции различных органов и систем, регулировать обменные и восстановительные процессы.

Технике точечного массажа нельзя обучиться за несколько дней, от вас потребуются внимание, усидчивость, тренировка. Следует избегать воздействия на соседние участки, где могут располагаться другие точки, которые нельзя затрагивать.

Перед массажем потрите руки. Это оживит циркуляцию крови в ваших руках и согреет их. Осторожно нащупайте точку кончиком пальца. Обратите внимание, что при надавливании на нее возникает ощущение боли или ломоты. Это очень важно для нахождения "жизненной точки". Надавливание не должно быть грубым и резким, не должно оставлять синяков. Воздействовать пальцем следует аккуратно, перпендикулярно к поверхности кожи и строго в указанной точке.

Это может быть: касание — легкое, безостановочное поглаживание,

— легкое надавливание — при котором используется тяжесть пальца или кисти,

— глубокое надавливание, при котором на коже в области точки по пальцем образуется заметная ямка.

Движение пальца может быть горизонтально-вращательным по часовой стрелке или вибрирующим, но всегда должно быть безостановочным.

Давление производится подушечкой большого и среднего пальца. Используются два метода:

1) успокаивающий — непрерывное воздействие, плавные, медленные вращательные движения с постепенным нарастанием силы давления и задержкой пальца на глубине. Прием повторяют 3—4 раза с возвращением каждый раз к исходному положению, не отрывая пальца от точки. Длительность 3—5 минут;

2) тонизирующий — короткое сильное надавливание и быстрое резкое удаление пальца от точки. Длительность 1/2—1 мин.

Перед проведением точечного массажа рекомендуется занять удобное положение, расслабиться, отвлечься от всего постороннего, беспокоящего, неприятного и сосредоточиться на массаже.

* Голицын С. В. Самомассаж, траволечение, гороскоп, Москва, 1989 г.




Рис. 48 — При гриппе.




Рис. 49 — При головной боли.




Рис. 50 — При ринитах.




Рис. 51 — При боли в области головного нерва.




Рис. 52 — При ангине.




Рис. 53 — При боли в области уха.




Рис. 54 — При боли в гайморовой, лобной, придаточных пазухах носа.




Рис. 55 — При зубной боли.




Рис. 56 — При боли в области плечевого сустава.




Рис. 57 — При боли спастического характера в области живота.




Рис. 58 — При радикулите, люмбаго.




Рис. 59 — При боли в области локтевого сустава.

Рис. 60 — При боли в области коленного сустава.




Рис. 61 — Точечный массаж при повышенном артериальном давлении.

Положительное влияние процедуры проявляется по-разному: у одних сразу, у других — через несколько сеансов.

Точечный массаж показан как взрослым, так и детям старше одного года. Но существуют и противопоказания: злокачественные и доброкачественные новообразования; острые лихорадочные заболевания; активные формы туберкулеза; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; резкое истощение; заболевания крови; беременность; тяжелые заболевания сердца, почек и легких.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК

1 — Ниже 5-го шейного позвонка, самого выступающего при наклоне головы вперед.

2 — На 3 пальца в сторону от средней линии спины на уровне промежутка между 2-м и 3-м грудными позвонками.

3 — Ниже 2-й точки на один позвонок.

4 — Кнаружи от ногтевого ложа 1-го пальца на 3 мм.

5 — На тыле предплечья выше головки локтевой кости.

6 — В промежутке между 1-м и 2-м пальцами ближе ко 2-му.

7 — Вершина темени на линии, соединяющей верхушки ушных раковин.

8 — На 1,5 см кнаружи от лобового угла в волосистой части головы.

9 — Кнаружи и вверх от затылочного бугра.

10 — На середине между концами бровей.

11 — Верхняя точка изогнутой борозды.

12 — На три пальца ниже наружной точки локтевого сгиба.

13 — Впереди и вверх от угла нижней челюсти.

14 — В ямке над верхней губой.

15 — Над серединой брови.

16 — В центре вырезки грудины.

17 — На тыльном сгибе стопы в углублении.

18 — В промежутке между 2-м и 3-м пальцами стопы.

19 — В промежутке между 1-м и 2-м пальцами стопы.

20 — Впереди и вверх от козелка уха.

21 — В углублении сзади от мочки уха.

22 — Над серединой лопаточной кости.

23 — На середине расстояния между мечевидным отростком грудины и пупком.

24 — На один палец от пупка.

25 — На два поперечных пальца ниже колесной чашечки на наружной поверхности голени.

26 — Во впадине между 1-м и 2-м пальцами стопы выше 19-й точки.

27 — На уровне талии на два пальца в сторону от средней линии спины.

28 — В области крестца.

29 — Внутренний край подколенной ямки.

30 — На три пальца выше складки луче-запястного сустава.

31 — На локтевом сгибе.

32 — В центре подколенной ямки.

33 — В месте перехода икроножной мышцы в ахиллово сухожилие.

Примечание: при гриппе, ангине, головных болях (если она охватывает всю голову), ринитах, при боли спастического характера в области живота, при радикулите (если боль беспокоит с обеих сторон) надо массировать симметричные точки.

Рисунки показывают точки массажа для каждой болезни.

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ

Точки 1 и 2 массируют возбуждающим методом, присом глубокого надавливания с вибрацией в течение 1/2—1 мин. Это приведет к улучшению общего состояния и понижению артериального давления.

Остальные точки этой группы массируют успокаивающим методом, присом легкого надавливания с вращением в замедляющемся темпе.




Рис. 62 — Точечный массаж при атеросклерозе.

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

(надавливание с медленным вращением
и течение 3—5 минут каждой точки)

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ ПРИ ЗАПОРАХ

В период проведения точечного массажа нельзя принимать слабительные средства. Следует проводить по 2—3 сеанса в день и течение 2 недель

а) атонические запоры — и результате понижения тонуса кишечника. Массируют тонизирующим методом, приемом глубокого надавливания вибрацией в течение 1/2—1 мин.




Рис. 63 — Точечный массаж при запорах.

б) спастические запоры — запоры вследствие спазма гладкой мускулатуры кишечника.

Метод успокаивающий, прием легкого надавливания с вращением в замедляющемся темпе и течение 3—5 минут.

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ ПРИ ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ

Прежде чем начать точечный массаж, необходимо уравнивать психологическое состояние. Ежедневное воздействие (2—3 раза в день) на точки окажет положительное влияние на половую функцию.




Рис. 64 — При спастических запорах.

Воздействие на точки 1—7, 13—15, 18—21, 23 производят тонизирующим методом приемом глубокого надавливания с вращением в течение 1/2—1 мин. Воздействие на точки 8—12, 16, 17, 22 производят успокаивающим методом, приемом легкого поглаживания.




Рис. 65 — Точечный массаж при половой слабости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агафонов Д., Андрей Б. В. Организация заготовок дикорастущих плодов, ягод, грибов и лекарственных трав — Москва, 1975.
- Алтылышев А. А., Корчубеков Б. К. Что мы знаем о мумие — Фрунзе, 1980.
- Андреев С., Баранов В. Аптека у нас дома — Москва, 1983.
- Армстронг Д. Живая вода, перевод с английского — Калькутта, 1944.
- Астапенко А., Капков А. От ста недугов — Москва, 1990.
- Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР — Москва, 1983.
- Балицкий К. Б., Воронцова А. Л. Лекарственные растения и рак — Киев, 1982.
- Бергольц М. Х. Новые лекарственные средства — Москва, 1952.
- Благов В. И. Домашний лечебник — София, 1981.
- Блянова К. Ф., Яковлев Г. П. Ботанико-фармакогностический словарь — Москва, 1990.
- Боровой Б. М. Аптека на грядке — Ленинград, 1982.
- Брехман И. И. Человек и биологически активные вещества — Москва, 1980.
- Васильева З. Л., Пухова О. А. Неспецифическое лечение хронических заболеваний — Ленинград, 1972.
- Воробьев Р. И. Питание и здоровье — Москва, 1990.
- Воронина Г. А., Воронина А. В. Травы русской народной медицины — Москва, 1990.
- Гаммерман А. Ф., Гром И. И. Дикорастущие лекарственные растения СССР — Москва, 1976.
- Гаммерман А. Ф., Юркевич И. Д. под ред. Лекарственные растения — дикорастущие — Минск, 1986.
- Голицын С. В. Самомассаж; траволечение, гороскоп — Москва, 1989.
- Губанов И. А. и др. Дикорастущие полезные растения СССР — Москва, 1976.
- Губергриц А. Я., Соломченко Н. И. Лекарственные растения Добнасса — Донецк, 1971.
- Джарвис Д. С. Мед и другие естественные продукты — Бухарест, 1985.
- Иванченко В. А. Растения и терапия — Афины, 1985 (на греческом языке).
- Иванченко В. А. Растения и работоспособность "Биология" — Москва, 1984.
- Йорис Н. П. Пчелки в жизни людей — Киев, 1969.

- Иорданов Д., Нвколов П., Боячинов А. Фитотерапия — София 1973.
- Капранов В., Хвшим Р. Мудрость веков, III изд. Душанбе, 1984.
- Кнейпп Севастьян. Мое водолечение — Киев, 1904.
- Ковалева Н. Г. Лечение растениями — Москва, 1971.
- Корпачев В. В. Целебная фауна — Москва, 1989.
- Кошечев В. К. Дикорастущие съедобные растения в нашем питании — Москва, 1980.
- Крылов Г. В., Козакова Н. Ф., Лагерь А. А. Растения здоровья — Новосибирск, 1989.
- Кузьмина К. А. Лечные пчелиным медом и ядом — Саратов, 1981.
- Кузнецова М. А. Лекарственное растительное сырье и препараты — Москва, 1987.
- Куренков П. М. Русский народный лечебник. Перевод с английского.
- Куренков П. М. Знхварские рецепты — Москва, 1990.
- Макаров А. А. Растительные лечебные средства якутской народной мдвцины — Якутск, 1974.
- Малахов Г. П. Целительные силы — Стврый Оскл, 1990.
- Мхалюк В. П. Лекарственные растения в народной медицине — Саратов, 1967.
- Мизун Ю. Г., Мизун П. Г. Магнитные бури и здоровье — Москва, 1990.
- Минасва В. Г. Лекарственные растения Сибири — 4-е изд. — Новосибирск, 1970.
- Д-р Митхал. Мочевая терапия. Перевод с английского, 1973.
- Младенов С. Мед и медолечение. Перевод с болгарского — Кишинев, 1984.
- Муравьева Д. А., Геммерман А. Ф. Субтропические лекарственные растения — Москва, 1975.
- Наука о дыхания "Иогъ Рамачарха" III изд. — С.-Петроградъ, 1916.
- Носаль М. А., Носаль И. М. Лекарственные растения и способы их применения в народе — Киев, 1959.
- Нурашев Ю. П., Дениченко П. П. Мумие и его лечебные свойства — Душанбе, 1977.
- Обуков А. Н. Лекарственные растения — Краснодар. Изд. АН СССР, 1960.
- Оганян М. В. Биохимия, биоритмы и питание. Лекция, прочитанная в клубе им. Горбунова в 1982 г.
- Орлов Б. Н., Гелашвили Д. Б., Ибрагимов А. К. Ядовитые животные и растения СССР — Москва, 1990.
- Перевозченко И. И. Лекарственные растения в современной медицине № 5, серия 12 "Природа — человек — здоровье" — Киев, 1990.
- Петкова В. (под редакцией), кол. авторов. Современная фитотерапия — София, 1988.
- Попов Л. П. Лекарственные растения в народной медицине — Киев 1969.
- Рабинович А. М. Лекарство на грядках — Москва, 1990.

— Рабинович А. М. Лекарство на грядках "Алтей лекарственный, мята перечная, женьшень" — Москва, 1990.

— Рабинович А. М. Лекарство на грядках "Алоэ древовидное, аралия высокая, боярышник кроваво-красный" — Москва, 1990.

— Рева М. П., Липовецкий В. М. Растения в быту. Донецк—Донбасс, 1972.

— Самсонова А. Н., Ушева В. Б. Фруктовые и овощные соки — Москва, 1976.

— Синяков А. Ф. Стимуляторы жизни — Москва, 1990.

— Складневский Л. Я. Целебные свойства пищевых растений — Москва, 1975.

— Складневский Л. Я., Губанов И. А. Лекарственные растения в быту — Москва, 1968.

— Сластэнский И. В. Пчелы: мед и другие продукты — Ленинград, 1987.

— Соколов С. Я., Замотаев И. П. Справочник по лекарственным растениям — Москва, 1990.

— Соколова Н. С., Панфилова Т. Г., Панфилов Г. А. Дикорастущие и культурные растения в народной медицине — Москва, 1990.

— Сотник В. Ф. Кладовая здоровья — Москва, 1990.

— Сыров Н. М. Раскрывая тайну мумие — Ташкент, 1969.

— Тимарева Г. Травник — Москва, 1989.

— Токин Б. П. Целебные яды растений III изд. — Ленинград, ЛГУ, 1989.

— Токуиро Намикоши. Японская терапия надавливанием пальцами — Киев, 1989.

— Тупчий В. Г., Карабан В. Г. Медолечение — Москва, 1990.

— Турова А. Д., Сапожникова Э. Н. Лекарственные растения СССР и их применение — Москва, 1974, 1984.

— Уокер Н. В. Лечение сырыми овощами и фруктовыми соками (перевод с английского).

— Хайдав Ц., Алтанпимзг Б., Варламова Т. С. Лекарственные растения в монгольской медицине — Улан-Батор, 1985.

— Харнаж В. Прополис, IV изд. — Бухарест, 1981.

— Харнаж В. Продукты пчеловодства — пища, здоровье, красота. II изд. — Бухарест, 1982.

— Шакиров А. Ш. Тайна древнего бальзама — ассиль — Ташкент, 1973.

— Шакиров А. Ш. и др. Об общем действии и токсичности препарата восточной медицины — мумие. ДАН Уз. ССР, № 8, 1964.

— Шапошников В. Л. Индивидуализация и прогноз в спорте. Физкультура и спорт, 1984.

— Шассе Е. Ю. Фитотерапия — Москва, 1952.

— Шеменберг В. Соки растений — источник здоровья — Москва, 1979.

— Шобингер У. Плодово-ягодные и овощные соки — Москва, 1982.

— Шпиления С. Е., Иванов С. И. Азбука природы (лекарственные растения) — Москва, 1983.

— Шрстер А. И. Лекарственная флора Советского Дальнего Востока — Москва, 1975.

- Эвенштейн З. М. Популярная диетология — Москва, 1990.
- Юркевич И. Д., Мишенин И. Д. Лекарственные растения и их применение — Минск, 1974.
- Ягодинский В. Н. Ритм, ритм, ритм — Москва, 1985.
- Журнал "Наука и жизнь", О мумие — Москва, 1972, № 11.
- Журнал "Природа", О мумие — Москва 1973, № 3.
- Журнал "Факультет здоровья" за 1988—1990 гг.
- Ежемесячник "Твое здоровье" за 1989, 1990 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ	5
ЛЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ И НАРОДНЫМИ СПОСОБАМИ	
I. Рецепты для лечения различных болезней лекарственными растениями и народными способами:	7
— абсцессы	8
— авитаминоз и цинга	8
— аденома предстательной железы	10
— алкоголизм	10
— аллергия	11
— ангина	12
— дифтерия и скарлатина	14
— артриты	14
— астма бронхиальная	15
— атеросклероз	16
— атония кишечника	18
— бессонница	18
— боль в пояснице	19
— бородавки	19
— бронхиты, плевриты, пневмония	20
— вегетоневрозы	23
— вен расширение, тромбозы	23
— водянка	25
— возбуждающие аппетит	25
— волос укрепление	26
— воспаление придатков	28
— воспаление слизистой оболочки рта и десен	28
— воспаление тонких кишок	28
— гайморит	29
— гастрит	29
— гастрит, диспепсия, плохое пищеварение, изжога, газы в желудке	31

— геморрой	32
— гепатиты	34
— гипертоническая болезнь	34
— гипертрофия предстательной железы	37
— гипотония	37
— глаз заболевания	38
— головные боли	38
— горечь во рту	39
— грипп, простуда	39
— дерматит	41
— диабет	41
— дизентерия	43
— дифтерия	45
— желтуха	46
— желчегонные	46
— желудочно-кишечного тракта заболевания	47
— желчных путей, желчного пузыря заболевания	50
— женских половых органов заболевания	52
— запоры	54
— испуг	55
— камни в желчных протоках и печени	55
— от камней в желчном пузыре	57
— сборы при желчекаменной болезни	58
— камни в почках и мочевом пузыре	59
— средство для растворения камней в печени, почках и желчном пузыре	61
— кашель простудный и хронический	62
— климакс	64
— кожи заболевания	66
— колит	67
— крапивница	67
— кровоостанавливающие	67
— кровотечения носовые	69
— кровотечения маточные	69
— лактогонные	70
— ларингит	70
— от болезни горла для певцов и дикторов	70
— лишай	71
— лучевая болезнь	71
— люмбаго	71
— малокровие (анемия)	71
— малярия, лихорадка	73
— метеоризм	74
— мозоли	74
— мочевого пузыря, почек и мочевыводящих путей заболевания	75

— от раздражения мочевого пузыря	80
— мочегонные	80
— мочекаменная болезнь	81
— мочи недержание	82
— нарывы, фурункулы, чирьи	83
— насморк	84
— невралгия	85
— неврастения	86
— невроз сердечно-сосудистой системы	86
— нервное истощение	86
— нервное возбуждение	87
— ног потение	87
— от отеков на ногах	88
— обмен веществ	88
— от одышки и грудной жабы	88
— ожоги	89
— опрелости	90
— опьянение	90
— остеомиелиты	90
— отеки	90
— паралич	91
— переломы	91
— печени заболевания	92
— пневмония	93
— повышенная кислотность желудка	93
— подагра, отложение солей	93
— полиартрит	99
— половая слабость, импотенция	99
— понос кровавый	100
— понос у детей	100
— покудание	100
— почечные колики	101
— проктиты и парапроктиты	101
— простудные заболевания	101
— против образования камней в печени и почках	102
— противоглистные	102
— от прыщей и угрей	103
— радикулит	103
— рак	104
— рак матки	104
— раны, порезы, царапины, язвы	104
— раны, язвы, порезы, долго незаживающие	105
— раны гнойные	106
— расстройство желудка	107
— ревматизм, полиартрит	107

— ревматизм хронический с опухолями и болями в суставах	114
— ревматизм суставный мышечный	115
— рожа	115
— воспаление глаз при роже	115
— селезенки болезни	116
— сердечно-сосудистые заболевания	117
— склероз	118
— склероз старческий	119
— слабительные средства	120
— старческая немощь	121
— стенокардия	121
— стоматит	122
— страх	122
— стрессовые состояния	122
— судороги ног, рук	123
— тонизирующие средства	123
— трахеобронхит	124
— тромбоз, варикозное расширение вен	124
— трофическая язва	125
— туберкулез	126
— укусы ядовитых змей	128
— умственное и физическое утомление	128
— успокоительные	129
— ушибы, кровоподтеки, опухоли, ссадины	129
— цистит	130
— шпора пяточная	131
— экзема	131
— экзема аллергическая	133
— эндартериит	134
— эпилепсия	134
— язва желудка	135
— яичников (придатков) воспаление	136
— ячмень на глазах	136
2. Сборы лекарственных растений, применяемые в практике	
траволечения и народной медицине	137
— при заболеваниях органов дыхания	139
— при трахеобронхите, хроническом бронхите, остром сухом бронхите и бронхоспазме	140
— при бронхиальной астме, коклюше, хронической пневмонии	141
— при ларингитах, трахеитах, ангинах, тонзиллитах	142
— при простудных заболеваниях	142
— отхаркивающие сборы	142
— для полоскания при ларингите и ангине	143
— для полоскания рта и горла	143
— потогонные и жаропонижающие	144

— грудные сборы	144
— при сердечно-сосудистых заболеваниях	145
— при атеросклерозе	146
— при гипертонической болезни	147
— успокоительные сборы	147
— при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, гастритах, кишечных коликах, повышенной кислотности	147
— желудочные сборы	150
— сборы, регулирующие деятельность кишечника	151
— слабительные сборы при запорах	151
— при поносах	152
— при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей	153
— при болезнях почек и мочевыводящих путей	153
— при хроническом гломерулонефрите и хроническом пиелонефрите	154
— при мочекаменной болезни	154
— при гепатитах и циррозах печени	155
— при холецистите, холангите	156
— при гепатопатиях, холецистопатиях	156
— при цистите	156
— при желчекаменной болезни и заболеваниях желчевыводящих путей	157
— желчегонные сборы	157
— желчегонное при желтухе	158
— при хроническом панкреатите	158
— при сахарном диабете	158
— мочегонные и потогонные сборы	160
— ветрогонные сборы	161
— при геморрое	162
— слабительное средство	163
— при подагре	163
— при кожных заболеваниях	163
— при экземе, витилиго, нейродермите и псориазе	165
— при облысении	165
— поливитаминные сборы	166
— горькие (аппетитные) сборы	167
3. Лечение горячими ваннами с примесью отвара различных трав	169
— для лечения суставного ревматизма	170
— дубовая кора для прибавления к ваннам	170
— хвощ для прибавления к ваннам	170
— корни айры для прибавления к ваннам	171
— ванна при камнях в почках	171
— муравьиная ванна (водяная)	171

— отруби для прибавления к ваннам	171
— листья грецкого ореха для прибавления к ваннам	171
— ромашка для прибавления к ваннам	172
— экстракт из сосновых игл для прибавления к ваннам	172
— валериана для прибавления к ваннам	172
— соль для прибавления к ваннам	172
— тимьян для прибавления к ваннам	173
— лавандовый цвет для прибавления к ваннам	173
— ванны с прибавлением горчицы	173
Залмановские ванны	173
4. Противопоказания	175
5. Ядовитые растения	183
— белена черная	184
— век ядовитый	184
— волчье лыко	185
— вороний глаз	185
— чемерица лобеля	186
— первая помощь при отравлении	186
6. Календарь сбора лекарственных растений	187
ВНИМАНИЕ! Дорогой читатель, помни!	194
7. Способы приготовления лекарств из лекарственных растений в домашних условиях	195
8. Настойки в домашней аптеке (приготовление и употребление)	199
— аир болотный	200
— аралія мапъжурская	200
— настойка из листьев барбариса	200
— бедренец-каменоломка, корни, настойка	200
— настойка березовых почек	201
— боярышник, настойка	201
— выюнок полевой	201
— грушанка, настойка	202
— дягиль лекарственный	202
— настойка женьшеня	202
— заманиха, эхинопанакс высокий	202
— зверобой	203
— настойка из травы золототысячника	203
— календула, настойка	203
— каштан, цветы или плоды, настойка	204
— клевер красный (цветущие облиственные верхушки, особенно вначале цветения), настойка	204
— колючелистник, настойка	205
— крапива, настойка	205
— кровохлебка лекарственная, настойка	205
— левзея сафлоровидная	205

— лимонник китайский, настойка	205
— любисток, корень, настойка	206
— настойка пиона уклоняющегося	206
— осина, настойка	206
— перцовая настойка	206
— настойка полыни	206
— почки березы, настойка	207
— прострел Галлера	207
— пустырник, настойка	207
— родиола розовая (золотой корень)	207
— ряска маленькая, настойка	208
— сабельник, настойка	208
— сирень, настойка	208
— настойка софоры	209
— стальник полевой	209
— стеркулия платанолистная	210
— столетник, листья, настойка	210
— укроп, семена, настойка	210
— хмель, настойка	210
— чеснок, настойка	210
— шлемник байкальский	211
— звкалит, настойка	211
— эвкомия, настойка	211
— элеутерококк	211
9. Масла в домашней аптеке	213
— багульниковое масло	214
— зверобой продырявленный	214
— календула (масло)	214
— масло лилии	214
— ментоловое масло	214
— облепиховые масла	215
— пихтовое масло	215
— чесночное масло	218
10. Полезные советы	219
— средство для извлечения рыбной кости из горла	220
— как извлечь насекомое или камешек из уха	220
— маленькая помощь эпилептикам	220
— от болезненных ощущений после вчерашнего кутежа	220
— от отрезвления мертвецки пьяного	220
— алкоголизм	221
— опьянение	221
— как бросить курить	222
— дурной запах изо рта	222
— народное средство для очищения организма	222
— ценная диета для похудения	222

— средство от вrostания ногтей	222
— от мозолей	223
— средство для смягчения кожи лица	223
— для омолаживания лица	223
— маска для лица	223
— маска для сухой кожи	224
— маска для жирной кожи	224
— веснушки	224
— морщины на коже лица	224
— от солнечного загара и от действия сильного ветра	225
— при выпадении волос	225
— шампунь для волос	227
— от отравления птомаином	227
— от укуса тарантула	228
— от укуса змей	228
— средство для лечения всех видов ревматизма и в особенности суставного	228
— диабет	230
— березовые почки — великое лечебное средство от многих болезней	231
— лечение валерианой	232
— лечение подсолнечным маслом	233
— лечебная жидкость	234
— индийский метод лечения йодом гипертонии	234
— методика очистки печени	236
— лук и чеснок	237
— капуста вместо пирамидона	237
— от болезни почек, желудка и малокровия	238
— облепиха крупновоидная	238
— чистотел	239
— зверобой продырявленный	241
— лечение больных пожилого возраста янтарной кислотой	241
— янтарная кислота	242
— средство от крапа	243
— уксус	244
— о молоке	245
— грудная жаба и некоторые сердечные болезни	245
— детоксикация	247
— голодание	248
— советы доктора Хаксли	249
— естественные роды	250

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВВЕДЕНИЕ	255
I. СОКОТЕРАПИЯ (ОВОЩИ, ЯГОДЫ, ФРУКТЫ)	257
Лечение овощными и фруктовыми соками	258
Соки из фруктов, ягод и овощей	258
Как готовить соки в домашних условиях	259
В каком количестве можно пить соки?	259
Как мы можем оградить себя от влияния химических веществ, применяемых в сельском хозяйстве	260
1. Овощные соки:	260
— сок брюссельской капусты	260
— сок капусты	260
— картофельный сок	261
— лимонный сок	261
— сок люцерны	262
— сок сырой моркови	262
— огуречный сок	263
— сок одуванчика	263
— сок перца (зеленого)	263
— сок петрушки	264
— сок редиса	264
— сок репы	265
— свекольный сок	265
— сок сельдерея	266
— сок спаржи	266
— сок стручковой фасоли	267
— томатный сок	267
— сок хрена	267
— сок цикория-эндивия	267
— щавелевый сок	268
— смесь соков моркови, свеклы и огурцов	268
2. Фрукты и ягоды	269
— абрикосы	269
— арбузы	269
— брюква	270
— виноград	270
— вишня	270
— гранатовый сок	271
— грейпфрут	271
— груша	271
— дыня	271
— земляника (клубника)	272
— крыжовник	272
— малина	272

— сох персика	273
— рябина	273
— рябина черноплодная	273
— слива	274
— черная смородина	274
— черника	274
— яблоки	275
— яблочный сох	275
3. Некоторые дикорастущие съедобные растения, обладающие лечебными свойствами	275
— аир	276
— боярышник	276
— ежевика	276
— халина	276
— клевер	276
— крапива	277
— лопух	277
— медуница	277
— одуванчик	278
— пастушья сумка	278
— сосна	279
II. ЛЕЧЕНИЕ ПРОДУКТАМИ ПЧЕЛОВОДСТВА	279
Продукты пчеловодства	280
1. Прополис	281
а) прополис — новое лечение, чудо пчелиной семьи	281
б) прополис — продукция пчеловодства	283
в) приготовление мазей	284
г) прополис на сливочном масле 10-проц. концентрации	284
д) применение экстракта прополиса	284
е) применение прополиса при лечении некоторых болезней	285
— лечение больных бронхитом, ринитами и трахеитами	285
— прополис в лечении воспаления влагалища и шейки матки	285
— воспаление слизистой оболочки полости рта	286
— ангина	286
— полоскание водным или спиртовым раствором прополиса	287
— гайморит	287
— лечение больных с острым и хроническим колитом	287
— лечение острых воспалений среднего уха прополисом	287
— лечение тугоухости прополисом	287
— хронический простатит	288
— хронические фарингиты	288
— применение прополиса при язвенной болезни	288
— домашний способ ингаляции прополисом	289
2. Лечение пчелным медом	290
— бессонница, неврастения	290

— гипертоническая болезнь	290
— грипп	290
— при желудочно-кишечных заболеваниях	290
— колит	290
— воспаление миндалин	291
— невроз сердца, неврастения, истерия	291
— недержание мочи у детей	291
— омоложение лица	291
— заболевание печени	291
— радикулит, ревматизм	291
— рожа	291
— склероз	292
— стоматиты, ангина, колиты	292
— туберкулез	292
Некоторые полезные рецепты с медом	292
— настой цветков липы мелколиственной с медом	293
— отвар цветков липы и плодов малины с медом	293
— отвар листьев эвкалипта с медом	293
— настой мать-и-мачехи с медом	293
— настой цветков ромашки аптечной с медом	293
— настой травы сушеницы болотной с медом	294
— лимонник китайский с медом	294
Применение меда в косметике	294
Простейшие способы проявления примесей в меде	295
3. Пчелиное маточное молочко	295
Биологическая роль и физическое действие маточного молочка	296
Употребление	296
4. Цветочная пыльца	297
Показания к применению	298
Способ применения и дозы	298
Условия хранения	298
5. Пчелиный яд	299
Метод лечения ревматизма укусами пчел	301
Побочные эффекты при лечении медом и другими продуктами пчеловодства и противопоказания	301
III. МУМИЕ	301
Некоторые данные о мумие	307
Прием мумие по Шакирову	307
Болезни и рецепты	308
— язвенные болезни желудка, кишечно-желудочного тракта, органов пищеварения (желудки, печени, селезенки), мочевого пузыря (при задержке мочи), при колитах, гастритах	308
— диспептические явления (изжоги, тошнота, отрыжка, рвота)	309
— при воспалительных и аллергических хронических	

заболеваниях, ангине, насморке, катаре верхних дыхательных путей, чихании, кашле	309
— при кровотечении из носа	310
— гнойный отит, воспаление среднего уха, понижение слуха	310
— тромбофлебит, а также тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей	310
— при сахарном диабете	310
— при головной боли, мигрени, ознобах, головокружении, эпилепсии, параличе лицевого нерва	310
— при заикании	311
— при кровотечении из легких	311
— при бронхиальной астме	311
— переломы костей, суставов, травмы грудной клетки, вывихи, ушибы, растяжения мышц, трофические кожные язвы, свищи, опухоли, ожоги, порезы, ревматизм	311
— при суставном ревматизме	311
— при заболеваниях периферических нервных стволов, опорно-двигательных органов (радикулитах, нейродермитах, плекситах, невралгии)	312
— при экземе конечностей	312
— при бесплодии у мужчин и женщин, уменьшения половой функции, при гипоперемии	312
— при женских заболеваниях, дефектах тканей женских половых органов	312
— при воспалении молочной железы	313
— при гнойно-воспалительных и инфицированных ранах, ожогах, гнойных язвах	313
— костно-туберкулезные процессы	313
— при гипертонии	313
— при камне в желчном пузыре	313
— при геморрое	313
— при пародонтозе: десна, зубы, слизистая оболочка полости рта, местные воспалительные реакции и т. д.	314
— при цистите	314
— при глаукоме	314
— при туберкулезе	314
— при выпадении волос, ожоговое облысение	314
— аллергия	314
IV. "ЖИВАЯ" и "МЕРТВАЯ" ВОДА	315
1. Использование "живой" и "мертвой" воды для лечения ряда болезней	317
2. Изготовление прибора для получения "живой" и "мертвой" воды	320
V. ВОДОЛЕЧЕНИЕ	321
Народная медицина и водолечение	322

Вода	323
Минеральная вода	325
О талой воде	327
— употребление талой воды (инструкция)	327
Применение воды для лечения	327
Компресс	328
а) компресс на туловище	328
б) компресс на спину	328
в) компресс на туловище и спину	328
г) компресс на живот	328
Ножные ванны	328
а) холодная ножная ванна	328
б) теплая ножная ванна	328
Полуванна	328
— сидячая холодная ванна	329
— теплая сидячая ванна	329
— холодная полная ванна	329
— смешанные ванны	329
— минеральные ванны	329
— ванны для отдельных частей тела	330
— глазная ванна	330
— паровые ванны	330
Обливания	331
Обмывания	332
Обертывания	332
Питье воды	333
Экстракты	334
Настои	334
VI. МОЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ	335
История мочевой терапии	336
Джон У. Армстронг	338
Раоджибхай	339
1. Сущность мочевой терапии	339
2. Техника мочевой терапии	341
Основные правила	341
Первоначальная фаза привыкания	342
Практика внутреннего применения	342
Один раз в день	343
Три раза в день	343
Голодание	343
Альтернативное голодание	344
Практика наружного применения	345
Техника смазывания тела мочей	345
Применение влажных повязок с мочей	346
Предупреждения и предостережения	346

— астма	347
— атеросклероз	347
— диспепсия	347
— экзема	347
— геморрой	347
— гепатит	348
— ожирение	348
— ревматизм	348
VII. ГОЛОДОТЕРАПИЯ	349
Лечение голодом (по доктору М. О. Гартэну)	350
— суеверие и боязнь	353
— продолжительность поста	353
Что такое болезнь?	354
История лечения голодом	355
Действие голода на организм	356
Кровяные шарик	357
Мускулы — сердце — сила	357
Желудок и кишечник	358
Истощение при голодании	359
Общие клинические наблюдения при голодании	363
Практические советы	363
VIII. ДИЕТОТЕРАПИЯ (и правильное питание)	365
Роль питания в жизни человека	373
Ответы на вопросы	375
Диета, которой надо придерживаться в течение всего периода лечения колита	382
— пища, которая должна быть исключена из диеты	383
— что следует кушать	383
Сердечные боли и влияние диеты	384
Диета и здоровье	388
— о молоке	391
— об одной "загадке"	392
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ	
I. ОСНОВНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ БУТЕЙКО	393
II. ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ	405
— метод лечения	406
— практика лечения	406
— панариций	406
— воспаление среднего уха	407
— эпидемия гриппа	407
— запоры, колиты	407
— аппендицит	407
— камни в печени, почках, мочеточнике	407
— язва желудка, кишок	407

— воспаление легких	407
— астма, одышка	407
— заболевание печени	407
— полиартрит	408
— радикулит	408
— ревматизм, ревмокардит	408
— гайморит	408
— ячмень на глазу	408
— фурункулы	408
— микозит	408
— после инфаркта	408
— тромбоз, тромбоз	408
— гангрена	408
— геморрой	409
— воспаление миндалин, ангина	409
— гипотония	409
— гипертония	409
— онемение конечностей, заболевание сосудов	409
— головные боли, зубная боль	409
— воспаление легких и дыхательных путей	409
— облитерирующий эндартериит	409
Лечебный кружок Гончарова для электротерапии	409
III. МЕТАЛЛОТЕРАПИЯ	411
IV. МАГНИТОТЕРАПИЯ	417
1. Магнит помогает при переломах	422
2. Магнитный браслет	423
3. Пояс магнитофорный лечебный	424
а) назначение и область применения	424
б) противопоказания к применению	425
в) уход за поясом	425
4. Магнитные клипсы	425
а) назначение и область применения	425
— наименование биоточек, указанных на ушной раковине	427
б) противопоказания	428
5. Магнитная вода	428
V. ЧЕЛОВЕК И МАГНИТНЫЕ БУРИ	431
— сердечно-сосудистая и кровеносная системы	432
— органы дыхания	432
— центральная нервная система	432
— и другие заболевания	432
— как сохранить здоровье в неблагоприятные дни	433
— медикаментозное лечение	433
— занятия физической культурой	434
VI. АКУПРЕССУРА	435
а) какие имеются виды точек	436

б) лечебные показания акупрессуры	437
в) какая точка относится к какому заболеванию	437
г) как правильно найти точку акупрессуры	438
д) как воздействовать на точку акупрессуры	438
— астма	440
— болезни глаз	441
— возбуждение аппетита	441
— притупление аппетита	442
— боли желчного пузыря (колики)	442
— головная боль (в затылочной части)	442
— головная боль (в лобной части)	443
— головная боль (мигрень)	444
— гипертония	444
— головокружение	445
— грипп	445
— дистония	446
— желудочно-кишечные боли	446
— жажда	446
— зубная боль	447
— катар верхних дыхательных путей	447
— интенсивное кровообращение	448
— нарушения кровообращения	448
— легочная недостаточность	449
— насморк	449
— потливость	450
— крестцовый радикулит	450
— шейный радикулит	451
— возрастные расстройства (переходный возраст)	451
— расстройства и период менструации	452
— половые расстройства (импотенция у мужчин, холодность желаний у женщин)	452
— половые расстройства (слабая эрекция у мужчин)	453
— расстройства сна	453
— боли ревматического характера	454
— боли сердца	454
— страх	455
— боли в суставах	455
— усталость	456
— усталость, пот	456
— ушная боль	456
VII. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ	456
Принципиальные основы точечного массажа	458
Определение точек	466
— при повышенном давлении	467
— при атеросклерозе	468

— при запорах	468
— при половой слабости	468
Список литературы	471